




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1080/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1080/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1080/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1080/A

C. II. 1080/A

16/b


16.A.2


28952


1080

pt 3 (Ficinus) wanting

sayne
12/1/11







28952
HYGIEINA,

id est,

DE SANITATE
PROMOVENDA, MEDICI-
NÆ PARS PRIMÆ.

Auctore

TIMOTHEO BRIGHTO CAN-
tabrigiensi, Medicinæ Doctore.


Cui accesserunt De Studiosorum sanitate
libri III. Marsilii Ficini.

Ἀσκήσεις ὑγιεινῆς ἀρχαίη τροφῆς, ἀσκήσιν πόσαν.



F R A N C O F U R T I

Ex Officina Paltheniana, sumtibus hered.
Petri Fischeri & Ionæ Rhodii.





AMPLISSIMO ET

HONORATISSIMO DOMINO, DN.

*Guiljelmo Cecilio, Equiti aurato, Baroni Burghliensi, summo
Angliae quaestori, & Sacri Regii Senatus Consiliario,
atq; Cantabrigiensis Academiae Can-
cellario.*



Eteri more, honoratissime domine, qui praeceptoris viua voce habebatur, artes bonas docendi, discendiq; amisso, sapientiae in primis iactura maxima, temporis nonnulla, sumtus aliqua infelix subrepsit, qui libris, atq; doctorum monumentis legendis continetur. Hinc scholis Philosophiae qui hodie praeficiuntur maximam partem librorum interpretes facti sunt: haud sapientiae magistri. Qui vero auscultatione qualicumq; illa spreta, ex doctorum monumentis seipso sibi statuunt doctores: certe multae lectionis homines euadunt, haud multae scientiae. Ex quo quum constans vix vlla doctrina tradatur, tot oriuntur eadem de re discrepantes hominum sententiae, cum quisq; quod apud magni nominis auctorem legerit, tueri contendat, scire demum quo fundamento rationis consistat, vel qua naturae luce collocetur, perpendere negligat fere vnusquisque: hinc nata tanta scriptorum ambitio, tanta scribendi luxuria, tanta sapientium in specie multitudo, tanta vere sapientium orbitas atq; solitudo. Cum rectum & verum existat vnum, a quo deflexum vbi sit, vel millefariam liceat errare. Sed quid haec ad amplitudinem tuam, vel nomini tuo inscriptam Hygieinam meam? permultum sane in vtramq; partem. Nam & tu is es, quae sapientia, rerumque gestarum prudentia, summo honoris

loco collocavit. Es Cantabrigiēsis Academiæ patro-
nus, es Cancellarius, deniq. is es qui facilis, & atten-
tus iustam qualemcunq. literarum nomine susce-
ptam accipies querelam. Et ego is sum cuius studia
ita comparata sunt, vt rerum natura ob oculos po-
sita, & superstitione ex auctoritate scriptorum nata,
excussa; quod in medicina verum, quodque germa-
num, & breuiter tradendum, & dilucide explican-
dum mihi ipsi proponam. Accipe ergo, honoratissi-
me Cecili, & consilii, & facti mei rationem paulo al-
tius repetitam. Omnis recta docendi ratio duobus
hiscē, breuitate, perspicuitateq. continetur. Cū tota
rei doctrina ita traditur, vt nec heterogeneis impu-
ra sit, nec tautologiis molesta; ea demum brevis re-
cte dicetur: quæ autem à summis orta, per interme-
dia, ad ima fluens, methodo proponitur, omnē per-
spicuitatis euentiam continebit, qua & facilius
concepitur, & altius insidet memoriæ. Hac docendi
ratione caruit iam diu Medicina, cū auctoriū nemo
his limitibus cingi se pateretur, quin, modo physicū
agere, modo palæstritam, modo coquum, modo a-
stronomum, deniq. nihil non esse, medicorum ha-
bitum sit munus & officium. Videlicet artes varias
vt vsu miscētes, quod omnino valetudinis curato-
ri foret necessum, ita parum admodum spectantes
præcepta finibus coercēda suis, nec ex æquo & iure,
alteram alterius possessiones fas esse inuadere. atq.
hoc primum male prolixam habet medicinam. Ad
hæc accedit, quod potius librorū molem quam rei
argumentum spectantes, Asiatica redundantia rem
medicam voluminum multitudine auctiorem red-
diderunt, præceptis autem ieiuni atq. aridi ipsi, qua-
lem & quantam à patribus acceperunt, talem atque
tantam lento incremento & posteris tradendam
constituerūt. Qui autem aliorum redundantia am-
putate studuerunt, verborum, non argumenti bre-
uitatem

uitatem sequuti sunt inde nihilominus quā illi ipsi
quorum castigatores haberi volunt, fiunt alienis &
impropriis redundantes; nec non idem sæpius locis
variis contra breuitatis leges, docere ex diligentis
magistri officio æque statuerunt. Itaq. primus hic la-
bor mihi suscipitur, & heterogeneous expurgan-
dorum, & quæ multis cognatione communia sunt,
omnibus semel, nō seorsim singulis tradendorum,
semper instituti memor, nec facile lectorem tauto-
logiis obtundens. magna sane virtus, dūmodo eam
assequamur. sequimur profecto, atq. dum vita sup-
perit, studiose sequemur. Atq. hæc prima virtus artis
recte tradendæ existit: hic nostri prima laboris seges.
Altera perspicuitatis est, quæ methodo ab vniuersa-
libus ad specialia, id est, à causis ad effecta transitio-
num gradibus sensim descendit, cuius methodi fru-
ctum cum animo perpendo, eademq. alias fere iam
omnes artes dotatas considero, vt ita exultas præ-
dico beatas, sic subit dolor vicis nostræ quibus tādū
inculta iacuit medicina. atq. hæc secūda laboris no-
stri materies: videlicet vt præcepta vera, propriaque
pro lucis splendore, quo prima posterioribus collu-
cent, primam sedem obtineant; reliqua, prout alio-
rum luce illustrari opus habet, propria serie deinde
consequantur, dum in omnium postremo consisti-
mus, quod reliquorum lumē postulat, ipsum per se
per obscurum, & omnem mentis aciem fugiēs. Ha-
bes cōsiliū meī rationem, & metam studiorū, quam
omnes mecum spectare debent medicinæ, atq. reli-
quarum disciplinarum doctores: eam qui attigerit,
nihil ei desit quod ad breuiter facileq. docendi lau-
dem pertineat: qui proxime attigerit, hic secundus
est, quo loco in instituto tam præclaro, vel etiam in-
fra secundos consistere pulcrum, & honestum ha-
bendum. Secundum hæc leges vniuersum sapien-
tiæ studium si traderetur, (ita autem tradi deberet)

TIMOTHEI BRIGHTI

6
& plura facilius, & certius quam vt nunc res philo-
sophica habet disceremus. Meæ tenuitatis, probe
consciussum, nec nō memor dicti illius magni Ga-
leni, *Se maxime quemq; vereri sportere.* Quid vero præ-
stiterim reipsa testari malo, quam verbis meis præ-
dicari. Animum quidem certe adhibui, & votū ma-
ximum, facultate autem, si viris & vsu, ætate, & stu-
dio, & otio maiore affluentibus minus satisfaciam,
nec mirum, qui nec ipse mihi satisfaciam. Quid tum?
etiam num tacendum foret? Nequaquā. Dies multa
docet mortales, & dies diem. Hanc diecularū mea-
tum *παρδείαν* ingenuè offero, fructum labo-
rum: daturus & politiora hæc & maiora alia, vbi æ-
tas, otium, studium, vsus vberiore nos prouentu au-
xerint. Cui namq; ita vita instituitur, vt aliis prodes-
se velit, id maturissime fieri & vitæ breuitas, atq; in-
constantia, & rei vsus inprimis postulāt. Operis dif-
ficultatem norit is, qui in hoc genere aliquādo fe-
cerit periculum: otiosi homines & ignaui, nec pos-
sunt, nec velint recte iudicare. Hic te vnum, hono-
ratissime Cecili, & instituti mei & operis testem, ac
arbitrum posco; qui & ex ingenii acie qua es acerrima,
de instituto potes statuere: & ex vsu rerumque
experiētia, corpore iam senili ac valetudinario, qua
summa prudentia es, de re ipsa potes decernere.
Totius medicinæ corpus mihi efformandum ad il-
lam breuitatis, & perspicuitatis ideam proposui:
καὶ πλάσμεν effinxi vniuersum, ad quod au-
gustinus opus aliquando dedolare cōtendemus. Hu-
ius caput & pectus tibi, academici otii mei primitias
offerō; accipe modo precor vultu sereno; agnosce a-
nimum, & amoris, & obseruantix testandæ cupidissi-
mum. Cantabrigiensis sum, & genere, & vitæ insti-
tuto. Hic primum datum & solis luce frui, & quod
longe maius est religione pura, & liberalium scien-
tiarum præceptis erudiri. Deniq; Cantabrigiæ & Hy-
gicinam

gieinam hanc, & huic cōgenerem *Therapeuticam* adhuc pressam, edendam tempore commētati sumus, quo ergo piaculo, isto te taceam monumento amplissime Cancellarie? Est istud profecto, Academia priuilegia tueri, immunitates augere, literatis fauere, quod tu facis, à Cantabrigiēsis academicis, inter quos ego profiteor nomē meum, amorem, cultus officium, fausta vota, omnia deniq. quantacunq. illa sint, iure tuo venditare. Respice ergo nos, & munusculum leuidēse, nec ex munere animum, sed ex animo munus metiare. Hāc tuę amplitudini statuo columnam, inscriptam G. C. literarum patrono, quandiu libri mei genius in choro musarum sedes egerit, tandiu duraturam. Dabo autem quam meritus es si uiuo, ex materia nobiliore ac opere magis Phidiano, & Praxiteleo interea dum digniora tibi paramus, hęc boni consule, & huiusce æternæ laudis cumulum ex Musarum amore, atq. earundem ipsarum huiusce templi sacrosancti cultu perge tibi quam vberimum facere. Misericors Deus amplitudinem tuam cum Ecclesiæ ipsius tum huic Reip. & in ea Cantabrigiensibus tuis quam diutissime seruet incolumem.

Amplitudinis tuę obseruantiss.

TIMOTH. BRIGHTVS.

P R Æ F A T I O
Ad studiosum Lectorem.

Nemo omnium recte de re literaria iudicantium est, studiose Lector, cui non magni illius P. Rami & vita gloriosa fuit, & philosophandi institutum fructuosum. Cades nefanda, & post homines natos crudelitate, ac scelere memorabilis, quæ una cum infinitis aliis, & piis & doctis viris extinctus est, diris omnibus execranda. Huius summi viri auctoritate, & exemplo, iam tum cum primum medicos sequutus sum, ad meam utilitatem gnesia medicina præcepta ab alienis quantum ingenio potui, segregavi. Quæque pluribus communia, & sæpius repetita percepi, ad unum caput retuli, tradendaq; semel, ne latius manarent limitibus, cinxi, ordinemq; digessi. atq; hoc quo meis ipsius tantum studiis, viam sternerem & magis expeditam darem: & ut legendo, auscultando, meditando iudicio creui, definire atq; dividere aliter paulo quam vel legendo, vel auscultando edoctus sum, tentavi. Sed hac parce atq; timide cum hæc duo, recte definire ac dividere humane mentis vim maximam contineant, & mille ingenii contentiones postulent. Aperio sodalibus meis studiorum rationem; probant, suadent pergere, fructum sæpe ostentantes, & honestum animi laborem. Ego sponte mea (quanquam id lente sane) incedens, horum impulsibus alacrius occurro expetito labori. Et quantum ingenio, & iudicio, & otio possum, tantum huic operi inprimis dandum existimo, & universa medicine corpus efformandum mihi propono, non eo certe consilio unquam, ut theatro spectandum proponeretur, sed animi tantum causa, quo & cupiditati meæ satisfacerem, & auctoribus illis meis obtemperarem. Tandem adumbro, ut caput, & truncum, & artus liceat internoscere. apud me condoruditatis conscientia pudibundus, celari res nequit. Petunt à me, atque adeo precibus contendunt optima spei adolescentes Cantabrigienses mei copiam mearum observationumcularum ipsis facerem, adeoq; eas qualescunq; viva voce priuatim interpretarer. Ego, promtior fortasse quam me longe imparem oneri deceret, libenter annuo, sperans umbratilem hanc profectio-

AD LECTOREM.

fessionem, & acuiendi studii rationem mihi ipsi fore, & aliis,
 quibus ingenue labores meos communicavi, rei gerenda ma-
 teriam daturam. Adsumt, auscultant, dubitant: & ut Phi-
 losophos decet, libere quarunt: ac demum opera mutua colla-
 ta, interdum nosmet expeditus harentes, & difficultates su-
 peramus. Hoc consilium instituti nostri, studiose lector, hac
 progressus ratio. Reliquum est ut & causam editionis narrem,
 & quid ipse ad medicinam methodo explicandam prater ce-
 teros contulerim, vel certe contulisse studuerim, paucis expo-
 nam. Editionis itaq; causam sic habeto: Cum sentirem audi-
 tores meos scribendi radio laborare, atq; exemplaria quã plu-
 rima scriptorum vitio deprauari, cœpi deliberare, quo pacto,
 & hos scribendi onere liberarem, & integritati operis mei in-
 primis consulerem, quod ratione nulla commodiore quam ty-
 pographia, fieri potuisse percepi. Itaque scriptis illis meis dili-
 gentius paulo recognitis, primam laboris partem, prælo tra-
 dendam curavi. Tantum primam, quod cum per humani in-
 genii imbecillitatem in re omnium difficillima, aggressus pri-
 mo, soli nec pro rei magnitudine satis exercitato, errandi fere
 necessitas incumberet, in eo malui periculum facere, in quo
 errare foret leuius, & me in parte potius operis, quam in ipso
 toto censorii hominum iudicii exponere. Qui profecto censo-
 res si rei difficultatem perpenderint, vel ipsi in arenam hanc
 aliquando descenderint, erunt spero aequiores; sin vero rei per-
 fectæ, atq; muneris absolutæ, fructum teneant animis præpon-
 deratum, tanti operis quantumvis inceptorî indulgebunt fa-
 ciles, atq; prompti adiutabunt consiliis, ut pluribus conantibus
 aliquid tandem, etsi non perfectum, saltem quod à perfectò
 haud vehementer abhorreat, Medicina studiosorum mani-
 bus teratur: atq; æstimatores nostri, si loco alio nullo, patien-
 tur, fuit hac saltem animi nostri significatio quadam, & tan-
 quam monumentum viris & doctioribus & otio maiore A-
 cademiarum professoribus inprimis (qui Regum stipendio vi-
 titant) abundantibus: quos ego per omnes musas, & Ascle-
 piadas patres obtestor, nunquam committant diutius, cum re-
 liquæ disciplina, & breuitatis & perspicuitatis luminibus

excellant, hæc una tam præclara, tam necessaria, atque adeo
 tam professoribus ipsis questuosa, heterogeneis impura sit,
 tautologiis molesta, tota denique vix ars aliqua, sed ignobilis
 quedam emperia habeatur. Ego si præpropere probro diluen-
 do me contulerim, dabitur iusto dolori meo. Dedi quidem cer-
 te operam (disco de Hygieina, & dabitur tempus sociam The-
 rapeuticam expromendi) ut de temperamentis, de partium
 usu, ac fabrica, de alimentis Physica, de generibus exercita-
 tionum gymnastica & palastrica, de alimentorum prepara-
 tione & apparatus, culinaria, heterogenea cum sint singula,
 cedant germanis Hygieine præceptis, qua indicata & con-
 clusa, definitionibus, partitionibus, distributionibus, affectio-
 nibus communibus & propriis comprehensa, methodo illa ar-
 tium tradendarum unica ab uniuersis ad singula disponere
 studuimus. Quo labore nostro multa reliquimus fateor cogi-
 tationibus posterioribus, quibus primo quoquo orio, & uberio-
 ra hæc, & distinctiora dabimus, interea præsen-
 tibus frui, & inceptis
 faus.

HYGI.

HYGIEINA, ID EST, DE SANITATE TVENDA, MEDICINÆ PARS PRIMA.



Edicina est ars curandi valetu- *Medicina.*
dinem corporis humani.

Medicinæ partes sunt duæ: *Eius par-*
ύγεινῇ & ὑεργεινῇ. *tes duæ.*

Υγεινῇ est pars medici-
næ, de sanitate tuenda.

Sanitas est corporis *ὑγεία.* *Sanitas.*
ὑγεινῇ actionibus salubriter obeundis apta.

Sanitatis membra sunt duo: Eucrasia, & salubris
Diaplasis.

Eucrasia est pars sanitatis, qua ad crasis proprias a- *Eucrasia.*
ctiones salubriter præstandas, primis qualitatibus
partes temperantur.

Eucrasie membra sunt duo: elementariū qualita-
tum mistio salubris, & calidi innati certa proportio.

Elemētarium qualitatū mistio salubris est, qua *Elemen-*
eis ipsis partes salubriter temperantur: vt, cutis tem *tariū qua-*
perata, ab hac ad calidum flectentes sequenti serie: *litatum*

Renes, Lien, Iecur, Caro simplex, Pulmo, Cor.

mistio:

Ad Frigidum.

Cerebrum, Spinæ medulla, Nerui tātum sentien-
tes, Nerui motionis, Vena: Arteria, Membrana, Ten-
do, Ligamentum, Chondrosyndesmus, Cartilago,
Os.

Ad Humidum.

Nerui sensus, Cor, Renes, Iecur, Lien, Caro simplex, Pulmo, Spina medulla, Cerebrum.

Ad Siccum.

Nerui motionis, Vena, Arteria, Membrana, Tendo, Ligamentum, Chondrosyndesmus, Cartilago, Os.

Hac de Crassis parte elementari; sequitur innati calidi proportio.

Innati calidi proportio.

Partes quo publica magis sunt aut his ortu vicinae, eo calore nativo vberius perfunduntur: vt,

Classe prima: Cor, Arteria, Pulmo.

Secunda: Iecur, Vena, Ventriculus, Intestina, Vesica fellea, Lien, Renes, Testiculi, Uterus, Vesica, urinae receptaculum.

Tertia & vltima: Cerebrum, Nerui sensus, Spina medulla, Nerui motionis, Membranae omnes, Tendo, Chondrosyndesmus, Cartilago, Os.

Hac de Eucrasia; sequitur Diaplasia salubris.

Diaplasia.

Diaplasia salubris, est pars sanitatis, qua corporis partes in organa, actionibus idonea finguntur.

Huius membra sunt duo: partium symmetria, atque harum constructio.

Symmetria partium.

Partium symmetria est, qua altera ad alteram existit analogia.

Symmetriae partes sunt duae: Partium quantitas analogia, & earum figuratio.

Quantitas.

Quantitas est, qua quantitate sunt analogae: estque vel secundum magnitudinem, vel secundum numerum.

Secundum magnitudinem, qua nec maiores, nec minores iusto sunt.

Secundum numerum, qua nec plures nec iusto pauciores.

Figuratio

Figuratio analoga est, secundum quam figuram naturalem quolibet sortita est. *Figuratio.*

Estq. figurationis analogia, vel secundum organorum cavitatem: vel secundum soliditatem.

In cauis requiritur eorum ipsorum libertas, & amplitudo.

In solidis, asperitas, leuitas, vel aliter pro naturæ suæ figuratio.

Hæc de Symmetria; sequitur Constructio:

Constructio est pars Diaplasis, qua organa inter se salubriter aptantur. *Constructio partium.*

Constructio continetur partium situ, atq; inter se nexu salubri.

Situs est, quo suam quælibet locum obtineat. *Situs.*

Nexus est, quo concinne partes copulantur. *Nexus.*


Hæc de sanitatis membris, cuius omnis Diaplasis ratio, melius ex anatomia, quam præceptis intelligitur.

Signa sanitatis sunt actionum operumque salubritas: quæ & tempestiua sint, aut porro quantitate, qualitateq. moderata. *Signa sanitatis.*

Sanitatis tutela continetur diæta.

Diæta, est ratio salubriter vtendi rebus ad vitam necessariis. Ex autē generibus distinctæ tales sunt: *Diæta.*

Sunt autem vel hominis



DE SAN. TVENDA, PARS I. 15

Dieta partes sūt duę: Diateretica & Prophylactica. *Dieta*

Diateretica est pars dietę, qua sanitas firmatur. *partes.*

Diateretica est duplex: Communis, Specialis. *Diatera-*

Cōmunis est, quę omnium sanitatis specierū est. *tica.*

Diateretica cōmunis primum caput est, gesta fo- *Cōmunis.*

mentis pro corporis viribus quantitate exæquare,

qualitate corporis crasi respondere. Ergo primū ge-

storum Diateretica communis, mox fomentorum.

Excretiones publicę primo irritamento, excer- *Diateresis*

nantur, & à somno nocturno, exporrecto, sine mo- *motus sui*

ra expediantur. *ipsius*

Priuatę, vt molesta sunt, egerant excremēta pri- *caussa.*

uata: hic cerebri anterioris, naribus emunctis, etiam

interdum vbi nil mouet, excrementa prolicienda.

Ablutiones, aqua dulci, temperata calore fiāt, pro-

fordium ratione, si vniuersales futurę sint: sin parti-

culares videlicet oris ac vultus, frigida curentur, at-

que os, sensoriaq. aluo ac vesica prius solutis, prolu-

antur, cura ne quid in auris meatum instillet adhi-

bita, ac demum dentes tergendī.

Exercitationes, & corporis & animi omnis mo-

tus vehementior, suscipiantur lente primum, tū in-

ualescant: alui atq. vesicę excrementis prius depofi-

tis, mane, ventre ieiuno, capite retrorsum bene pe-

xo. Sin exercitatio ea corporis sit, ante ipsam leni-

ter corpus fricandum, & vngendum oleo dulci; vel

ambulatiuncula præparādum. Ea autem vniuersalis

esto, cum vocis contentione; ac pariter animum ob-

leſtet: quō in genere parū pilę ludus excellit. Cef-

satio esto ante defatigationem: adhuc tumefcente

corpore, colore florente, concinne motus edente,

& cum vapore calido sudante.

Post exercitationem, vel molliter inambulandū,

spiritu contento, vel apotherapeia vtendum.

Esto autē exercitatio corporis omnis si sub dio sit

(quod saluberrimū) in vmbra parietis aut viridarij.

fin sub tecto, esto illud tectum longum 40. pedes, latum 18 altum 22.

Quibus vita laboriosa agitur, his labor exercitationis vicem supplebit.

Post cibum, quiescendum horam vnam, tū molli-
bus passibus incedendum, vt cibus descendat.

Ante coenam, satis erit vel celeriter deambulare.

Animi studium si vehementis sit contentionis, à
solis orta haud vltra horā ante prandiū durer. Man-
suetioribus autem studiis hora tantum vna pomeri-
diana impendenda, detumesciente iam ventriculo.

Perturbationes ne vehementer admodum cor-
pus agitent, curandum.

*Haecenus diateresis motus sui ipsius tantum gratia;
sequitur qui prolis item.*

*Diateresis
motus
prolis gra-
tia.*

Concubitus esto nocturnus: corpore exercitato
die hesterno, & moderato nutrimento, eoque con-
sueti refecto: à somno primo, cōcoctione perfecta.

Suscipiat autem (maxime maribus) non ante
expletum tertium septennium.

Mulieribus esto à purgatione menstrua quā mox
finita.

Concubitum somnus excipiat levis.

Mēstrua purgatio mulieribus à 14. ad 45. plus mi-
nus; iuuenibus luna noua, prouectioribus plena,
pro mulieris natura, satis copiose profluat, pragnā-
tibus, & lactantibus exceptis.

*Quibus
signis con-
ceptus
mulieris
deprehen-
datur.*

Concepisse mulierem, ac iam vtero gestare hisce
signis deprehēdetur: post concubitū, viri semē non
effudit. Et in ipso coitu horrorem quendā percepit:
& moderato dolore secundū pudendum, ac vmbili-
cū vexatur. Pudēdi sinus, atq. os, aridiora sunt: vteri
tamen osculo, nec duro, nec inflammato; sed ipsum
bene occlusum, & aliquantulū sursum progressum.
Tandem veneris appetentia languet, nec menses
consueti tempore apparent: venæ pectoris virent,
mammas

mammæ intumescunt; cavitates oculorum subpal-
lida fiunt; colli pars anterior, calidior, cervix frigi-
dior apparet. Et circa secundum mensem, fere falsa,
aut acida, appetunt. Si vrina subalbida, clara, nubilo-
so rore supernatante, ac stellati lapidis colorem præ-
se ferente; atomisque in ea ipsa ascendentibus, de-
scendentibusque fuerit, argumentum initii conce-
ptionis est, post a conceptu primo mense, ima sua
parte, candicantia corpuscula ad farinæ crassioris
speciem subsidet, quæ commota, carminati xyli, co-
toniue effigiem referunt, atque tempore adhuc ac-
cedente, flaua, deinde rubra, puniceaue, postremo a-
tra (nubecula parte superna rubore suffusa) euadit.

Vbi hæc signa apparuerint, vel horum aliqua, præ- *Prægnan-*
gnans censenda, atque tum omnem motum vehe- *tium dia-*
mentem fugiat, nec mammas cōstringat, nec nimis *ta.*
arcte cingatur. Atq; hoc toto gestationis tempore.

Mense octauo, tranquilla sit quoad fieri potest, &
cibos accipiat solito parcius, & (si cum pondere pen-
det) ventrem fasciis diligenter suspendat constri-
ctum: ceroto etiam ex oleo viridi, vel myrtino, vel
alio adstringente aliquo, cutem ventris oblinat: vt
solidior euadat, nec in partu conatibus rumpatur:
præterea sanguinalem herbam decoctam interdum
bibat.

Mense nono, inferiores partes latius obuoluat,
superiores perstringat: loci item vnguentis & mu-
cilaginibus mollientibus laxandi: & balneo frequē-
ti vtendum. Diebus autem partui propinquis, viris
abstineant prægnantes.

Vbi vero ipsum pariendi tempus instat, atq; par-
turi cœperit, super lectum iaciatur, strato duro,
pedibus duplicatis, ac femoribus expansis: atq; tum
digito peruncto, orificium matricis leniter, ac si-
ne quassatione aperiatur, cumque ad oui magnitu-
dinem corium percipitur, tangenti obstetrici, ad sel-

B.

*Quæ cir-
ca partu-
rientes ob-
servanda.*

lam leuetur. Atque si laffa, & imbecillis fuerit, in le-
cto pariat, alias, vel in sella, vel in mulieris femori-
bus parere poterit.

Toto partus tempore, calidum aerem sustineat,
& semper obstetricem adiuuet conatibus.

Si in lecto pariat, habeat obstetrix sedile modi-
ce inferius, vt ibi sedens, facile manus immittere
possit.

Sin autē sedens in sella paritura sit, obstetrix sella
humiliore sedeat, vt ex superioribus partibus infan-
tem possit adducere: pedibus interea expansis.

Ne pariens præ verecundia se concludat, obstetrix
faciem auersam habeat.

Parturienti autem omnia ligamenta auferantur,
obstetrix digito sinistro oleo calido peruncto orifi-
cium matricis circumagendo aperiat, vt corium il-
lic cadere possit.

Pariens, cum dolor occurrit, quantum potest, spi-
ritum cohibeat, neque clamet quicquam.

Si corium nondum rumpatur, obstetrix vngu-
ibus rumpat, vel caute dissecet, si rumpi nequit, &
immissis paulatim digitis, plus aperiat.

Matrice aperiente se, tum conetur parturiens,
cum concludit se, conari abstineat: atque obstetrix,
cum aperuerit se, prehendam secundas, & in diuer-
sum, huc atque illuc leuiter adducat.

A lateribus vero, ministræ sine quassatione, mani-
bus apertis deorsum deducant.

Cumq; exire foetus cœperit, manibus lino tenui,
ac molli moderate calefacto, extenso, eum suscipiat
obstetrix, & vt vna secunda exeant, prouideat: quæ
si resisterint, atque os vteri adhuc diductum fuerit,
& relicta secunda alicui parti conuoluta adhæserit,
manus sinistra calida, atque oleo illita in fundum
dimittratur, atque secunda extrahatur. Sin vero sit
fundo connexa, leniter, atque placide, primum in
obliquum

obliquum deducatur, huc atque illuc circumagen-
do, deinde paulatim validius attrahatur.

Sin vulva os clausum fuerit, vtendum perfusio-
nibus, & sinistrae manus digitis leuiter aperiendum,
& paulatim dilatandum Quod si minus successerit,
adhibendum adhuc perfusiones, fomenta hysteri-
ca, & vnguenta mollientia atq; laxantia. Atq; si ro-
busta satis fuerit, ex tempore sternutamenta, ex ca-
toreo, pipere, sinapi & naribus ad mouenda: potio-
nibus vtendum ex rosas pallidis recentibus, allio, ar-
temisia, althæa, pulegio, rubia & ceteris hysteri-
ciscis: ex quibus & suffitus, & fomenta parari po-
terunt, die primo, aut altero exactis.

Si nec his secundæ successerint, dilacerandæ non
sunt: nam haud multis post diebus, putrefactæ, & in
maniem resolutæ excident per se.

Si plures infantes vno deferantur, iterum, a supe-
riore, infernaque parte sic referes, vt omnia sensim
fiant, & citra confusionem: locis oleo perunctis.

A partu, spongia longa extergeatur, iaciaturq; in *A partu*
lecto cubiculo obscuro, pedibus modice patentibus, *quid a-*
ne quid foras effluere promptum impediatur. *gendum.*

Loci ipsi, pannis contegantur calefactis, & fre-
quenter mutantur. Sed & lanis mundis oportet, &
ventrem, & pectinem contegere: & ipsam partem
oleo viridi modico vino admisto irrigare.

Biduo a cibo abstinere conuenit, vel hunc liqui-
dissimum, & tenuissimum sumere.

Tertio vero die, encathismate calido, & perun-
ctione curata, aqua calida facies fouenda, cibandaq;
simplici cibo, pane aqua calida macerato, & pulti-
bus, & ouis sorbilibus: atque aquam calidam, vel a-
lium dilutum, atque calefactum potum, ad biben-
dum dabis.

Septimo autem die, vbi nihil obstiterit, lauacro
repente vti poterit, & variis cibis validioribus paulo,

*Ad reprimendum
lac puer-
perarum.*

& vino modico aqua diluto, vel potionē paulo meraciorē: ac sensim ad consueta pergat omnia. A partu satis purgabitur, si sanguis fluxerit vberius primo, secundo feculentus & paucus, nouissime purulentus. Nisi mater ipsa infantem lactet, stringendū ei lac ac reprimendum: principio modice repellentibus, linteo posca madefacto, & mammis appposito, ac post folia portulacæ trita cum aceto: oui album cum aceto agitatū: & cicuta trita, &c. sunt applicanda. Vltimo digerentia, cum modica astringitione: vt apium tritum cum aceto, & rosaceo, vel petroselinum aut cuminum aceto tritum, &c.

*Haftenus de gestis quibus motus adhibemus,
sequitur quies.*

Quies.

Quies esto, dum vires recreentur.

Somnus esto nocturnus: hora vna, aut altera, a coena ineatur, lecto consueto.

*Somnus
quopactō
peragen-
dus.*

Esto autem nocturnus, dum prima, secundaq; coctio absoluta sint: quod ex vrina colore flauo, percipitur, ructibus, ac ventre contractiore.

Dormiturus, incumbat lateri primū dextro, brachiis ac cruribus modice contractis: magis hyeme quam æstate, capite parum eleuato: vt caput altitudine par sit humero summo: ad finem vero somni, in finistrum se conuertat.

Particulari quiete (si sensus gestum sit,) mutandum obiectum, vel cessandum prorsus.

Sin motus sit, reponendum est membrum ea figura, qua maxime soluti sunt muscoli, motionis auctores.

Atque brachiis conuenit obtusangula: cruribus paulo minus porrecta, reliquorum membrorum, prout sese senserit quiescens maxime leuari.

*Fomenta.
Aer.*

Haftenus de gestis. sequuntur fomenta.

Aer purus esto: vt qui nec stagnorum, nec paludum (excipe Aegypti paludes quæ solæ salubres habentur),

bentur) nec fluminum vicinorum halitu perturbatur, nec barathro, nec metallis, nec sterquilini, aut cloacarum vicinitate inficitur, nec montibus vndique, ventis occluditur.

Alimentum, respondeat sumentis viribus, temperamento consentiat: si per se vires superet, sumendum parcius: si suppar sit, maiore quantitate quantum ad indigentiam explendam satis erit. Qualitate sapidum esto, vel arte fiat tale. Nunquam tepidum sumendum, nec potio. Sumatur suadente appetitum: vespere minus sumendum, & alimenta nutriendi viribus imbecilliora: qualitatibus, quam in prandio paulo calidiora, siccioraque: ut, cibo in tria distributo, partes duae meridie sumendae, tertia sub noctem. Atque potus tum parcior, & paulo meracior esto. Tempora cibi, ac potus eadem sint. Sumantur autem, post turbationem corporis, ab ista exercitatione sedatam.

Cibus potum praecedat, liquidus solidum, concoctu facilis, difficilem. Incipiat (si qua sint) a salsamentis, oleribus, ac similibus. Et tum caro. Cibi omnes vna mensa sumti, sint omnia quoad fieri potest similima virtute, temperamento, materiaeque firmitudine. Esto ex bene habitis omnibus, nec senio confectis.

Panis esto fermentatus, autopyrus, sale aspersus.

Si potus ex aqua sit, esto aqua illa pura, limpida, omnis saporis expers, tenuis, ac levis. Ut pluuiialis, quae sine aestatis, vel principio autumnus, vel aestate media fluit, silente coelo. Mox, quae cum tonitruis descendit, tertio fontana omnis, cuius fons ad solem orientem erumpit, curritque super arenas, ac terram puram. Si cereuisia sit, fiat ex frumento bene maturo, pleno, ac puro, & ex materia pura nec fuliginosa, nec putrida igni succenso, bene elixetur.

Inter cibandum, pitissando, per vices, alternis mo-

deratis, sumto prius cibo, bibendum : mensura, pro ciborum siccitate, vt penitus diluantur. Sin vero a cibo vrgeat sitis, cocto iam cibo in ventre, affatim bibi potest. Etiam longiore temporis intervallo interposito, interdum liberaliter potare corpore duro, conducet.

Cauendum maxime ne tempus edendo potandoque protrahatur, quin bene mansus cibus nec nimis festinanter, nec lente nimis sumendus. Potio item sensim haurienda. A cibo, si quid dentibus ipsis inhæreat, lentisco, aut salice, purgandi sunt : & os (si ea glutinosa sint) vino proluendum, vel detergente aliquo.

Foris ambientia.

Hac de sumendis, sequuntur foris tantum ambientia.

Ea munda sint omnia.

Ædes.

Ædes ex materia sicca fiant, & minime cariæ, & parietibus bene crassis.

Plateæ.

Hic ciuitatis viæ, & plateæ, saluberrimæ sunt orienti, occidentiq; soli patentes, & recte, atq; inter se distantes æque. Ex yrbium partibus, aditissimæ sunt saluberrimæ. Vestimenta apta corpori sunt, & ex materia pura, nec nimis pondere grauate, satis tamen ad aeris ambientis iniurias densa.

Vestimenta.

Huius Diætæ anomalia communis, est ex consuetudine (consueta namq; (nisi insigniter dant) meliora) & vitæ ratione.

Diateretica specialis.

Hac generalis diateretica : sequitur ex sanitatis speciebus specialis.

Sanitatis species sunt duæ : Accurata & deflectēs.

Accurata.

Accurata est, cuius cataſceue, ad opera summe disponitur.

Hinc namque opera, & corporis qualitates, perfectissima sunt, ac primum actiones animales motibus validæ, & concinnæ : sensus integri, insomnia leuia, & interdum de astris agilibus, ac splendentibus.

bus, diuos aliquid boni dantes, & mortuos puris, vestibus ac albis indutos etiam dona porrigentes in somnis interdum vident, nec ipsi somnolenti, nec peruigiles.

Cupiditates intra modum.

Thymoses virtutibus consentientes.

Pulsus ac respiratio, ad ceteros moderati.

Actiones naturales tempestiuæ, opera proprie dicta: tam humores, quam excrementa, nec quantitate nec qualitate admodum molesta.

Ex humoribus, sanguinis massa ita temperatur, vt huius sanguinea pars sit maxima, & copiosissima, mox pituitæ dulcis, tum melancholica, & crassa. Vltimo bilis, minima portio sit.

Deiectio inter durum, atque diffuens consistentia mediocri, colore paululum bile tincta, quantitate respondens esculentis.

Vrina, consistentia existit mediocri, clara, pellucida, pura, colore subaureo, hypostasi alba, leui, & æquali, in acutum fastigiata, quantitate respondens poculentis.

Corporis aliena qualitas nulla, aut grauis. Color cutis floridus, & tanquam ex albo, & rubro pariter mistis.

Crines capitis flauī in vigore ætatis dum puer, fuluiores pili, inter densos, & tenues moderati: inter crispōs, ac rectos medii.

Corpore habilissimo, ac dignitate summa.

Difficile foris occurrentibus offenditur, & æqualiter se habet ad excessus omnes: siue ex anni tempestatibus, siue ex erroribus diætæ.

Hac de signis acurate Sani, sequitur huius

Diætæ.

Hic exercitationibus, ac studiis moderetur.

Somno sufficiant horæ 7. vel octo:

Stratum esto inter durum, ac molle moderatum.

B 4

*Accurate
sani diætæ.*

Circa res Venereas gerat se moderate.

Aura temperata qualitatibus esto, vel arte temperetur.

Si calida sit, refrigerantibus vt rosis, violis, vitis foliis, & capreolis, salicis frondibus stratis, ac appendis. Vel frigida alternis, de vase, in vas, crebra effusione: aeris ventilatione, &c.

Frigida, luculento foco: ex materia sicca & pura, aromatum suffitu, vel stirpium odoratarum: vt luniperi, roris marini, lauri, sampsuchi, &c.

Sicca, aqua vaporibus.

Humida, suffitibus, ac ignibus.

Si duabus qualitatibus aer excesserit, tot item gradibus aduersis temperetur, qualitatibus duabus.

Nutritum: Panis esto hesternus, ex tritico trimestri, maturo, puro, denso, fractu contumaci, colore aureo cuiusmodi est primum Siculum 2. Aphricum 3. Thracium 4. Assyrium 5. Aegyptium 6. Italicum, cetera vulgaria, nec ex recens nimis molita farina, nec præter modum pista: aqua saluberrima bene subacta, & sale, ac fermento, ad gustum condita.

Et ex tota farina confecta, in moderatos panes diuisa, clybano nec vasto, neq; angusto, eoq; depresso, bene cocta. Cibus reliquus esto pro viribus alendi moderatis, & temperamento temperatis, elixis, vel assis, omnibus humore suo turgentibus.

Ex carnibus Quadrupedum: Hædina, vitulina, maxime lactens, tum non lactens: deinde, agnina non lactens, iuuenis castrati ex agnis suilla iuuenis, capreolus: cuniculi iuuenes, quadrupedum lingua, & glandula. Gallina castrata, ex volucris, anserum ala, ac ventriculus, gallinacei iuuenes.

Gallorum Indicorum, phasianorum, gallinarum, agrestium, attagenarum, gallinarum perdicum, phasianorum oua, cum cortice elixa, atque tantum tremula, nec tamen forbilia: suffocata, mollia, & horum vitelli, maxime recentia omnia. Lac

Lac recens, nec partui proximum, bubulum, cum
ale pauco, melle, vel saccaro, solum longe ab aliis e-
luliis, ventre ieiuno post quod os vino adstringen-
te proluendum, & dentes tergendi,

Caseus ouillus, recens, ac mollis, nec admodum
salsus, nec nimis coagulo feruens, omnia locis salu-
tibus, ac temperatis nata.

Pisces puræ aquæ indigenæ, rapidæque, & nutri-
mento puro vtentes, modicæ magnitudinis, carnis
albæ, friabilis, pinguedinis modicæ: & ex marinis,
saxatiles vt scaræ, merulæ, turdi, iuliæ fusæ, perca,
item puri, maris aselli, mero. Ex stagnis marinis
rhombus sparus, mullus, buglossa, passer, denique
ex ceteris marinis cynedus, acus, hepatus, citharus
scorpius, erythrinus, coracynus, pagrus reus, torpe-
do, &c.

Ex fluuiatilibus Salmo, truta, perca, lampreta, flu-
rio, dracus, rubecula, gobiones, &c.

Ex oleribus malua ac lactucæ parum, ficus recen-
tes, ac vuç, maxime passule, pyra dulcia, ex fructibus.

Potus, vinum viribus moderatum, vel cereuisia,
ætate vtrumque moderatum.

Domus habitationis esto ad orientem, meridio-
nalemque solem. Sita loco nec edito, nec nimis hu-
mili.

*Atq; hac accurate sani diætæ esto, sequitur anoma-
lia ex vitæ instituto.*

Hic namq; si præceptis his vacare nequit, & spon-
tis suæ sit, nullis se diætæ legibus obligare debet. Sed
varium vitæ genus sequi, modo ruri esse modo in
vrbe, sæpius in agro, nauigare, venari, quiescere in-
terdum, sed frequentius se exercere, interdum bal-
neo. interdum aquis frigidis vti, modo vngi, modo
negligere, nullum cibi genus fugere, quo populus
vtatur: interdum in conuiuio esse, interdum se re-
trahere: modo plus iusto, modo non amplius su-

*Anoma-
lia ex vi-
tæ institu-
to.*

mere: bis die potius quam semel cibum capere: & dummodo coquat, semper quamplurimum: concubitus nec nimis concupiscere, nec nimis pertimescere.

Hac de sanitate accurata atq; huius diata, sequitur deflectens.

Sanitas deflectens. Sanitas deflectens est, quæ ab accurata deficit: huius signa sunt deflectentia opera.

Diata tot gradibus esto deflectens.

Deflectens duplex est: temperie, vel cōformatione.

Temperie deflectens. Temperie deflectens est, cuius crasis deflectit.

Signa sunt crasis opera deflectentia, ut nutritio, eiq; seruiētes actiones naturales, & inde nata opera.

Diata temperamento tot gradibus deflectat: si vitæ ratio impedierit, error in contrario potius quam in simili committatur.

Crasi deflectens est duplex: vel ad calidum, vel ad frigidum.

Temperie deflectens ad calidū. Calidæ deflectentis signa: iracundiores temperatis sunt, pulsus maiores, frequentiores, & respiratio talis, infantes dentunt, augeſcunt, & ceteris articulate citius loquuntur.

Coſtitio durorū ac validorum: vrina atq; deiectio coloratiora, iam maturi, veneris appetentiores, semen his crassiūſculum, & feruentius: masculorum generatores, temperatis percipiūtur calidiores. Colore rubido sunt, pilis nigris, hispidis, cito natis, venis latis, graciles, & adipis expertes, nisi vitæ institutum & consuetudo impedierit, caleſcunt promte.

Diata: totidem gradibus calida omnia.

Calida, Humida signa.

Calida, humida signa. Sensus hebetiores, ac motus temperatis tardiores, insomnia visis plena, ad iram proni, nec tamen feri. Pulsus molles, sanguine redundant, facile venerem ferunt, ætate ad eam maturi cito semen excernunt, semen his multum, consistentia paulo humidius.

midius, spumofum, excrementa copiofa, & moderate cocta. Color eis sanguineus: Corpus mollius, & carnofius temperato. Capilli fufflaui, recti, plani, craffi, molles, caluefcetes tandem.

Calida, Humida Diata.

Calida humidaque pariter efto.

*Calida hu-
mida dia-*

Exercitatio his conuenit modica, & fenfim adhibita, leuiter calefaciens, balnea calida, vnctiones, & ex oleo friftiones. Somnus temperatis prolixior. Stratum mollius, vmbra tepens, orium, mora in lecto plufcula. Venus temperato rarior.

Alimenta mollia & concoctu facilia.

Domeltica, nec crudiura, nec voracia, herbiuora, non frugiuora, multibiba, tenella, minus exercitata, locis depreffis. nec editis procreata.

Pifces cartilaginofi, anferum carnes lacte nutritorum, anatis, & volucrum paluftrium, pifcium capita, ac ventres. Alimentum fape fumtum, ac multum fi vires ferant.

Oua affa, vel elixa, nec tamen dura.

Lac afininum, bubulum, caprinum cum melle.

Ex oleribus rapum. Ex fructibus ficus virides, botri vuarum, pyra matura, vinum rubellum, vel fuluum, paulo calidius, & meracius, temperato.

*Flectens
atate in-
crefcendo.*

Si ætate increfcente flectat, eaque tenella fit, ita deinceps ad vigorem curanda: Infantia: autem fanæ indicium eft, fi mater toto geftationis tempore fana fuerit, & infans ipfemet eiulatum recens in lucem editus fatis validum ediderit.

*Infantia
fanæ indi-
cium.*

Itaque quamprimum recens natus eft infans, vbi modice requieuerit, ab eius vêtre digitos quatuor, fcalpello, vel culto acutiffimo, præcidendus ei vmbilicus: eoq; præcifo, fanguis inibi reftans exficccandus: & lana torta vel licio, vmbilicus ligandus tribus digitis a ventre mefuratis: deinde duplicatus vmbilicus, & lana inuolutus leuiter in medio com-

*Infans re-
cens natus
quomodo
curandus.*

ponatur, & supra vmbilicum, hapsus lana madesa-
ctus imponatur ad vmbilici figuram formatus, tum
puellum muria pauci salis (oculis cautis) prolues, vel
sale asperges, delicatioribus totum corpus succo
ptisanæ vel fœnigræci detergendum. Atque deinceps
bis die, horarum aliquot interstitio post cibū,
ablues, loco obscuro & temperate calido. Lauatrix
autem manu dextra (leui brachio eius pectori ad-
acto) infantemprehendat, & æstate aqua tepida,
hyeme calida generoso ve temeto, ouorum vitellis
duobus adiectis, a colluue omni exquisite peluat:
atque (vnguibus præcis) sordes naribus, digitis ex-
primat, atque aures, & anum, minimo digito pur-
get, anumq; disparet oris omnem saliuam (immissio
digito) tollat, & leuiter gingiuas, & linguam con-
fricet. Cumque corpus eius viderit aliquantulum
calefactum, tum in tepidam eum deponat, ac madi-
dum iam infantem molli linteolo desiccer: & mem-
bra singula, leuibus pressuris efformet: atque excul-
tius effingat. Vesicam (vt lotii egressus facilliter fiat)
deprimat, & molliibus linteis, ac pannis leuibus, bra-
chiis ad costas porrectis obuoluatur demum, insti-
tisque (capitio capite operto) peruinciatur, & in i-
psius nares oleum coniciatur: deinde (capite super
latus eleuato) cunabulo suauiter semicirculari mo-
tu quasso, succentante quapiam, obdormiat: loco
temperato, nec valde lucido, nec strato, aut capitis
puluino valde molli.

Dum satis solida fuerint membra, fascinandus:
tumque sensim fasciæ auferendæ. Postquam vmbi-
lici pars ceciderit, (id quod fere vel quarto vel quin-
to die contingit) cochlearum testarum cinere in-
spargatur, aut tali suilli, &c. atque frustum plumbi,
denarii magnitudine cauum vmbilici effingat.

Nutrix.

Puerum in vlnis gestet nutrix iam tres menses
quatuorue natum: semper antequam lactet: nec
vnquam

vnquam post, quo tempore, & vagire infans poterit. Vsq̃ue dum parentis temperatura pristina naturæ restituatur, infantem alia atque mater lactet nutritrix. (ante diem quartum, matris vbera ne attingat) bis ter, vel sæpius die (primo excepto) quo die, octo, vel decem horas post omnem commotionem, summat modicum mellis decocti, atque despumati, quo nutritrix os eius illinat, & mulsam tepidam post instillet. Tum, die secundo, lac offeratur.

Nutritrix vero, talis eligatur: Ætate inter 25. & 35. *Qualis* vel saltem haud quadragenaria senior: quæ bis, aut *nutritrix e-* ter pepererit. Coloris viuidi, fortis, ac robusti colli, *ligenda.* pectorosa, musculosa, duræ ac multæ carnis, nec obæsa, nec gracilis, cuius mammæ solidæ, ac firmæ sint: media magnitudine modicamq; duritiem obtinētes & papillas magnitudine moderatas, nec cauer-nosas, quibus lac plurimum sit: odoratū, candidum, perdulce, equabile, nec admodū crassum, nec tenue: quod pollicis vngui instillatum dum ad lucem consideratur, inflectendo vnguē, neque cito, neque tarde, defluit.

A partu esto 45. vel 60. soles, maremque pepererit, nec abortire assueuerit: porro sana esto, & moribus integris, coitu abstineat. & conceptum fugiat: quæ si conceperit, alia eligenda. Optimis alimentis vtatur, ac satis se inuitet liberaliter.

Primis diebus quibus lactare incipit, simplicem cibum, ac leuem, accipiat: & potum dilutum bibat: postea, prout robustior puer euadit, cibos solidiores ne recuset: Omnia præterquam dulcia fugiat, saporibus insignia.

Antequam applicetur mamma, si mater ea sit, crassum ex vberibus emulgeat prius, & aqua calida moueat vbera.

Nutritrix inambulet primum, post mammam fricet, & modico post lauacrum tempore, infantis ori.

applicet: & prius singulis vicibus, mellis pauxillum ex paucō vino lingendum tribuat: item lactis aliquid emulgeat, & mamillā preffione infantis fuc-
cionem iuuet. Singulis lactationibus copiam parā adhibeat: modo dextra, modo mamma sinistra.

Lactandi vero tempus opportunum, cum labia frequentius mouerit, eaq; aperuerit sapius.

*Defectus
lactis.*

Si lac nutrici defecerit, vberius alendum, & cibi succi melioris dandi: si penuria caussa sit, sin alius minus soluta, & hæc sistenda. Exercenda partes super-
næ, vbera fricanda, & spongiis ex aqua tepente fouenda, & oleo irino, vel simili vngenda.

*Lac au-
gentia.*

A proprietate lac augent lumbrici terræ quinq;, vel septem, triti cū palmulis passis ex zytho, vel ce-
reuisia coctis poti, ieiune ad dies decē. Et feniculum aut anethum viride, cum ptisana coctum, & ad sor-
bendum datum, lactis prouentum faciet, sic perdi-
cis oua sorptui data, & cancri cum lapatho, & apio

*Lac cras-
sum.*

in iure cocti, &c. Lac si nimis crassum fuerit, nutrici pituita vomitu eliciatur & laboribus cibum prae-
cedentibus pluribus extenuetur, & cibi succi tenuioris vsurpentur: & condimentis vtatur acrimonia ex-
pertibus: atque in iusculis origanum, hyssopum, sa-
tureiam, thymum, &c. sumat.

Lac acre.

Sin vero lac acre fuerit, nutrix balneis dulcium a-
quarum temperatis & cibis euchymis, & tempera-
mēto moderatis, corrigenda. Et priusquā puer mā-
mæ admoueat, omne lac vitiatum emulgeat. Te-
nue vero si fuerit vtendū in cibis pultib. ouis elixis,

Lac tenue

& coctis, alica, pane similagineo. pedib. atq; extremi-
tatib. porcinis, carnibus hoedinis, volucris tenerio-
ribus, ac vino dulci. Exercendum & his est validius.

*Coagula
tum.*

Si lac coagulatum fuerit, mentha contusa, vel pu-
legium cū farina seminū leni, vel scenigræci, paucō
aceto admisto, mammis applicandum, vel succus
apii, cum cicerū farina, & aceto mistus, & applicatus,
lac coagulatum dissoluet. Post

Post annū & sex menses, est ablaſtandus: aut ſup-
 leto biennio: lacteq; ſolo eſt alendus, vel alimento
 rulento dū inferiores dentes ediderit. Dentire autē
 ere incipiunt infantes 7. menſe, quibus tum multa
 ris ſaliua, & gingiuarū dolor, ac vĕter ſolutus: quo
 tempore, a durorum maſticatione abſtineant, ma-
 illa lanis ſuccidis, oleo chamamelino intinctis ſo-
 eantur: ac gingiua butyro, ac melle, pariter miſtis,
 euter fricentur: & aqua calida foueantur.

*Infans
 quando
 ablaſtan-
 dus.*

Cum prædictos dentes ediderit: tum bene præ-
 anſum dato cibū, atq; cum ablaſtandus eſt, paucis
 nte diebus, conuenit offerre micas panis in mulſa,
 el in lacte ſaccharato infuſas, vel pulſes: tumq; raro
 didas applicare, & nouiſſime prorſus lac negare,
 e quæ amara ſunt mammis illinere, potum bibat
 um dilutū, & ex vaſa papillæ formā imitante, ore
 o exſugat. Atq; prout ætate, ac robore creuerit: a-
 mentis vtatur ſenſim firmioribus, quā in ipſa pri-
 na infantia, omnibus tamen liquidis, & calidis.

Ne infantes in vehementes animi motus incidāt,
 magnopere cauendum: & in primis ablato eo quod
 noleſtum habet (quod interdum ex diuturnæ qui-
 etis tædio oritur) vel papilla indita, vel vocis modu-
 atione, vel motu mediocri, idq; vel in cunis, vel in
 lnis, vel pendentibus lecticis, ſedulo placandi.

Per ſe moueri queunt, cum cœperint repere: ac
 um vehementes motus cauendi, nec ſibi motibus
 credendi.

Postquam lacte nutriri infantes deſierint, libera-
 iore eis modo, & ſuo ingenio, hilariter viuere per-
 mittendi exercitiis. Vtantur, & alimentis leuiori-
 bus, viſtu tamen vberriſimo & ſæpiuſculo dato.

Cum puer a ſomno expergiſcitur, balneo fouen-
 dus: deinde dimittendus ludere, hora poſt edere
 dandum aliquid: deinde ludat diutius, poſt, balneo
 fouendus: tumque iterum cibandus.

Tertium aut quartum annum agentes, nauigio aut vehiculo modice agitari sustinent.

Septennes, equitare queunt.

Ab anno sexto, vel septimo, tum pueri, tum puella, litteratoribus blandis, humanisque tradendi, atque tum nō erit necesse balneis assiduis uti, sed hoc tibi instante, mediocriter exerceat, atque (per calidiores) a cibo, frigidam potare queunt.

Duodecimum egressi, ad Grammaticos, & Geometras mittendi, & corpora magis exercenda.

A decimo quarto ad vicesimum primum, Mathematicis disciplinis, & sapientiæ studio incumbant, & pluribus exercitiis ad corporis robur credantur.

Ætate florentibus, labor, & exercitatio validior conuenit, item cibus plenior & valentior.

Haëtenus de flectente calida humida, sequitur calida sicca deflectens.

Calida sicca deflectentis signa.

*Calida
sicca de-
flectentis
signa.*

Motus perfectus: mobilitas in opinionibus, celeritas motus, somni leues, breuesque: insomnia (si qua) ignea, ingenii celeritas, audacia, temeritas, ad Venerem procliuiore prædictis, cito satiati, vox clara, aspera que, coctio validior; Calidis humidis, excrementa pauca, semen paucum, densissimum, crassissimum, globosum, feruens, tarde excretum. Valde hirsuti corpore, capitis pili cito, & multum aucti, nigri colore, caluescunt tandem facile, firmum, articulatum, musculatum, & pinguedinis exsors totum corpus: cutis dura, ac nigella.

Dieta.

*Calida
sicca. dia-
ta.*

Matutinæ deambulationes plures temperatis, & labores, balneum calidius, frictio ex oleo calefaciente. Sudores, deambulatio acuta ab exercitatione a cœna

coena tarda in tepore. Sol, ignis, coitus frequentior temperatis.

Somni longiores ieiuni, vigilia ieiuna, stratum durum, coena contenti esse poterunt.

Nutrimendum validum, & multum si vires ferat etiam ex carnibus animalium robustorum, ac ceterorum vino conditorum, & sale, suis sylvestris caro, cerui, leporis, omnia volucrum genera.

Exceptis palustribus, maxime his conueniunt pambes, columbae, perdices, galli, turtures, seminileges omnes.

Cicuriū animalium sylvestria, sylvestria omnia. Crudiūora, sylvarum materie pasta, non voracia, faciliūora, frugiuora, sanguinea, parcibiba, vigētia, macula, nigra, hirta, assa omnia. Ex locis siccis, & estuosis petita. Ex piscibus: draco, scorpius, callionymus, muculus glaucus, perca thryssa, conchilia omnia, piscium partes supernae, salsamenta marina, panis ex tota farina clybano coctus, & subcinericeus. Maza recens subacta, polentae ac farinae recentes, panes calidi, mel, sorbitiones nullae potiones parcae.

Olera acria: allium, cepe, porrum, raphanus, nasturtium, &c. vinum nigrum, lene, calefaciens, ceruicia valida, ac generosa.

Hac de flectente calida, sequitur de flectenti frigida.

Flectentis frigida signa.

Pulsus temperatis minores, & respiratio huic analoga, timidi, ad actiones segnes, ad iram tardi, venis minus appetentes, nec sensibus admodum valentes. Corpus tactu frigidius temperato perceptū, refrigeratio prompta. Cutis rufa, atq; si multum excesserit liuida, glabra, capillus rufus, adeps per carnes sparsus, capilli, multo post natalem orti, tenues, & male nutriti, stabiles, canescentes tandem, nec omnino caluescentes.

*Flectentis
frigida signa.*

C

*Diata.**Diata.*

Eatenus refrigerantia omnia, quatenus sanitas deflectat.

Frigida deflectens duplex est.

Frigida humida, vel frigida sicca.

*Frig. humida deflectentis signa.**Frigida
humida
deflectentis
signa.*

Sensus obtusiores, motus item tardiores, somnolentia, ac somnus grauis, & profundus, pulsus molles, ac parui, iræ minime tenaces, penis tarda erectio, emissio seminis velox.

Excrementa multa, semen tenue, aquosum rarum, aquosum candicans, spumofum, frigidiusculum, femellarum prolificum.

Corpus molle, laxum, rarum, pili (si qui sint) per corpus albicantes, mollissimi, atque planissimi.

*Diata.**Diata.*

Vehementibus abstineant tam animi, quam corporis motibus, hilariter tamen degant, atq; vmbra- tilem vitam sectentur, & lentis motibus gaudeant, parce exerceant se, balneum aquæ tepentis ieiunum, & ante id, ambulatio matutina multa exercitationis loco esse poterunt, balneum tepentis aquæ secundum cibum, somnus secundum cibum, atq; is secundum prandium brevis sedendo, calceis exsuti fricentur interdum ex aqua, & oleo. A cœna surgant tantum. Somno indulgeant liberali, strato molliusculo: Venus his conuenit rara.

Alimenta mollia sint consistentia: facilia concoctum, & ex his pisces, & ex piscium partibus capita, ac ventres. Ex carnibus: domestica, herbiuora, multibibula, tenella, ex sanguia, femella, castrata, alba, nuda, minus exercitata ex locis humidis, nec æstuosis, iuscula crebra, cibi pauci, & frequentes, succorum acidorum intinctus, pingui aliquo admisto.

Suum

Suum petunculi, articuli, rostra, alæ.

Panis hordeaceus, vel auenaceus, aut ex vetustis
farinis maza, oxygalâ, fructus cum aliis cibis.

Lactenue: olera insipida, acida.

Potio diluta, & satis larga.

Ædes, ad Aquilonem, & occidentem solem: lo-
co humili, atque depresso sitæ.

Deflectentis frigidi, sicci, signa.

Corpus dâriuseulum, tenue, sensus in iuuentute *Flectentis*
tantum vigentes, respiratio, & pulsus tardiores, ac *frigidi* *se-*
tiores: irasci coacti, difficile placantur: sanguis his *ci signa.*
parcus, & semen paucum.

Dieta.

Laboribus his incumbendum prædicta pluribus, *Dieta.*
motus veloces, somni ieiuni, & a matutinis deam-
bulationibus.

Calida balnea ieiuno plurima, cœna cõtenti sint,
vigiliæ, stratum durum.

Nutrimenta: carnes animalium robustorum ace-
to maceratorum, & conditorum, & eodem modo
condita: cicurium syluestria, & agrestia omnia, cru-
diuora, sylvarum materie pasta, nec voracia, fœni-
uora, frugiuora, sanguinea, parcibiba, vigentia, ma-
scula, nigra omnia. Intinctibus frigidis, siccis, vel
condimentis similibus, frigida, atque sicca, arte red-
dita. Ex locis inaquosis, & æstuosis petita: volucrum
genus: palumbis, columbæ, perdicis, galli, turturis,
volucres seminileges. Ex piscibus diaco scorpius,
callionymus, cuculus, glaucus, perca, thryssa, affa
omnia: conchiliorum omne genus. Salsamenta, ma-
xime marina: mox fluuiatilia: tum palustria, &c ex
salsamentis percæ siccissimæ: Panis ex tota farina,
elibano coctus, & subcinericeus: hordei polentæ,
ac farinæ vetustæ: holera frigida, sicca, vel præ-

C. 2.

paratione talia: vinum austerum, tenue, & cereuisia similis. Hic ex senili atate anomalia oritur: His nāq; aer calefiat, & humectetur: & balnea quotidiana sint aquarum dulcium calida: & exercitationes leues, parca, & quies multa senibus conueniunt: atq; somnus longior & frictiones ex oleo matutina, moderata: ac tum gestatio, vel deambulatio: vitam lætam transigant, & venerem fugiant.

Cibus modicus, humectans, & calefaciens, in tria tempora vel plura partitus: hora tertia panis purus, & bene fermentatus cum melle despumato: circa horam septimam, frictis, exercitatis, ac lotis, prandium, ac in prandio aluum subducentia, ex oleribus beta, & malua, tum pisces saxatiles, atque pelagiorum genus optimum, vt scorpius, cytharus, heparus, umbra, laccia &c. primo post prandium, in lecto quiescant: Deinde moderato motu vtantur.

Ad vesperam coenantes piscibus abstineant, sed carnes sumant ex simplici iure decoctas. quinetiam ante cibum iuuat ficos dulcissimos virides, & maturos esse, & hyeme caricas.

Senibus si quando aluus, astricta est sorbendum oleum dulce ante cibum, vel clyster tepens infundendus. Ex oleribus: borago, buglossa, &c. acriuscula conueniunt. ex fructibus vix maturæ, passulæ, amygdala, nuclei pini, pistachia, potio: vinum calidioris naturæ, substantia tenuissimum, colore fuluo, vel pallido, vt Falernum, Surrentinum, Arusiū, Lesbium, Mysium, & Tmolites, capite firmis, imbecillioribus: Adrianum, Sabinum, Albanum, Gabriannum, Triphylinum vetustum omne, vel cereuisia satis generosa & mediæ ætatis, quibus borago, buglossa, & citrigo salubriter misceantur.

Ædes ad meridiem, loco humili.

Vestimenta villosa, & calefacientia.

Hactenus Diaterica Eucrasia flectenti.

Deflectens

*Deflectens secundum conformationem fere raro, atq;
denso corpore continetur.*

*Deflectens
conforma-
tione.
Rari.*

Rari corpore maximam partem calidiores, humi-
dioresque existunt: & tactu molles, & facile ac cito
exercitatione sudantes, atq; laboribus cito exsolu-
ti, externis facile offenduntur.

Dieta.

Exercitatio moderata, balneum temperatum, &
frictio ex oleo molliuscula, moderata hilaritas, ve-
nus.

*Dieta ra-
riorum.*

Nutrimendum coctu facile, ac lentoris expers. Ex
quadruped. animalium siccorum lactentium, hœdi-
na, vitulina, agnina non lactens. &c. Ex volucribus,
gallinacei, capones, phasianorum, &c. Ex piscibus, sa-
taxatiles, & omnes molli carne, atq; friabili præditi.

Panis autopyrus, bene subactus, fermentatus, &
sale conditus, ac furno satis coctus.

Oua tremula, caseus oxygalactinus, & recens.

Ædes ad meridiem fixæ.

Vestimenta satis crassa, & ex panno densæ textu-
ra, vel pellibus confecta.

Densi corpore.

Densi.

Horum signa sunt raris contraria.

Dieta.

Exercitatio corpore raro minor, ac parcior, frictio
item parcior, & duriuscula. Cubile durum.

*Dieta
densiorum.*

Nutrimenta substantiæ tenuioris quam corpore
raro, panis hotdeaceus, & clybanitis ex tritico, pisces
saxatiles, & ex cartilagineis, torpedo, & turtur, & a-
picula montosa, & turricola, ac vineas colētes: tur-
tures, ac perdices die vno mortuæ antequam edan-
tur: fructus, mora, cerasa, ficus, pruna, carica, nuces
pistachia, amygdala amaræ, pisces aceto & muria
conditi nec non carnes suilla salsa, & exsucca, po-

tus: vinum flauum, dulce, & splendidum, Aruifinum, Lesbium, Falernum, & Tmolites, vel cereuifia diluta, vel mulla tenuis.

Ædes ad Orientem.

*Hactenus de Hygieinæ parte diaterica, fequitur
Prophylactica.*

HYGIEINAE PARS PROPHYLACTICA.

*Prophy-
lactica.*

Prophylactica eft pars Hygieinæ, qua fanitas in morbos prona erigitur.

Prophylacticæ partes duæ funt.

Sanitatis nimium flectentis emendatrix.

Et errorum Diætæ correctrix.

Nimium flectentis fanitatis figna funt opera nimium flectentia.

Diætæ: Sanitas deflectens nimis, tot gradibus contrariis vel etiam pluribus, fenfim per otium retro agenda.

*Emenda-
trix.*

Sanitatis nimium flectentis emendatrix eft, vel crasis, vel conformationis.

Crasis figna nimium flectentis funt huius opera flectentia. Diætæ huius, efto crasi tot gradibus contraria.

*Crasis
quando ni-
mum fle-
ctat.*

Crasis nimium flectit, vel cum aliqua tantum membra crasi flectant, vel cum pariter omnia.

Alicuius tantum membri, vel aliquorum flectentium figna funt, eis ipsis opera propria flectentia nimium. Suntque fere partes publicæ, ac principes, vt Caput, ventriculus, cor, pulmo, iecur, lien, testes, uterus.

*Capitis calidi figna funt toti flectenti communia fecundum
capitis actiones & opera. Tantum nimium fle-
tere, huic proprium correctio.*

Lotio-

Lotiones refrigerātes, ieiunæ, corpore prius quo- *Correctio*
 dianis excrementis vacuato, atque exercitato, ac *capitis co-*
 tam lotiones: ac post eas, vnctiones refrigerantes: *lidi.*
 Odoramenta frigida, & inodora, naribus sæpius ad-
 nota ex frigidis. A cibo, fructus frigidi, & austeri.
 itent soles, maxime a cibo, & a vini vel cereuifiæ
 portis potu. Potio esto diluta Cogitatio post cenam
 xix tuta, a qua ambulatio sub testis sit. His oculi ma-
 ne, vel die, sæpius frigida multa fouendi.

Cerebrum calidum humidum.

Frictiones capitis ieiunæ multæ, lotio tepens, ex *Cerebrum*
 frigidorum, siccorumq; decocto: vt rosas, violarum *calidum*
 foliis, foliis salicis, vitis capreolis, ac foliis cynosbati, *humidum.*
 centinodii, aranciorum, limonum, &c. paucis aceto
 decoctis infuso.

Vnctiones fiant ex rosaceo, myrtino, melino, &c.

Odoramenta frigida sicca: Ex santalis, rosas, ligno
 Rhodino, camphora, &c. ex quibus atque similibus
 pomum odoratum confari poterit, frequenter o-
 dorandum.

A cibo malum Cydonium, vel pyrum furno co-
 ctum, & induratum, atq; fructus astringentes. Ca-
 ueant austros, nec vnquā post cibum progrediantur.

Calidum siccum.

Calidis & siccis cerebro, conueniunt irrigationes *Calidum*
 ex aqua frigida, vel frigidorum decoctis, vt lactucæ, *siccum.*
 solani, portulacæ, lentis palustris, papaueris, hordei,
 &c. Ex oleis, violaceo, nenupharino, &c. Nunquam,
 vel raro caput veste velent, &c. per æstatem, (corpo-
 re alias robusto) bene largo canali quotidie aliquan-
 diu aquæ frigidæ effluenti caput subiciant.

Hi vigiliis fatigantur, & præpropere calui fiunt.

Ad vigilias lactuca edēda, & papaueris viridia fo-
 lia obsoniis miscenda, & dormituris caput oleo vio-

laceo, vel rosaceo, refrigerante aliquo succo admisto, vngendū, vel oleo cui capita papaueris incoxerint, & vna pedes decocto refrigerantium fouendi.

Ad caluiciem, vngentum ex ladano, oleo myrtino, vinoque astringente confectum, vel ex ladano, & oleo lentiscino.

Item polytrici herba pars vna, ladani partes duæ, vino astringente, oleoque myrteo excepta inungantur, & effricentur.

Cerebrum ad frigidum flectens.

Ad frigidum flectens.

Irrigationes, vnctiones, ex calidis, & suffitus aromatici. Caput bene tegatur, luna vitetur, maxime ante ipsum lunæ, solisque cōgressum. Multum ambulent mane, horum oculi interdum stillatitia fœniculi fouendi, & ex melle ac tenui liquidoq; fœniculi succo ad oculorum claritatem, illinendi: vel etiam melle, ac butyro salis experte vngendi, &c. His aduersus surditatem vtile erit, (maxime hyeme & diebus aquilonaribus,) aliquid olei amygdalarum dulcium auribus instillare, & lana nigra oleo imbuta leniter obturatas tenere.

Frigidum humidum.

Frigidum humidum.

Fricationes multæ, pannis asperis, & thuris, styracis, vel electri, atq; similibus fumo suffitis. Lotiones ex herbis calidis siccis: vt, lauro, sampsocho, saluia, batonica, chamæmelo, ruta, &c. sale vel alumine vel vtroque adiecto.

Meatus omnes in cerebrum ferētes, purgatissimi reddantur per nares, errhinis vt betæ succo, belididis, anagallidis vtriusque.

Odoramenta sint ex aromaticis, styrace, musco, ladano, caryophyllis, nuce moscata, ciueta.

Sternutatoria, ex betonica, attrita, & naribus inserta, vel festuca indita, omnia ieiuna.

Per

Per palatum mastichatoriis, ex mastiche, herba
ediculari, pyrethro, &c.

Gargarismatis, ex sapa, & oxymelite, cum sinapi,
&c.

Diachristo, ex sapa cum betæ succo, palati, & co-
mellæ regionibus illita.

His vtilia sunt tragemata cal. sicca, saccharata post
bum, vt anisi, cinamomi anthos, &c.

Vitent pernoctationes sub dio, & aquarum au-
s caueant, matutinum ac vespertinum frigus fu-
ant.

Coelo nubilo, soli aperiendi se minime commit-
nt. Aurium sordes his diligenter linteo dropace
uncto immisso, & vbi apprimatur extracto tergenda,
guttula vna olei laurini auris meatus illinendus,
el exiguo fellis bubuli cum pingui anserino.

Hi cito senescunt, & somno nimis grauantur. Er-
o ad caniciem, Capperis cortex aqua, vel lacte asi-
ino, vel bubulo coquendus, dum tabuerit: atq; tum
capiti raso illinendus similiter & cortex radicis ili-
is coquitur, & vsurpatur.

Item pix liquida oleo mista vtiliter illini poterit
id idem.

In nimiam in somnum procliuatatem, iuuerit pu-
regium, vel nepetam, vel hyssopum intritum aceto
cerrimo, vel aqua vitæ intritum odorati, &c.

Cerebrum frig. siccum.

Irrigationes ex calidis, humidis, etiam post pran-
tium: vnctiones ex oleis: liliaceo, chamæmelino, &
herbis cephalicis cal. incoctis & oleis mistis. Odora-
menta calida, ex liquorum conuenientium vaporis
elatis: quibus & aurium meatus, aduersus gra-
uem auditum irroratur salubriter: & post oleo
sulci ac meturo, illinuntur.

Hi si vigiliis premantur a sumtis iurulentis som-

*Frigidum
siccum.*

num tentare debent, & a cibo humefcente: atque anethinum oleum, non vetus, fronti, temporibus atque capiti toti illinere.

Hac de cerebro flectente.

Ventriculus flectens ad calidum.

Ventriculus flectens ad calidum.

Cibus validus, & satis copiosus, actu frigidus fructus ante cibum, potus dilutior.

Cal. humidus.

Calidus humidus.

Cibi astringentibus succis macerati, & intinctibus aceti aranciorum, limonum, &c. præparati.

Potio parciore, & refrigerantior: ventriculus oleo rosaceo, vel myrtino vngendus.

Cal. siccus.

Cal siccus

Potio liberalior: aquæ potio, corpore satis robusto nec obstructionibus obnoxio & fructus lubrici: ut mora, pruna, persica, cerasa, ante cibum, & olera frig. humida. Cucurbita, cucumis, & reliqua cocta. Edulia præcedenti duriora viribus ferentibus conveniunt, & materiæ valentioris.

Hi ubi crudum sine præcordiorum dolore ructet, ex intervallo aquam frigidam bibant, & se continant. Si propter ardorem aliquem noctu sitiant, antequam quiescant, duos, tresve cyathos, per tenuem fistulam frigida bibant: vel potionis dilutæ, atque bene frigida. Hos item iuvat ventriculum oleo myrtino inungere.

Ventriculus frigidus.

Frigidus.

Omnia calefacientia, & calidorum inunctiones: ut costini mastichini, &c. Nunquam surgant, nisi bene coxerint: & si surrexerint, iterum dormiant. Per hyemem, totis noctibus quiescant, etiam primo somno, ventri incumbentes. Et palmulæ, amygdalæ, pistachia, &c. sumenda ante alios cibos.

Frigidus

Frigidus humidus.

Aeris omnia, & sine frigiditate astringentia: po- *Frig. hu-*

exigua, eaque vini meraci, ac generosi: vel cere- *midus.*

ia Martia, vel mulsæ generosa.

Habitatio sit ædificio lucido: æstium flatum ha-
nte, & hybernum solem.

Legant clare, post ambulent, tum pila, vel armis,
alio genere superiores partes mouente, se exer-
mant: & ieiuni vinum bibant calidum, vinum illud
to austeriusculum, & cum cibis tale: qui cibi ma-
mam partem sunt omnes assi, aromaticis pulue-
bus aspersi, cū quibus & certa piperis grana crassi-
cule contrafacta edant.

Longis diebus his meridiandum ante prandium,
n minus postea, & omnes potiones aqua frigida
bibita includendæ.

Frigidus siccus.

Laccum melle, vinum meracius, cibi, ac nutri- *Frig. sic-*
menta calida, tam actu quam potentia. *cus.*

Nardino, vel mastichino, venter vngendus assi-
due: & bene carnosus puer dormienti assidue accu-
pet, vt semper abdomen contingat: vel catellus e
egione ventriculi assidue gestetur: iuscula fiant
thymo, rosmarino, mentha, &c. incoctis, & piperis
quod satis est asperso.

*Hæc de ventriculo flectente.**Cor flectens ad calidum.*

Aer inspiratus frigidus, eatenus, dum temperetur *Cor flectēs*
cor, ore potius quam naribus exceptus, frigidorum *ad calidū.*
cardiacorum vsus creber, epithemata frigida car-
diaca.

Cal. siccum.

Aura aduersa, & cardiaca frigida, humida: vt vio-

Cal. siccū. la, nymphææ flores, etiam temperatæ: vt buglossa, borago, & cardiaca epithemata frigida humida.

Calidum humidum.

Cal. humidum. Aer frigidus & siccus, ore potius quam naribus inspiratus. Cardiaca frigida, sicca, tam sumta quam foris applicata.

Cor frigidum flectens.

Flectens ad frigidum. Aer calidus, cardiaca calida, & epithemata ex iisdem cordis regioni applicata.

Frigidum humidum.

Frig. humidum. Aer calidus, siccus, cardiaca calida, sicca: anthos, sampsuchus, pulvis ochymi.

Frigidum siccum.

Frig. siccum. Cardiaca sumta, & applicata, calida humida: borago, buglossa, etiam calida iusculis incocta, vt sampsuchus, citrargo. &c.

Hæc de corde flectente.

Pulmo flectens.

Pulmo flectens.

Conuenit cum corde.

Flectente aeris qualitatibus.

Pulmo si frigidus sit, vox exercenda, & multum vociferandum, maxime, si humidus item sit, & pectus totum, oleo vel vnguine calefaciente fricandum: vt costino, amygdalino amaro, vel dulci, croco, admisto, &c. si calidus sit, resistendum vnguentis refrigerantibus, & oleis: vt rosaceo, violaceo, nenupharino, &c.

Iecur flectens ad calidum.

Iecur deflectens ad calidum.

Refrigerantia liquida, & epithemata maxime ex hepaticis e regione admota.

Calidum humidum.

Cal. humidum. Epithemata ex rosis, santalis, plantagine, violis, rosarum stillatitia, &c. Vfus creber cichorei, endi-

uiz

cremoris hordei, oxalidis, feri lactis. Vere, san-
 is ex vena hepatica vacuetur pro usu ac viribus
 diligentis. His alæ graues odore esse solent Quod si
 plestum sit, radicem scolymi bibant, in vino co-
 um, & aluminis liquidi partibus duabus & myrrhe
 arte vna dissolutis alæ vngendæ: vel aluminis li-
 idi drach. 8. amomi, myrrhæ, spicæ nardi, cum dr.
 vino tritis.

Calidum siccum.

Decocta plantaginis, portulacæ, atriplicis, liche- *Cal. siccæ.*
 a: & hæc ipsa iusculis incocta: iuscula crebra, ex a-
 malium partibus neruosis, & membraneis con-
 sta, fomenta, & vnctiones frigida humidæ. Incu-
 tio in latus sinistrum, dum dormiunt.

Frigidum humidum.

Agrimonia, steches, herbæ capillares, scabiosa ci- *Frigidum*
 pus incocta, & inde iuscula: piper in tenuem pulue- *humidū.*
 rem quassatum cum opsonis, mulla salis meraca:
 vnctiones, & epithemata ex calidis & siccis, sym-
 patheticis plurimis.

Frigidum siccum.

Vinum satis generosum: iuscula crebra: & his in- *Frigidum*
 cocta thymus, mentha, rosmarinus, sampsuchus, &c. *siccum.*
 cinzibere item pauco asperso, si opus est.

Lactis recentis potus, per se & longe ab aliis cibis:
 vnctiones, epithemata calida humida ex sympathe-
 ticiis maxime, incubatio in latus dextrum.

Hæc de iecere flectente.

Lieni eadem conueniunt quæ iecori, cui propria *Lien.*
 tamen sympathetica sunt plurimum applicanda, su-
 mendaq; vt cal. lupulus, scolopendrium, cortex ta-
 marisci, cappares, &c. Frigid. viola, buglossa, borago,
 succus malorū fragrantium, &c. eaq; frigida & sicca.

Renes calidi.

Renes calidi.

E regione renum, vestimenta minus densa sint decubitus supinus vitetur, & stratum molle: dorso rosæ recentes, vel vetustæ aceto rosaceo macerati dormituris substernantur, vel violæ, salicis folia, vitis frondes & capreoli.

Calid. humid.

Calid. humid.

Frige facientia sicca eligantur, & applicentur.

Calid. sicc.

Cal. sicci.

Frigida, humida, his applicanda: & substernenda & plumbi lamellas tenues, & perforatas, hydrargyri quoque oblitæ gestare his vtile.

Frigidi Renes.

Frigidi.

Hi calefaciendi vnguentis & fomentis calidis, humidis item, si sicci: sin ad humidum flectant, siccis

Testes flectentes.

Testes flectentes.

Eadem applicanda quæ rebus flectentibus: qui si ad frigidum flectant, redduntur ad coitum impotententes: propterea pingui vngendi frequenter: cum pyrethri, aut herbe pedicularis aliquid adiectum sit aut feminis vriticæ, & ante venerem, his præbendum aut satyrion, aut erucam, aut piper, aut medicamentum diasatyrion dictum: infernas corporis partes exerceant: & oleum euphorbii affricent inguini, & naturalibus: & in cibis sumant cicer, fabas bulbos, pastinacam, horminum, conchilia omnia squillas, polypodes, ostrea cum pipere, passeris, perdicis, coturnices, porphyrones.

Vterus flectens ad cal.

Vterus flectens ad calid.

Inseffus, fomenta, & vntiones frige facientes: etiam humiditate & siccitate pugnantes si opus est.

Ad frigidum.

Ad frigidum.

Inseffus, vntiones, epithemata: etiam in nuptis pessus, omnia calefacientia, maxime ex proprietate substantiæ hysteris.

Ad Frigidum humidum.

Artemisia, matricaria, laurus, sampsuchus, nepe- *Ad frig.*
pulegium, &c. *humidum.*

Ad Frigidum siccum.

Eadem simplicia incocta, atque oleo, & mucila- *Ad frig.*
mine lini, seminis fanigræci, &c. & pinguibus ad- *siccum.*
misti.

Ad articulos imbecilles & arthritidi obnoxios.

Vita sobria esto, & abstemia: inprimis venus fu- *Articul.*
enda. Quidam toto anno a vino, potuque genero- *imbecilles*
ac venere abstinentes, totius vitæ securitatem si- *& arthriti-*
fecerunt. *tici.*

Equitare podagræ opportunis alienum: & si se-
des sint, crura motibus exercere, quin potius his ex-
cendæ partes superiores.

Conuenit ex interuallo, vomitus, atque alui sub-
ductio, & nisi quid impediât, phlebotomia per ini-
tia & veris initio: horum aliqua, vel omnia, nisi vi-
admodum sobria sit.

Vomendum autem ex vario cibi genere, copioso,
ingui, acri, dulci, ex vetustis fassamentis, oleribus,
tribus: raphano, cepa, allio, porro, eruca, quæ omnia
assiuscule mansa diglutienda, & vinum dulce su-
erbibendum satis copiose: & mora trium horarum
interposita, aqua tepida cum melle satis largiter po-
digito, vel penna gutturi inserta, & prius oleo iri-
o vncta vomere conandum: atque toties vomen-
um, ex aqua tepida, dum ea sola exierit.

A vomitu, os vino vetere abluendum, & dentes
oluendi: & per loca aprica ambulandum: deinde
iescendum. Noctu vero panem cum vino oligo-
oro vel potione diluta cœnatus, somnus captan-
s. Postridie, sobrie comedendum, atque nimium
igidis abstinendum.

Si ob arthritici naturam, vomitus haud cōueniat,

menſibus ſingulis, vel maiore interuallo ex pilul
hermodactyleis purgandum.

Articuli frequenter fricentur ex oleis aſtringen
tibus, & quibus galla immatura, nuces cupreſſi, c
pula glandium, verbaſci flores, enula campana
chamæpytis, incoxerint: adieſto ſale, & alumine:
pellis canina, aut vulpina ex eiſdem, arte coriar
præparata, & bene macerata, geſtetur.

Iſchiæ ſi metus ſit clyſtere acri alius irritanda e
interuallo, & aſſiduum ſedile fugiendum.

*Haſtenus de Prophylactica ubi pars aliqua ſeſtat, ſe-
quitur ubi totum corpus ſeſtat.*

*Correctio
corporis
ad cal. hu
mid. ſeſ-
tat.*

Totius corporis ad calidum humidum ſeſtent
correctio.

Laboribus his incumbendum, ac ſtudiis: mot
veloces, ſudores: ſomni ieiuni, & a matutinis d
ambulationibus.

Calida balnea, ieiunia plurima: coena conten
eſſe poterunt: vigilia, ſtratum durum, venus mult

Nutrimētum: carnes aſſæ, & piſces ſale, aceto,
muria conditi: carnes animalium robuſtorum. Syl
ſylueſtris, bouis, leporis, cuniculi vetuſti, cicurium
ſylueſtria, agreſtia omnia, crudiuora, ſyluarum m
terie paſta, nec voracia, fœniuora, frugiuora, ſa
guinea parcibiba, vigentia, maſcula, nigra: ex loc
ſiccis, inaquoſis, æſtuoſis, petita, volucrium genu
palumbis, columbæ, perdicis, galli, turtures, vol
cres ſeminileges. Ex piſcibus, draco, ſcorpious, calli
nymus, cuculus, glaucus, perca, thryſſa, cōchilioru
omne genus, ſalfamenta, maxime marina, mox ſi
uiatilia, tum paluſtria ex ſalfamentis, perca ſiccif
mæ. Panis ex tota farina, clybano coctus, & ſubcin
riceus, hordei polentæ: ac farina vetuſta, holera
ceto cocta.

Potio, vinum auſterum, nigrum, vel cereuiſia
eſcens.

Ad

Ædes ad septentrionem, loco edito.

Vestēs renues, & raræ.

Hos iuuat sub veris finem, sanguinem deplere:
pro redundantia modo, ac viribus indigentis.

Cal. siccum.

Vehementibus abstineant tam animi, quam cor- *Ad cal.*
poris motibus, hilariter degant, umbratilem vitam *siccum.*
lectentur, & lentis motibus gaudeant: exerceant se
arce, pane prius sumto, eoq. in corpus ante exerci-
tationem initam digesto. Si vehementer calidi &
siccī sint, exercitatione abstinendum, & ambulatio
matutina multa, & balneum tepētis aquæ ieiunum
exercitationis loco esse poterunt:

Si valde siccī sunt, etiam secundum cibum balneū
agredi iuuabit, item secundum cibum somnus & à
trudio breuem somnum captare conuenit: & fri-
ari interdum ex aqua, & oleo his vtile: à cœna sur-
tant tantum: somno indulgeāt liberali, strato mol-
lissimo. Venus rara.

Alimenta sint consistentia molli, interdum actu
frigida: & ex his pisces & piscium capita ac ventres,
& carnibus domestica, herbiuora, multibiba, teneli-
a, ex sanguia, femella, castrata, alba, nuda, minus ex-
ercitata, ex locis humidis, nec æstuosis petita. Iuscu-
la crebra, cibi pauci, & frequentes. Suum petunculi,
articuli, rostra, alæ, & partes omnes extrema. Sug-
corum acidorum intinctus.

Panis hordeaceus, vel auenaceus, aut ex vetustis
irinis, maza oxygala, fructus cum aliis cibis.

Lac tenuissimum, olera insipida, acida.

Potus dilutus, & satis largus, etiam frigida pota-
tio interdum.

Ædes ad aquilonem & occidentem: loco humili,
& depresso etiam fluuiis vicino.

His conuenit purgatio, maxime æstatis initio, ex
holagogo, & æstate media vomitum irritare: radi-

D.

cum raphani succo epoto drach. 3. ex oxymelite: vel
seminum drach. β. ex hordei decocto: si ad vomē-
dum sit aptus, id est, nec collo lōgo sit, nec angusto,
nec scapulis alarum instar exstantibus, nec thorace
angusto: tū namq. purgare foret tutius per sedem.

Deflectens ad frigidum humidum.

*Ad frigi-
dum hu-
midum.*

Matutinæ deambulationes multæ, ac labores
multi.

Balneum calidius, frictio ex oleo chamæmelino,
anethino, &c. Sudores: somnus à matutina deambu-
latione, cœna cōtenti sint tantum, & à cœna deambu-
lacio, sitientes dormiant, deambulatio acuta, ab
exercitatione à cœna tarda, in tepore, nocturna iti-
nera. Purum se frigori exhibeat frigidus, humidus,
præterquam à cibis & exercitationibus Sol, ignis,
coitus, somni longi, ieiunii: item, vigilæ ieiunæ: &
stratum durum horum corpora emendant.

Nutrimētum calidum, carnes facci boni, etiam
vino conditæ & sale, suis sylvestris caro, omne volu-
crum genus ex locis æstuosus & æditis: palumbis, co-
lumbæ, perdicis, galli, turturis, semineleges omnes,
sylvestria omnia, parcibiba, exercitata, vigentia, pi-
sces sicci, draco, scorpius, callionymus, perca, &c. Fri-
xa, tosta, assa potius quam elixa, & pipere, vel caryo-
phyllis & vino aspersa, piscium partes supernæ, &
caudæ proximæ. Conchilia omnia; salsamenta, panis
purus, & bene fermentatus, & sale conditus: Sorbi-
tiones nullæ, & si quæ sint, incoquantur thymus, ros-
marinus, salvia, &c. Portiones parvæ, & meracæ: vina
generosa, & vetusta.

Olera actia: allium, cepa, porrum, &c.

Ædes ad Orientem.

Vestis vulpinis pellibus suffarctæ.

Hi purgandi phlegmagogo, autumno, aut veris
initio, vel vomitu si ad vomitum apti sint, & humor
pituitosus eo obrepserit: vomitus, ex raphano, vel
iuglandis

iuglandis iulis citetur etiam bis mēse, per hyemem totam, duobus diebus continuis.

Deflectens ad frigidum siccum.

Exercitatio modica, labores sensim adhibiti, leniter calefacientes: citra sudorem balnea calida, & à cibo vnctiones & frictiones ex oleo, visceribus vitatis. Somnus prolixus, strato molli, item à cibo: umbra tepens, otium, mora in lecto multa, venus nulla, vita læta, & hilaris.

Alimēta mollia, coctu facilia, domestica, nec crudiora, nec voracia, herbiuora, haud frugiuora, multibibita, tenella, minime exercitata: ex locis depressis: pisces cartilaginosi vino, & aromate cōditi: anserum carnes, anatis, & palustrium reliquorum: prius pulicula ex lacte aliquandiu nutritorum. Piscium capita ac ventres, & ex his mollissimi carne, & saxatiles. Nutrimentum omne actu calidum, sapius sumtum, iuscula crebra: lac asinum & caprinum, cum melle. Ex oleribus, rapum; ex fructibus, ficus virides, botri vuarum, passulæ, pira matura, vinum satis generosum, ætatis mediæ, tenue & diureticum.

Ædes ad Austrum.

Vestimenta satis densa, & corpori proxima, per frigora, oleo calefaciente delibuta.

Sub autumnum, hi ex melanagogo purgādi sunt; leniter, & ex interuallo.

Hactenus de Prophylactica flectentis secundum crasin; sequitur secundum conformationem.

Estq. ad nimis raros corpore, vel densos: reliquus conformationis flexus, quoad fieri queat, iam recens nato puero ab obstetrice, ac deinceps à nutrice dirigendus.

Rari corpore.

Rari corpore, vestibus se bene muniant, ex densa textura, vel pellibus, nec nisi vncti in frigus prodeant: hos iuuat balneū bene calidū, & cubile durum,

& frictio dura, manu oleo myrtino, vel rosaceo dilibuta.

Rari corpore cum fere graciles esse solent, si impediatur (hos namque tabes, deiectiones, destillationes, item viscerum, atq. laterum dolores fatigare solent) conandum ut impleantur vino crasso, ac dulci: cibis crassi succi pro natura ac robore corporis. Exercitatio esto brevis, nec celer, & frictio mediocris ad carinum tumorem, nec ultra. His etiam commodum erit pice diebus tribus, quatuorve, interpositis oblini. Porro gracili ante balneum, ieiuno, corpus infricandum leuiter linteis, donec rubescat: deinde manu, frictione dura, non tamen multa.

Balneum sit aquarum dulcium, in quibus nec sudent, nec diutius immorentur, & à tepida exeuntes, in frigidam ingrediamur.

Corpore densi.

Densi corpore.

His conuenit balneum temperatum, ex herbis aperientibus, & mollientibus conflatum: chamæmelo, nepeta, malua, pulegio, &c.

Exercitatio satis valida, & ex oleo anethino vel calefaciente, & attenuante alio; inunctio & frictio molliuscula.

Densi corpore obesi esse solent, & obstructionibus opportuni.

Obesi.

Obesi plerunque acutis morbis capiuntur: & difficultate spirandi strangulantur: subitoq; sæpe moriuntur.

Densi, victu attenuante ad mediocritatem perducendi: pane furfuraceo, sale multo, cum cibis, capparibus frequentibus, & vini albi ac tenuis, vel ceruissæ similis potione. Ex cibis, conueniunt pisces saxatiles, ac alii molli carne, friabili, ac alba præditi. Ex auibus, auiculæ montanæ, passerres, turdi, merulæ, perdices, auiculæ turricolæ, & in vineis degentes, columbi agrestes, & ex eodē genere agrestia omnia, potius.

potius quam domestica. Panis hordeaceus. Ex oleribus, acris: ut eruca, nasturtium, &c.

Cibus non statim à balneo his dandus, sed prius somnus indicendus: & ab exercitatione ac labore, somnus ieiunus, & balneis iniciantur sal, alumen, sulphur, &c. & frictionibus ieiunis his studendum, siccis linteis, crassioribus, atq; duris, frictione item dura ac multa ex oleo digerente manibus vinctis, anethino, chamamelino, costino, & sale ac nitro corpus frequenter fricetur. Cibi minus sumantur quam pro exercitiorum ratione. Insolatus his confert, & semel in die (id est) prandio, cibum sumere: & interdum piper bibant ieiunius cum decocto radicum ac seminum apii, feniculi, anisi, &c.

Cum obstructionū metus sit, utantur salsamentis, & oxymelitis potione: & si à iecore metus sit, agrimonia, asparagus, plantago, capillares, vsurpentur: radices feniculi & apii, &c. Si lien: cappares, cortices radicum capparum, cortices tamarissi, & ipsa tamarissi coma, & cetera iecori sympathetica.

Si pulmo, innula, passula, carica, ficus, pulmonaria, angelica, &c. huic sympathetica, vsurpanda:

Si renes, radices apii, feniculi, petroselini, asparagi, eryngii rusci, & cetera renes deobstruentia omnia. vino albo macerata, vel leuiter incocta.

Haftenus de prophylactica sanitatis nimium flectentis; sequitur quae diata erroribus debetur: estq; secundum diata partes, vel gestorum, vel fomētorum. Atq; ex gestis, primum erroribus quae circa motus sui ipsius tantum gratia suscipiuntur: deinceps de ceteris.

Ad aluum adstrictam.

Aluus si adstricta est, sollicitanda arte: videlicet terebinthina oliuae magnitudine deglutita cum saccharo: ceterum adstrictam iuuabūt oua sorbilia, cochlearum ius cū beta, ac malua, serum lactis, cū sale,

*Aluus
adstricta.*

aut melle, ad tres heminas: item herba mercurialis decoctum iuuabit, & glande interdum naturam irritare, ex melle, & sale tosto, vel ex ficu cum nitro.

Pueris & infantulis: beta vel malua, vel mercurialis cauliculus satis erit, hac nisi profint, clystere tentandum (non tamen continue ne natura spontaneae excretionis obliuiscatur) ex decocto caricarum, beta, malua, quantitas ad corporis magnitudinem comparata, cum melle, ac oleo: vel oleum per se ad hemina dimidium iniiciendum, omnia tepida.

Ad aluum fluentem.

*Aluus
fluens.*

Aluus si nimium fluxerit, ut molesta sit, & imbecillius inde corpus euadat, sistenda. Lacte bubulo, recenti, ad tertias cocto ac sumto: vel lacte candentibus chalybis laminis iniectis cocto, vel eodem è maris littore calculis candentibus extinctis: aut quarta aquae parte ad lac iniecta, atque ita lacte ipso ad dimidium cocto.

Item sacculus salis tosti ad ventrem applicatus, & ad dorsum hordei tosti aluo profluente proderunt. Hac si parum successerint, infusus fiant ex herbis adstringentibus, vel alia adstringente materia: polygonato, galla, quercus foliis, bistorta radicibus, alumine, &c.

Fercula ex oriza, sorba, mespilla, mala cydonia ante alios cibos sumta, vel puluis baccarum oxyacanthae cibus aspersis, &c.

Vrina nisi fluxerit satis, smyrnii, apii, foeniculi, rusci radicibus decoctis, & horum iusculo sumto, hau-
stu satis largo, ieiuno, prolicienda.

*Defati-
gatio.*

Exercitationem, vel laborem, si defatigatio consequatur: refouendum corpus, ac recreandum: atque ubi quis insuetus laborauerit, aut multo plus quam solet etiam assuetus, huic ieiuno dormiendum est: multo magis si os amarum, & caligent oculi, & persurbatur, venter, tum non tantum dormiendum
ieiuno.

uno, sed in posterum diem permanendum, nisi
id quies sustulerit. quod si factum sit, surgere o-
rret & leuiter ambulare.

Leuat item lassitudinem, interdum laboris mu- *Leuantia*
tio: insueti. consueto: & cū hesternis pares hodie *lassitudi-*
l paulo minores exercitationes adhibere cōuenit *nem am-*
Qui ambulando defatigatur, hunc reficit in ipso *bulan-*
nere frequens frictio; atq. post iter, primum sedi- *tium.*
deinde vnctio: tum aqua calida in balneo, magis
uperiores partes quam inferiores fouēdo: atq. quo
ficiscens minus lēdatur: profectio ipsa ita suscipi-
nda: inunctus proficiscens nec fortiter incedat, &
er astatem fascia mollis, digitos sex, aut septem la-
i, quinq; autem cubitos nec minus longa, lumbos
dilia vsq. complexa, obuinciatur: & baculo innita-
ur. Cumq. ab itinere cessatio fit; post vnctionē, pau-
lum cibi astitui, potioq. modica satis erunt: atq; a-
randio, antequam iter arripiatur conquiescendum
st: si vero abeundi necessitas fuerit, & sitis urgeat,
enuis polenta ex aqua cum salis momento bibatur,
& corpus à sole bene tegatur.

Hyeme si profectio suscipitur, vnctione prius ad-
hibita ex oleo calefaciente, hyemales cibi, copiose su-
mendi, & potio modica: ceterū fascia longior esto,
quam astate, nō solum lumbos, sed & spinam & pe-
ctus etiam complexa. requiescenti autem, (si vehe-
mens interea frigus vrat) neq. vngi, neq. cibum po-
tumve assumere præstat, neq. alio quodam modo
refici, si mansurus ibi sis: & ad hospitium veniens,
cauendus ad ignem subitus accessus, sed primum
deambulet in loco egelido, & manus fricet, vt sen-
sim corpus calefiat.

Equitantes præter prædictas partes, valide ventrē *Equitan-*
inferiorem, & inguina apprehendant fascia: & in *tium.*
anteriorē sedis parte, puluinar apponant cui inni-
tantur, ad firmandum brachia & manus.

Secundum longas profectiones, aliosque validos labores, etsi lassitudinem quis non sentiat, haud aliter quam si lassus esset, curetur.

Atque labores, si corpore inani suscipiantur, minus laedunt.

Naugan
tium.

Qui nauigat, & nausea premitur, si multum bilis euouerit, vel abstinere à cibo debet; vel paululu sumere. Si pituitam acidam effudit, cibum consueto leuioremumat, sin absq. vomitu nauseet tantum, vel abstineat: vel à cibo vomat: & à vomitu, panis vino aquoso, & odoro maceratus ingerendus, & nari- bus grati odoris admouenda, inter quæ acetum ro- saccum, & stillatitia rosarum mirifice recreabunt.

Faucitas.

Si cui ex vocis contentione raucitas oboriatur, arteria glycyrrhiza, & potiuncula dulci recreâda. Sin vero loquendo fessis, defatigatio sequatur, succurrendum vociferatione. Qui vociferaturus est, debet cum aliu deiecerit fricari leniter ac præcipue partes inferiores: faciemq. spongia madefacere, aut abluere; & prius sensim loqui, ac per intervalla media & vociferando memoriter dicat, quorum meminert, quæque multas habere lenitatis, & asperitatis mutationes videantur. In primis autem vociferandum est, vocem quâ grauißimis fieri potest tonis producendo: tum ad acutißimos eandem redigendo. deinde cum non multum in acuto sono permansum sit, retro vicissim paulatim reflectendum, vocem diminuendo, donec ad grauißimam, à qua ductum initium est, reuertatur.

Correctio
voci.

Vocifera-
tionis mo-
dus.

Modus vociferationis est pro viribus animi alacritate, & vociferantis consuetudine.

*Dieta e
Quantum
ex labore.*

Si quis tempore æstiuo, ex labore æstuat & defatigatur, ita vt corpus siccus, & calidissimum euadat, is fructibus vesci debet: pomis, prunis, cerasis, persicis, cucumere, pepone, &c. atq. à balneo aqua primū detur potui, deinde vinum modice dilutum, tum vomitus

omitus citetur, post offerenda lactuca, deinde pedes suilli probe cocti, ex aceto & garo, tū gallorum, atque anserum ventres, atque piscis aliquis carnis teneræ, in sartagine coctus, gustet, etiam si velit oleum haud mali succi & cucurbitam. his transactis, vitum aqua frigida valde dilutum bibat.

Qui vitam ex instituto suo degat, si ab exercitatione æstuet, aquam frigidam fontanam potet.

Qui exercitatione, & balneis à cibo laeduntur, hi ambulare debent ante cibum, cōtentione aliquantulū maiore, à cibo tardissime & iecori ne obstruatur oxymelite consulendum, & omnibus attenuantibus vtendum, dum mali metus cessauerit.

Vbi quis vehementer lassus fuerit, motibus moderatis moueatur, ac tardis: & quies frequens interponenda, qua quiete lassus oleo dulci atq copioso fricandus, pluribus contrectantibus; ac deinceps cibis solito parciore esto, & nutrimenti facilis.

Lassitudo duplex est, vel musculis puris: vel inquitatis. Musculis puris, lassitudinis sensus tensius esse solet.

Lassitudo duplex. Musculis puris.

Lassum tensiuo iuuat pauca & mollis, ex oleo emelido frictio, cum somno & quiete: aut lotio mediū temperamenti, atque incalida pluscula mora, bis vel ter lauando, ac post inungi debet antequam vestiatur, etiam die postero, cum è lecto surgat.

Inquinatis musculis est vlcerosa vel phlegmonosa. Vlcerosa accidit malis succis & acribus præditis: succedit recentibus cruditatibus, cum aut exercetur immoderatus, aut in sole sunt morati: etiam sa- ubri corpori accidit si multo nimis se exercuerit.

Musculis inquinata. Vlcerosa.

Iuuat hos frictio mollis multa, & plus frictionis, quibus sub cute tantum; motuum plus, quibus profundius in musculis sentitur lassitudo. Alantur vberius tensius, & nutrimento solito humidior.

Phlegmonosa.

Phlegmonosa, ex vehementibus motibus nasci-

tur: & eos maxime inuadit qui exercitationibus minus sunt assueti.

Cura: oleum tepidum, cum frictione mollissima, & longissima in medi temperamenti aquis mora; & si aqua paulo tepidior fuerit, iuuerit magis: multa quies, nutrimentum humidissimum, & refrigerans, parcius quam in reliquis: his etiam sanguis vacuari salubriter poterit, vsu cum viribus collato.

Hæc de lassitudine.

Sin vero labor tantus sit, vt corpus inaniatur, & squalidius multo euadat, est obstandum arte maiore.

*Inanitia
corporis
ex labore.*

Huius inanitionis gradus sunt duo.

Signa communia sunt: horrores à deambulationibus matutinis, & exercitiis, capitis vna grauedo.

Cura communis: calida lauari, molliter cubare, laboribus & ambulationibus moderari; vngi & fricari modice: cibis copiosior esto, solito humectior, & succi boni, & sensim appositus: potus mollis.

Primi gradus inanitionis ac leuioris cura.

*Cura primi
gradus
inanitionis.*

Vnctio & frictiones ante prandium adhibeantur, & die primo largius solito prandeant, & vini mollis quod satis est, bibant: & à prandio, somno vtantur moderato: ad vesperam, vbi exercitiis leuibus vsi sint, & calida loti fuerint, coenent more consueto, atque à cœna ambulationibus abstineant, sed aliquanto post tempore decumbant. Postridie in aqua lauentur, & somnis mollibus tempus transigant, & deinceps ad diem quintum, ad cibos & labores consuetos reducantur.

Gradus alter inanitionis.

*Cura alterius
gradus.*

Signa. Ab exercitio mox, postquam corpus refrigeratur, horret: & stridor dentes, tremorque corpus occupat; somnoque grauantur; & expergefacti, sæpe oscitant, à cœna item palpebræ ipsis graues fiunt.

Cura

Cura.

exercitationum dimidium auferatur, (cibus in-
 ea magis refrigerantibus atque humectantibus
 in in priore) ad dies quinque, & die sexto, tertia
 laborum ablatoꝝ apponatur, post alios quin-
 dies, dimidium reliquorum laborum, id est, vna
 restituitur, & post quinque alios, rursus ad
 suos labores redeant, qui tamen solito leuior-
 sint.

In balneo si quis æstuet, hunc aceturum reficit; ore
 mentum vel aceti penuria aqua frigida.

Qui otiosam vitam degunt, boni succi cibis vtan-
 tur, & concoctu facilibus: nec tamen valde nutrien-
 tibus & alui subductio diligenter curanda, & vrinx
 selectio: & frictiones ieiunæ moderatæ manibus
 inueniente oleo quopiam delibutis: potio tenuis
 ac diluta. Venus his utilis,

Qui toto die sedit, nihil huic currendum, sed len-
 tæ ambulandum est, lenta quoque in balneo mora,
 inde coena exigua huic prodest. Qui ex segniore
 vita, ad exercitationes se traducere volūt: & ad bal-
 nea: vacuentur prius veris initio sanguinis detra-
 ctione, vel venæ sectione, vel malleolis scarificatis:
 sed si recusent, medicamento vacuandi sunt quod
 flauam bilem & pituitam, & serosos humores de-
 here queat.

Si cui fatigatio ex animi motibus ac laboribus
 intigerit: (obiecto mutato) alio animus ac sensus
 accipiantur, in quo haud ita laboret: ac tum modus
 teneatur.

Si interna meditatio, & contentio sit; à difficili-
 oribus ad faciliora, atq. iucunda.

Si externorum sensuum defatigatio sit, ab extre-
 mis obiectis, ad media sensus traducantur; atque si
 vehementer laborauerint, imperanda omnimoda
 quietudo, somnoq. si opus est, indulgendum.

*Æstuan-
 in balneo.*

*Otiosam
 vitam de-
 gens.*

*Toto die
 sedens.
 Ex otio ad
 exercita-
 nes se tra-
 ducens.*

*Fatigatio
 ex moti-
 bus ani-
 mi.*

*Defatiga-
 tio exterio-
 rum sen-
 suum.*

I. Visus.

Tum si visus ab obiecto nimis excellenti offendatur, prorsus aduersus color est adhibendus: ut si solis splendore laedatur, niger adhibeatur. Reficiuntur autem oculi colore cœruleo ac fusco: & superficie pellucida, & pellucidis: ut speculis, aqua prefluenti, &c.

Perturbationes oculorum à fumo factas, vel à calore, vel puluere, (mali causis externis prius vitatis) oculi aqua dulci tepida lauentur primum, tū frigida: splendorem auersentur, & oculos claudant, si necesse est, victu solito parciori interea vtantur.

II. Gustus

Gustui amici saporibus sunt, ex succis dulcibus, pinguibus: si vero gustus ex aliquo offendatur, maxime pingues saporibus conueniunt.

Stupor dentium.

Dentium stupori ex alimentis, vel alio quolibet orto, portulaca mansa medebitur.

Thymoses

Thymoses in tempore sunt alio traducendæ: seorsim, idque per media, maxime quæ corpus grauitur procellunt: ut amor, ira, tristitia, &c.

Signa amoris capti.

Amore præter modum capti, oculi tandem capti fiunt, nec tamen lacrymantur: verum apparent uti voluptate repleti: palpebræ ipsis frequenter mouentur; & cum reliquæ corporis partes non collabuntur, soli oculi his contrahuntur & concidunt. Pulsus (ubi vel audiunt vel vident amasium) subitè turbantur; nec æqualitatem, nec ordinem seruant: tristes sunt & peruigiles.

Cura.

Cura: hi ad balnea moderata, vini potionem, gestationesque, ac spectacula, & ad fabulas audiendæ animis sunt abducendi; interdum obiurgandi, & minis terror his incutiendus: & contentiones aduersus aliquos excitandæ, & ad alias curas ratio transferenda.

Amasium, quouis modo in odium pertrahendum; & ipse amore captus in omnem amœnitatem perducendus, & alio amorem flectere tentandum.

ra in aliquibus veneris vsu mitigatur, eodemq; Ira.
aliis tristitia.

Tristitia

trater modum tristes vinum bibant, boragina-
buglossatum, & in quo citrigo, & radices gei
duerint: & musica aliquo genere permulceatur.

Qui intemperanter venere abusi sunt.

si densandi, calefaciendi, humectandi, confir- *Intempe-*
madi sunt: ac primum vestimentis operiti conqui- *rantia*
ant: somnoque satis indulgeant, donec corporis *Veneria.*
tentio subsederit: atq. post, cibus liquidus sit, &
alis coctu, & succi boni, potus aliquanto mera-
& cibus solito parciore, dum se recollegerint.

quis à prandio ad res venereas irritetur, quie-
te oportet, donec cibus resideat: sin autem à cœ-
neceffe est paululum ante dormire. Error circa
venereas, minor est in calefacto, quam refrige-
to: in pleno, quam in vacuo: in humido, quam in
siccato.

Menstrua si restiterint, tempore naturali, in sessi- *Menstruo*
fomentis ac potionibus ex matricaria, nepeta, *rum ob-*
regio, maluis, artemisia proliciantur. Et conserue *structio.*
rum boraginis drach. 6. vel drach. 1. ex haustu satis
go vini albi calefacti, ventre ieiuno.

si nuptæ sint, in sinum inferendum rutam, cum
melle tritam: aut porri succu, aut leporis coagulum
iiciendum.

Exercendum autem his secundum partes inferio-
& frictiones cruribus adhibendæ, & per arenam
terram mollem ambulandum, & Lacunarum

luerum more ad nates, saltandum, atque si opus. *Menstruo*
malleoli, vel incidendi, vel poplites. *rum flu-*

si nimis fluxerint, in sessibus, potionibus, &c. ad- *xus nic*
gentibus, vtendum: & quiete, & partium supe- *nius.*

um frictionibus. *Prophy-*
lactica
Gestationis Trophylactica.
pregnans si pica laboret, omphacomeli bibat, & gestacionis:

portulacæ cremorem, & ipsam portulacam in cibum
sumat: item cucumeris semen decorticatū ex aqua

Sin vero stomachus ex acri, acido, aut salso humore mordeat: ex aqua calida copiose hausta vimendū: & vinum fulvum, odoratum, antiquum adstringens, bibat.

Potus esto moderatus, & præcordia stomachi sanguine fricentur; & molli lana contegantur.

Pedes si forte his tumuerint, malorum citriorum decoctis lauentur; & brassicæ folia imponentur, obligentur: vel rosaceo aceto, & sale fricentur singulis.

Quinetiam si prægnans humentes valde locos habuerit, & ad humidum præter modum flectens retentricem vteri vim imbecillem habeat: erinaceæ terrestris pellem vstam, ex aqua, aut vino, sumat: & que pudendi osculo eundem pulverem illinat: vnde myrti baccas cum vino, aut oleo lentiscino vsurpet atque myrti, rubi, camrubi, rosarum, & similium adstringentium, & siccantium decoctis, locos humentes irriget. Si austri, pluuiæq. occuparunt hyemem ver autem & frigidum, atque siccum, existat: tum maxime grauidis ne abortiant cauendum.

Partus prophylact. ad difficilem partum.

*Prophy-
lactica
partus.*

Partus si difficilis sit, iuuanda parturiens malorum foliis substratis, quæ protinus à partu auferenda: & dictamnus quouis modo adhibendus: & caryophylli fluuiatiles vsti sumendi & oleum dulce, decoctum malug; foenigræci, seminum lini, mucilaginis infundendi: & inprimis oleum potum summo præsidio.

Si feruor vrget, oua cruda, mucilagibus miscetur: atq. si vires deficient, pane tosto, odorato, & cumere olfacto, vel citreis malis sectis, & olfacto vel deniq. iusculis analepticis recreentur.

Qui vigiliis squalēt. & curis exhausti sunt, hi quie-
& somno tradendi, leni aquæ murmure, vel alia
suavis ratione conciliato: & balneis vespertinis his
endum; vbi bene prius coxerint, & cibo hume-
nte, & concoctu facili, vino largiore, tenui, nec
tusto. Caput oleo rosaceo, papauerino, vel ane-
rino, ad somnum & spiritus componēdos perfun-
dendum. item musica lenis & suavis, & tanquam
imum suspendens his utilis.

Cibi omnes euchymi sint, & concoctu faciles: vi-
um quod non admodum corpus feriat. Postea (vi-
bus recreatis) membra squalentia balneis hume-
nda: verum his non est immorandum, sed cor-
s & caput leuiter perfundendum, & inde in so-
mum descendendum; frictionibus & vnctionibus o-
illis.

Pinguedo parturientis si impedimento fuerit, in
stulo resupinā figurare oportet: vt ad femina ge-
na succlinet inflectatque: quo vulua ad abdomen
ndens, è directo ostioli habeatur: q̃ digito pingue-
ne delibuto, illinere oportet, & sensim aperire.

Alui durities si impediāt, succurrendum clystere,
vesicæ calculus, eo depulso vrina emittatur.

Si præter naturam figuratus sit foetus, naturalis
gura reddenda: partim pellendo, partim adducen-
do, partim flectendo, partim in rectum agendo.

Si manum, pedem ve, præmiserit; non attrahere
membrum prehensum oportet, verum digitis hu-
mero infantis, vel coxæ affixis, rursus in locum con-
ueniētem id quod præmissum est, diducere: & si fir-
ma adhesionē totius infantis, indecora fuerit figu-
ra: sursum prius ipsum ab uteri ore sublime trude-
re, & deinde prehensum rursus ad os dirigere.

Si partus infixus sit, componatur corpus situ con-
trario: vt in contrarium. reuoluatur: & quascun-
que partes obitrix oreificio propiores habuerit;

(modo ea figura exire foetus poterit) easdem teneat: & sic adducat: ita tamen, vt maxime caput infantis quærat, & ipsum teneat, & foris adducat. Sed si pedes propiores fuerint: ipsos teneat & adducere tentet.

Si hac arte embryon duci nequit, ad embryulciam est perfugiendū. Administratur aut hoc pacto:

Duriusculo moderate strato iaceat parturiens: & curuatis pedibus suis & tepefactis, spondis etiam lecti plantis affixis, & scapulis vel ministris firmatis, vel fascia ad reclinatorium alligatis, qui facturus est contra inferius paulo sedere debet & apprehensum embryulcum abscondere: & digitis tepefactis, & oleo perunctis, atque in vnum conductis, embryulci curuedine manus sinistra in orificium matricis iniiciatur. Et tentandum & quærendum, in quem locum embryulcum defigat. Atq; si partus in caput descendat; oculi, occipitium, & os aptissimæ partes erunt: si in latus, inter inguina, & coxas, defigi poterit: si per pedes descenderit, super pectinem recte infigetur.

Si ex prædictis locis nullus inueniri poterit: vbi cunq. loco vulnerato, embryulcum infigat: & erecta manu foras ministro tradat: Et eodem modo etiam alterum immissum alteri parti infigat, quem & ministro tradat. Ita autem æquabiliter infigi debent, vt cum conari cœperit parturiens, æquabiliter adduci possit.

Dein iube vt leuiter conari incipiat: ita vt cum matricem perceperit ad partem inferiorem, tunc & ipsa conetur: quoties vero matrix sursum ascenderit, ne conetur. Ipse vero digitus index ceroti inunctus, orificio matricis circumagatur vt illud aperiat, & strictura soluat, & si quid ibi corrigendum sit, id ipsum corrigatur. Interea frequenter loci oleo calido, & mucilaginibus irrigandi.

Sin vero

Sin vero infans foras prodire aliquantulum visus
erit partibus superioribus: iterum embryulci infi-
endi, quod tamdiu ac toties faciendum: dum to-
m corpus infantis prodierit.

Sin autem partes foras emissæ, nec embryulcum
mittant: nec reliquū corpus exire sinant: vel pars
antis aliqua præter modum, grandis fuerit: aut
tus mortuus (id quod ex frigiditate percipietur,
quod nil mouetur nec quid pulsant arteriæ) Em-
yotomia curanda, atque tum, partes quæ foris
nt, primum secandæ, si intro detrudi nullo modo
neant.

Si infans hydrocephalia laboret, vulnerato occi-
pio humor primum effundendus, vt vastitas suc-
bat. Si natura grande sit, prius est manu constri-
ndum, vel occipitio vulnerato cerebrum effun-
ndum.

Si autem in diuexum iaceat; & humeros lateri-
is vuluæ infixarit: & adhuc super vixerit, eius iugu-
ferramentum infigendum: vt effuso abundanti
guine, corpus foetus attenuetur. Sin venter hy-
opicus sit, & ipse vulnerandus. Manus & pedes et-
m intus præcidimus ab articulis. Si vero magnitu-
ne sua caput in interiore vuluæ parte absconsum-
erit, à gutture præcisum corpus, dextra manu ad-
ucimus.

Exsecto tandem foetu, omnes partes in mēsa col-
candæ, vt nil remansisse cōperiatur. Hoc toto ne-
otio perfectio, vterus oleo calente, & mucilagini-
us fouendus: & si sanguis fluxerit plurimus, restrin-
endus: bolo, rosarum pediculis, &c.

Si à partu puerpera non satis purgata fuerit, sub-
ce costum, pulegium, nepetam, satureiam, hyssopum,
& in cibo sumat nepetam, porrum, cuminum,
napi & olera acra, &c.

Hac de Prophylactica parte qua gestorum erroribus

E

debetur; sequitur qua fomentorum.

Atq; primum aeris Prophylactica.

Trophy-
lactica
aeris.

Aeris grauitas luculento foco ex sua uolentib; corrigatur, & suffitibus ædium frequētibus, vel fuitetur: atq; (nisi pestilentia cogat maturare) à graui in salubrem migrandi, prima ætas commodissimum tempus erit. Sin vero ex anni tempore aer temperatus existat: vel alias periculum minetur, tunc li Prophylactica obstandū, maxime ubi corpus, cui tempestatu excessibus consentiat.

Atq; hyeme (que saluberrima est ut plurimum in omni vento vacans) semel in die cibus sumendus, multus, nisi quis valde siccum & adstrictum vētre habeat, & consueuerit sapius, tum modicum prandeat, & ipsum siccū, sine carne, sine potione sumat. Victus totus esto siccus, austerus, calefaciens, meracius, panis multus; obsonia assa, potius quam elixæ potiones paræ, meracæ: olera sicca atq; acria: sorbitiones paræ admodum, vel nullæ, ac tum potio tanto parcior.

Labores multi: cursibus curuis, sensim accessione crescente: lucta in oleo, longa: & ab exercitio, deambulationes acutæ atq; celeres: à coena in tepore tardæ, & matutinæ admodum multæ, tum nocturna itinera suscipi poterunt. Cum palæstra quis se plenè exercuerit, ac lauare velit, frigida lauet: ubi alio exercitio, calida utatur: & humidiores, ter in mense sicciores, bis vomant à cibis omnis generis, post vomitum, sensim redeundum ad cibum consuetum, per tres dies: ac tum laboribus leuioribus ac parcioribus utendum: plurimis tamen, maxime diebus æquilonaribus, atque tum plus esse conuenit, diebus austrinis labores pares: cibus atq; potus parciores stratum durum.

Si cui ex frigore raucitas contigerit, hanc voci contētiōe arēere studeat: tussim vero inde ortam sanat spiritus cohibitio.

Si quis nimis refrigeratus sit. decumbat locis calidioribus, perunctus oleo irino, chamamelino, &c. Post, ubi modice incaluerit piper & myrrham, cum no dulci, odorato, ac veteri assumat: vestibus bene actus sit, & sudet: potus sint meraciores. Per maxima frigora iter captantes; oleo euphorbii articulis, partibus extremis, illinantur; & vinum bene aromaticum prius hauriant: nec nō aromaticum quid odorentur, atq; ore contineant.

Veris Prophylactica.

Sensum ab hyemali diæta, ad ver accedendum: ac Prophylactica veris.
labores detrahendi, & cibis mollioribus & a-
noscioribus vtendum: & iusta cum oleo in sole.

Deambulationes à coena detrahendę plures: pauciores mane.

Maza pro pane offerenda, & olera cocta sumēda, & opsonia elixa assis adæquanda, & balneis vtendū, & prandendum parum, vel parcius quam hyeme. & vomitibus vtendum primum quarto quoque die, deinde per longius tempus. Atq; vere, alius vomitu, alius sanguine, alius aluo, vacuandus pro natura & necessitate.

Paulatim cibo detrahendum, vt ad æstatem acceditur: ac potio dilutior, caro elixa, atque olerum plus, venus tum tutissima.

Æstatis Prophylactica.

Æstas saluberrima, cui multum Fauonius spirat. Prophylactica æstatis.
Eaq. tempestate cibis mollibus ac paucioribus vtendum: & maza magis quam pane: potibus mollibus, & aquosis vtendum & pluribus: atq. prandio modico, etiam ientaculo, & merenda, fructibus, vel cibis

rigidioribus, euchymis, & liquidis: & fructus cum cibo.

Potu inter edendum vtendum satis largo: & somnus à prandio levis, huic tempori aptus. Per diem minime bibendum: nisi corpus siccitate laboret.

olera acida, apoia, cocta, vomitio tantum, vbi repletio coegerit, venus admodum rara.

Laboribus ac cursibus leuibus vtendum, & exercitiis: cursibus circularibus, & rectis reuertentibus modicis, multo tempore, deambulatio esto in vmbra, & lucta in puluere, ac volutationes in puluere: coena deambulandum non est, sed saltem surgendum. Soles vitadi, item frigora, tum mane, tum vespere, quæ à fluminibus, aut stagnis, aut niuibus exhalant. Hoc tempore iuuenibus, bene carnosus, & calidis, die sereno, sub meridiem, & oleo vnctis, utile est totos vel mari, vel flumini insilire, & natand se exercere.

Hæc ad solstitium æstiuum gerenda, quo tempore omnia sicca adimenda & calida: etiam panes, nil voluptatis gratia concedantur: nam sequenti tempore vtendum mollibus ac humidis, refrigerantibus ac albis vsque ad æquinoctium per dies 90. quies, & laborum diminutio.

Si quis fortassis sole adustus sit: locis aeri expositis decumbat: atq. facies, manus & crura, frigida perfundantur. Si siti conficiatur, qui assueuerit, frigidam aquam bibat: sensim hæc omnia: interea cibus esto modicus atq. humidus. Quibus per soles necessitas incumbit proficisci, his caput & corpus reliquum, solis radiis bene tectum sit: & si oleo violaceo prius inuncti fuerint, æstum facilius ferent. Si ex sole valde squaleat, & siccus euadat: huic in balneum protinus eundem, perfundendumque oleo corpus & caput, deinde in dolium bene calidum descendendum est, tum multa aqua per caput infundenda: primum calida, deinde frigida.

Prophylactica autumn.

Autumni Prophylactica.

Ab æquinoctio per autumnum ad hyemem lente accedendum: quo tempore mutationes frigorum ac teporis, vestitu crasso vitandæ. Item in veste tum exercen-

ercendum: frictione ac lucta in oleo, vt sensim,
essio crescat; & deambulationes in tepore fiant,
calidis lauacris vtendum.

Somni diurni detrahendi: ac cibis vtendum cali-
oribus, ac minus humidis: & ipsis puris & potibus
rioribus, verum mollioribus, non tamen aquo-

Oleribus quam æstate minus. Venus parca, aut
lla: frigida potus tum fugiendus: maxime frigus
oræ, ac meridianus ardor cauendus: atque tunc
vere) vacuationum aliqua molienda. Neq; sine
te, nec sine calceis prodeundum: præcipue die-
s frigidioribus. Neq. sub dio pernoctandum, nisi
ne tectus sis.

Cibus paulo plenior, & potus parcior. Atque hæc
prophylactica esto: aere elemētaribus qualitatibus
temperato.

Pestis Prophylactica.

Sin autem aer venenatus pestilētia sit, vel immi-
at pestis metus: ac fugere datur, cito ac longe fu-
endum ac redeundum tarde: cito, i. quamprimum
na pestis affuturæ apparuerint: quod ex signis se-
entibus percipietur.

*Trophy-
lactica
pestis.*

Anni tempora suam temperiem non seruarunt:
maxime si ver frigidiusculum ac siccum; æstas post
idior & humidior fuerit: & totus añus sit austri-
s, nec austris vehemētibus, pestis futura metuen-
item si à vētis omnino aer siluerit, aut turbidus,
nebrofusq; magna ex parte fuerit: cumq; pluuiam
oe minetur, nec tamen pluat: & si eodē die, modo
gus, modo calor alternauerint: aerq; nunc turbi-
s, nūc clarus existit: & sequente die mane sol in-
nebulas puluerulentus apparet; item quando æ-
te à pluuiā subito, magna ranarum diuersi coloris
pia visitur: & numerosa insectorum copia scatet:
mq. ranarum caudatarum, serpētum & similium
oles vbiq. occurrens. Cumq; lumbrici popularites

grassentur, morbilli, & variolæ frequētes. Porro annonæ caritas præcedens, & abundantia sequens, omnīsq. fames populariter grassans, pestis causā esse solet.

Si superne aer infectus fuerit, aues relinquunt nidos, aeris color subluteus esse solet: & sol sæpe pallenscit, certe planetarum cōgressiones: ut Saturni coniunctio cum Marte, ut tradunt Astrologi & cometarum ortus, aliæq. impressiones igneæ locis imminentes, his pestem de cœlo minantur, tum montes abrepti, conuallium habitatoribus portendunt. Ad hæc si volucres volando intereant & altum volare soliti, humiliter volent.

Sin vero à terra pestis sit, agri & fontes fumantes graue olent: & terræ fructus cito putrescunt: & fungorum atque herbarum foetidarum copia scatet, & quadrupedes maxime omnium oues, tum primæ intereunt, & volucres prope terram volare solitæ sublimem petunt, & in cauernis latitantia prodire solent: mures, scorpiones, talpæ atq. troglodyta reliquæ.

Ab aqua si pestis sit, pisces mali odoris, atq. saporis sunt, & commoriantur.

Atque his pestis signis apparentibus, vel horum aliquibus, cito fugiendum, & longinqua regio sit, in quam fugias: etiam si fieri potest, altos montes infectis locis habeat oppositos: & loca in ascendente & eius horoscopo conuenientia vnde fuga fit, visitentur.

Et antequam totum solum contaminetur, maturandum gradu lento, cautione summa, ne per loca infecta iter fiat.

Reditus tardus admodum sit, domo prius ignibus, & suffitibus purgata.

Quibus vero non datur fugere, neque aer correctionem facile admittat: secundum Deum, Prophetis lactis his fidendum.

A

Ac primum purgamenta omnia vicorum, atque
um depurgentur: feles omnes & canes interfi-
antur: & diebus singulis, in publico, ad velperam
aes accendantur, quamplurimis in locis, ex mate-
odorifera, pura, sicca: vt iunipero, lauro, cortici-
aranciorum adiectis, absynthio, libanotide, la-
ndula, salvia, &c.

Conuentus frequentiores interdicendi, & ne
od edule putridum venale sit curandum.

Aer vitetur nimis patens & angustus nimis.

Aer.

Raro, idq. tantum cœlo sereno prodeundum, &
ium fenestraq. semper diligenter occludantur. Aer
estuet temperandus, semperq. siccandus est.

Qui domo egredi coguntur, haud prius exeant,
nam sol vaporem nocturnum, & nubium obscuri-
tem prorsus discusserit, vitent hominum turbam,
arctius consortium, præsertim vbi adhuc sunt ie-
ni, nam tutius est semper pransum domo egredi
nam ieunum, etiam optimis præsidiiis munitum.

Faciem ab eis vertant quos alloquuntur, & ven-
m si quis afflauerit, à tergo accipiant.

Ædes sint speciosæ, & plurimis cubiculis instru-
g, in quæ frequens fiat mutatio, dū reliqua interea
ro ac mane, igni ex odorata materia purgentur:
maxime tempestate pluuiæ ac nubila.

Ædes.

Ad ignem minime accedendum, nisi vbi frigus
iget: aere æstuante parcendum igni, post quem
ccensum aer denuo est refrigerandus: & semper
eris qualitati excedenti (nisi ea siccitas est) resi-
endum.

Cubicula, ædes, lecti, ac vestimenta, materia odo-
ifera, ac aromatica suffiantur: & odoramenta con-
raria tempestate vsurpentur, nisi caput graue sit aut
luxionibus opportunum, tum his abstinendū, ma-
xime admodum odoratis, & caput ferientibus.

Ex locis infectis allata chirotecis tractanda omnia:

& si edenda fuerint, abluantur, excorticentur, vel etiam coquantur atque ab infectis locis omnia diligenter cauenda.

Vestimenta nec valde calida, nec graua ex materia fiant spissa, textaq. pressius, nec vitiosa: maxime ex coriis puris hircinis, & ex serico omnes, holoserico excepto, item ex camelorum pilis confecta.

Sæpius mutantur vestimenta & suffiantur, præcipue indusia & corpori proxima, indusia lota prius, & munda stillatitia rosarum madefiant, in qua camphoram, & sandalū dilueris: Si tempestas fuerit calidior; sin frigidior, ex materia calida, ex decocto reos vel aquæ angelicæ, &c.

Vestibus reliquis quæ madefactionē non ferunt, adhibeantur suffitus pro anni tempestate, & corporis temperamento.

Dieta.

Dieta reliqua in his tribus consistat: vt nec calorē reddat auctiorem, nec corpus immodice humectet, nec multum cogat respirare.

Exercitia.

Plus quieti quam exercitiis dandum, & exercitia vehementem & crebram respirationē ne reddant. Ambulatio lenta sit, & loco temperato, & igne, vel suffitu purgato. Si locus salubris sit, sub dio: sin suspectus, sub tecto amplo, & maior ratio habenda loci in quo exercemur, quam in quo quiescimus. Hora exercitio esto matutina, postquam sol vaporem nocturnum plane discusserit.

Qui per loca infecta peregrinari coguntur, nocturne se committant itineri, nisi plenilunium sit.

Alimenta moderata sint, & quantitate & qualitate nisi tempus, aut proprium temperamentum aliud suadeant.

Arida edulia sint omnia, & locis altioribus & odoriferis nata, nonnihil item acerba vel acida, facilia coctu omnia, & euchyma.

Panis sit ex tritico locis soli patentibus nato, & simile

ale ad cereuifiā frumentū, solo non ſtercorato,
arna ſint aut bima, ante peſtilētem aerē collecta.
Huic pani iniiciatur hordei, aut ſpelte pars aliqua,
ſit fermentatus, & ſale conditus: furno pri-
mo coctus, & ligno puro, vel alia materia pura ca-
cto, & coctus biduum, iam molliuſculus edatur.
Interdum & biſcocto veſci iuuabit, azyma omnia
cructis incocta fugienda.

Carnes ſint ex ſicciffimis, vel arte ſiccatis, vt ſuilla
aſa & macrior prius frixa ex aqua & vino partibus
quibus, mox craticula toſta, tum incifa & condita, a-
ceto & ſaccharo, demum aſperſis. Vitulina aſa, ex
omphacio eſa. Veruecina aſa, & prius modice ſalita.
uniculus tenellus, lepuſculus, volucres ſi peſtis
aſſa eſt ſuperior altiffime volantes, & nidulantes.
ubi vero aer ſuperne infectus ſit, propius terrā vo-
lantes & commorantes, vt perdices, phafiani, & au-
es nemorales, item gallinæ iuuenes, quæ oua par-
iunt, & ex his nigræ, capi iuuenes. Et pulli galli-
acei, omnium carnes recentes ſint, hepata gallina-
um, caponum, & iuniorum gallorum, teſticuli, re-
quorum præterea viſcera nulla, aſſa potius quam
mixta omnia, humore proprio, ac ſuo turgentia.

Æſtate à carnibus abſtinendum niſi conſuetudo
id ſuadeat, & etiam reliquis temporibus piſcium
lubrium uſus eſto frequentior. Ex marinis ſaxati-
s & ſquamoſi. Aſelli recentes, mulli erythrini, bu-
oſſi, paſſeres, rhombi, lupi, mugiles, auratæ phyci-
es, coracini, gobiones, merulæ, paguri, turdi, pſitta-
trachuri. Ex fluuialibus trutta, ſalmo, umbra, lu-
us, mullus barbatus, carpio, aſtacus. Ex amnibus
uris, atq; hi magis æſtate conueniunt, pelagii ceto-
s temporibus.

Hyeme aſſi aut frixi in craticula, ex pipere pauco
el cinnamomo, vel cepa, vel aceto vel omphacio
comedantur.

Æstate elixi ex petroselino, sale pauco, & oxalides, vel aranciorum succo. Oua gallinarum recentium, sorbilia condita agresta vel omphacio, vel aranciorum succo Ex fructibus dulcibus carica tantum ac passulæ. Horrarii corrigantur cepa, porro, pipere, croco, &c.

Sumantur fructus & olera cocta prius, sub meridiem.

Ex fructibus acidi sunt aptissimi, vt mala punica acida, vel acido dulcia, & medicorum genus omne. Calidioribus tamen, mensa prima, & ante cibum: frigidioribus mensa secunda, pruna acida, poma curtipedula, sorba, mespilla, cydonia, pira hyberna. Secundis mensis, item iuglandes recentes, auellana, amygdala & fructus duriores: ex leguminibus, faba, fresa & pyreta, ex ciceribus, pis, lentibus addita oxalide, petroselino, croco; cinnamomo, atq. cremore in ceruicula traiecto & iterum cocto.

Ex oleribus acida conueniunt maxime, vel aliquatenus amara & oxypara, ex lactuca, cichorio, endiuia, oxalide, portulaca, & similibus coctis, & asperso sale.

Quouis anni tempore conueniunt, borago, buglossum, cichorium, endiuia, oxalis, pimpinella parua. Olera acra hyeme, æstate frigida humida. Sic in iusculis hyeme saluia, mētha, thymus, &c. Olera tenuia aut quater lauentur, aqua tepidiore priusquam versurpentur: asparagi, & lupulus, rapus, napus, pastinaca, cepa, raphanus, omnia conueniunt.

Æstate conueniunt iuscula glaciata tam ex pulpis carniū quam piscium, condita saccharo: vino albo, vel aceto, croco, cinnamomo, santalis.

Cappares sale conditi, & aceto prius leuiter cocti oliuz, condimenta fere omnia acida, vel austera, nisi ventriculi frigiditas impediat: atq. tum aromatizati aliquo, vel mentha corrigantur.

Pinguia

linguia vitentur omnia.

Aqua ad omnes vsus esto saluberrima : ex coelesti
isterna pura, superne fluitans, si causa pestis sit
erior: sin superne aduenerit corruptio, ex puteo
fundissimo hauriatur aut ex amne, vel fonte.

Fontana vel putealis, non prius hauriatur, quam
radiis, atq; calore puriorem effecerit. Sin insalu-
tis sit, coquatur cum pauco aceto & hordeo, vel
missa panis medulla.

Purgabitur optime, si chalybs, argentum, vel au-
rum candens, ea frequenter exstinguatur.

Vinum ac potus omnis, esto aquosum, ac tenue:
vinum album, vel subrubrum, odoriferum, modice
sterum, nisi senectus, quidve aliud meracius po-
ulet. Hydromeli ad acidum vergēs, cereuicia mul-
præstat.

A pastu sitientes, bibant ex aqua frigida syrupum
etosum simplicem, aut iulepum rosaceum.

Potus ac cibus; solito parcior sit: & quibus est de-
sta appetentia, condimentis excitanda.

Prandium coena lautius esto: coena parca, inter-
am nulla: iurulenta fugienda, vel tanto parcius bi-
endum.

Cibus saluberrime in tria tempora partietur vel
ura; ientaculum, prandium, merendam, coenam.

Cibus esto bene masticatus, & potu aliquanto v-
erior.

Si aluus adstricta sit, (inter alia) catapotia alexi-
pharmaca sumi poterunt, horula ante coenam.

Sudor spontaneus nec inhibendus, nec prouo-
andus.

Mane corpus manibus propriis leuiter fricandum
occis, ac mūdīs: vel chamæmelino, &c. vnctis, si cor-
pus densum sit, sin rarum, myrtino, aqua rosacea
pauca mista.

Caput consuetis, eluendum semel hebdomade

lixiuio ex odoratis, libanotide, lauro, lauendula, &c.

Pedes lauentur decocto rosarum, foliorum vitis salicis, arundinis, chamameli, & pauco salis adiecto.

Venere raro vtendum, forte septimo quoq. die vel rarius, pro corporis natura.

Somnus esto satis prolixus, nocturnus, longissimus à coena cubiculo prius suffito.

Ex pathematis, mediocris hilaritas, cum eximia animi securitate tantum iuuant.

Si sanguis redundat, vena secanda consuetis & ferentibus, quibus non conuenit, inedia, & frictio adhibenda.

Simulatq. suspicio est aeris corrupti, sanguis mitatur luna plena (si fieri potest) primum à dextro, mox à sinistro. Modus vt corpus onere, & mole liberetur.

Si corpus cacochymia particeps sit, leuibus medicamentis purgandum; & endiuia, cichorii, fumaria, lupuli, boraginis, scabiosa, marrubii, angelica, tormentilla, pentaphylli (quæ item solntiuis inquantur) frequens vsus esto, & partibus sympatricorum vsus esto frequētissimus; & pillularum communium: vt, Rec. aloes optimæ drach. 2. myrrhe electissimæ drach. 1. Croci orientalis drach. s. redacta in puluerem excipiantur syrupo absynthii, vel acetosi simplicis, vino albo, aqua scabiosa, &c.

Sumantur in crepusculo diei aut noctis, ventriculo inani, singulis hebdomadis drach. vna in nouē pillulas partita; primo die vna sumatur; tertio tres; quinto quinq. vel contra.

Aluo valde adstrictis, clystere vtendum, & vrinae secretiones fiant ex diureticis leuibus, corpore puro, aut prius purgato.

Admodum cacochymicis, tibiae vel brachia, ferro inurantur candenti, aut vlcera caustico potentiali irritentur.

Cutis

Cutis si adstricta sit: corrigetur frictione & bal-
&c.

pretiosi lapides tum gestentur: granatus, carbun-
us amici cordi, smaragdus cerebro, sapphyrus he-
os, corallus, ventriculo, hyacinthus, topazius, acha-
& vniones omnes aduersus pestem. Item cor-
nicornis, vel cerui, sumatur frequenter.

Hydrargyrus auellanae testa inclusus, & collo ap-
sus: item arsenicum rubrum, & crystallinum,
ta mucilagineque excepta, & rubeta puluere
nisto, colloque appensa pro magnis amyletis ge-
ntur.

Cedoaria, angelica, cortices aranciorum & ci-
orum, masticeantur frequentissime: & gingiua, ac
ntes, omni sorde careant: & panno aspero, vel
ntifricio, fricentur: & paululum decocti folio-
n lauri, vel corticum mali citrei, naribus hauri-
ur.

ape facies & os lauanda frigida, tantillo aceti
mixto, olfaciant mala arancia, citria, rutam, &c.
oma aromatica, & suaueolentia, gestentur ap-
nsa collo.

Cum frigidus est aer mane, panis assi modicum
natur, vino odorifero intinctum: interdum cari-
yna, nucis iuglandis minime rancida dimidium,
ia rutę quinque, salis momentum, in bolum con-
a sumatur. Vel puluis hyperici pondere drachmae
ius, vel 2. ex aqua buglossi, vel pulueris scordii ve-
antundem.

Sin aestus fuerit, iuuabit micam panis sumere suc-
limonum, vel aranciorum maceratam: item oxa-
is certa folia in aqua & aceto prius mersa, & pro
ntaculo sumta.

Sin hyems sit, theriaca: ætate, à quarto ad duode-
mū, adultis drach. 1 pueris drach. s. aut d. i. sex ho-
ante cibū ex sacchari puluere deuorata, magno

erit præsidio. Calidioribus tempestatibus electuaria frigida, vt diatrion santalon, disarrhodon abbatis &c. Alexiteria hæc in quotidiano vsu esse debent, vnde diebus singulis, mane, eorum aliquid sumatur: modo pillulæ, modo theriaca, atq; in nouiluniis, & pleniluniis, maxime cura gerenda.

Hæc de pestilentis aeris Prophylactica.

Sequitur errorum circa cibum ac potionem.

Prophylactica errorum circa cibum ac potionem. Si quis se nimium impleuerit: (quod secundum in ediam præcipue fugiendum) pro impletionis modo, vacuandus: atque si ventriculus crapula labore hæc ipsa est eicienda, si recenter ingesta, euomenda, sin vero a cibo satis multū temporis elapsū fuerit, erit, clysterib. potius est aluus irritanda & tepidis epithematis mitiganda: si cibus corrumpatur, (quod ex nidore rictus apparet) ex vini dulcis potu, vel aqua qualibet arte, pro viribus corporis vomendum.

Repletio. Si ex repletionē singultus oboriatur: spiritus compressio, vociferatio cum multo clamore, sternutatio, concitata deambulatio, vel triste quid inopinanti nuntiatum, singultum soluent.

Atque cum quis satur est, nihil ei tum agendum & si post aquam frigidam parce biberit, tum paucis lisper vigilet, deinde bene dormiat, multo facilius coxerit.

Si interdiu repletio fiat, post cibum, nec frigori nec æstui, nec labori, se debet committere, & si fatietas ex cibis tenuis succi sit, minus tædet quam e crassis & valentis materiæ.

Si puer nimis expletus fuerit somniculosior statim euadet, & torpidus: venter intumescet, & inflabitur: & vrinæ reddentur aquosiores: atque tum ei nihil exhibendum antequam prius ingestos cibos consumserit.

Crapula. Si crapula sit, eaq; ex potu, vel potando quis excesserit

ferit, nihil fere edendum ei: sin ebrius ex eo eua-
rit, continuo vomere studeat, ex aqua mulla pota-
giter, dum plurima iecerit, & morsus obtulerit:
si vomitus solio vtendum cum larga vnctione,
aliquo vero tempore quiescendum, ita vt sub te-
mine dormiat longissimo tempore, donec temu-
ritia soluatur.

Et quis aduersus ebrietatē muniatur, vel potando
minus lædatur, brassicam edat, & amygdala, & ab-
sinthii comam ante potationes bibat, & si ex vino
lorsus percipiatur, aqua frigida bibenda est, & po-
tando die rursus absinthii cremor sumendus.

Si cui vehementer crapuloso, & assidua cruditate
toranti, incubus (id est, suffocationis in somno i-
maginatio, & velut ingruente aliquo oppressio cum
silamandi impotētia, aut vociferatione nil signi-
ficante) huic vena secanda, purgāda aluus, & corpus
vacuandum Purgationes autem fiant cum
scilla, aut veratro nigro, vel confectione hamech: vel
diacolocynthidos, &c. victus tenuis sit, & fla-
uorum cautio esto maxima. Cruditate diminu-
dabores plus solito inualescant. His conuenit &
aninum prœoniā quindecim grana nigra, cū aqua
sa, assidue bibere.

Hæc de crapula.

Si in consuetudine ingurgitandi corpore repletus, quod
cibus labores superauerit, quis plenitudi-
laboret: hæc sensim est diminuenda.

*Repletio
particu-
laris.*

Repletio autem illa est vel secundum partes ali-
as repletas, vel corpus totum.

Secundum aliquas, est vel secundum partes pu-
as, vel corporis habitum.

Publicas, vel secundū caput, thoracem, ventrem,
scam.

Capitis repleti signa sunt: vertigo, capitis dolor, *Capitis
repleti s.*
oculorum grauitas, aures sonant, tempora gna.

saliant, oculi mane illacrymantur, caligantque, res oppletæ odorem non sentiunt, dentium gingivæ attolluntur.

Prophylactica. Prophylactica: summitates hyssopi, vel origanum terantur, & in ollula cum musto aut sape dimid heminæ deferuant: & iusculum ieiuno absorbetur, ad os colluendum, & gargarizandum, vel sinapula mulsa dilutum calida, eodem modo gargarizet, & pite prius operimentis calefacto.

Thoracis repleti signa. Thoracis repleti signa: totum corpus incipit dare, lingua fit crassior, sputum salsum, aut amarum aut biliosum existit, dolor costas & scapulas, sine occasione occupat: oscitatio frequens, vigiliæ, suffocatio, sitis ex somno, animus tristior, pectus frigidum, brachia & manus tremiscunt.

Prophylactica. Prophylactica: vomitus post cœnam, sine repetitione & vomitiones ante cibum: vomiturus autem radiculos tenues præsumat, nasturtium, erucam, napi & portulacam, & mox aqua tepida super bilis, contendat vomere.

Ventris repleti Prophylactica signa.

Ventris repleti signa. Venter cruciatur, turbaturque, cibis & potio maræ videntur, genua grauantur, lumbi nequeunt flecti, crura torpent, & totum corpus sine occasione laborat.

Cura. Cura: venter his molliendus betis, mulsæ incertis, alliis elixis, malua, laparho, mercuriali herba, ex melle confectionibus, cnici succo iniecto, si necesse est.

Si hepar, ac venæ sanguine turgeant, vel vires sanguinis copia premantur: alius molliter prius succudenda, tum sanguis pro redundantia, semel v partile, pro viribus redundantis mittendus, atque ad hoc vernum tempus est commodissimum: maius autumnale, si differre licet.

Si plenæ sunt venæ, ex hæmorrhoidibus vel me-

ais tardantibus, venæ circum malleolos vel ap-
pendæ: vel loca illa scarificanda: prius ex vena he-
mica satis copioso sanguine pro viribus exhausto,
in tempore, repletionis modo & consuetudine.
si circum vesicam plenitudo grauet, pleni ex ci-
modico esse videntur, inflationes ventris virgēt,
pallor totius corporis, somni graues, vrina li-
da, & vix erumpens, naturalia tument. Prophyla-
tica: vrinam cientibus opus est, videlicet, radicibus
niculi, apii, rusci, asparagi, in vino albo odorato
maceratis, & diluto ex his, duobus cyathis poto, ma-
diebus singulis: vel aqua helenii, smyrinii, dauci,
mixta.

*Repletio
vesicae.*

Hac de plenitudine partium publicarum eiusq;

Prophylactica.

in corporis habitus tantum repleatur, exercita-
tiones, frictiones, vnctiones, balnea repletionem
debunt.

*Hactenus de particulari repletionem, sequitur
corpora totius.*

corpus totum repletum fuerit, prædicta omnia *Repletio
totius cor-*
bibenda, a ventre sumto initio. *poris.*

plenitudo totius est duplex, vel qualitatibus tem-
perata, vel intemperata. Temperata quâtitate tan-
tum molesta est, & vacuationem tantum postulat.

Temperata duplex est, vel tanta vt in ventrem *Tempera-*
regurgitet, vel constans. Regurgitantis signa: Somno. *ta.*
grauitas capitis, & palpebrarum.

Regurgitans est duplex: doloris immunis, vel do- *Regurgi-*
lasi particeps. *tans.*

doloris immunis gradus habet duos: Primi gra- *Doloris*
signa: nares citra manifestam causam imple- *immunis,*

na coena: & quamuis repletæ videntur, nihil ta-
men emungunt, aut spuunt: & progressu temporis,
febras graues habent, & pruritus frontem occu-

F.

pat, & a cibis abstinere, & bibere minus possunt, & habitus tandem fit decolor: atque hæc signa gradus primi sunt. Gradus secundi, somni longi ac dulces, interdiu etiam dormiunt: post, somni accidunt iniucundi, & perturbantur, & cum aliquo videntur rixari.

Cura utriusque communis.

Exercitatum consuetis exercitiis citra lassitudinem, calidaque lotum, cibis omnigenis expleto: & vomere facito: a vomitu os, & fauces vino austerius abluant, & postquam quieverint, loco tepido deambulent, atque hæc die primo.

Postridie, deambulationibus utatur, & exercitiis reliquis detrahatur aliquid. Sin æstas sit, ne prandeat, at, reliquis anni temporibus, parum quid in prandio in coena dimidium consueti cibi detrahatur.

Tertio & quarto, exerceat se more consueti: & alimenta sint liberaliora quam die secundo.

Quinto vomat, & cibo utatur consueti: reliquis diebus cibus parcius, labor atque exercitatio copiosior, atque nisi hac arte repletio cessauerit, cum diebus duobus se largiter inuitauerit, repetatur, etiam si opus est tertietur.

Gradus secundus postulat longius tempus, & memorem maiorem.

Sequitur doloris lassi plenitudo particeps.

*Doloris
lassi par-
ticeps.*

Plenitudo doloris lassi particeps duplex est: vna toto corpore æquabiliter dolente, vel capite præter partes ceteras.

Cura communis.

Mollibus fomentis utendum & vnctionibus, & multa aquæ calidæ lotionem, vomendum & his, & bi sensim adhibendi, leues ac molles: etiam matutina deambulationes crescentes.

Cura propria æquabiliter lasso: A multis ingulis & cibis, primum acerbis, deinde salis, probe viciatis.

ant: quo facto exsurgant: & modice deambulent
 tepore: deinde dormiant. Mane sensim crescant
 ambulationes, & deinceps multę sint, & attenua-
 sit multa.

Vbi caput præter ceteras partes dolet, palpebrę a
 ena concidunt, & in somnis turbantur: videntur
 terdum calidiores: alius aliquando fistitur: a ve-
 ris vsu statim leuiiores videntur sibi, postque ma-
 grauuntur.

Cura duplex: Celerior & tardior.

Celerior: ex veratro vomat, deinde sensim exhi-
 ndi cibi leues, molles, ac aluum mouentes, ad di-
 decem: & cursibus tardis ac matutinis, & deam-
 lationibus citra defatigationem vtendum.

Prandeat, & a prandio somnus leuis: a cœna ex-
 rgere satis erit, venere abstineat: atque hæc cele-
 or cura est.

Tardior quatuor fere hebdomadis absoluitur.
 ima hebdomade, ante diem septimum multa ca-
 la lotus & cibis dulcibus, ac salis expletus, vome-
 contendat, statim quiescat, sequentibus diebus
 mane, tam deambulationes, quam exercitia reli-
 ua, paulatim augeantur atq; etiam cibi.

Secundę septimanę die primo, vomat vt prius,
 m quiescat, postremo sensim exerceatur, & dein-
 ps ad quatuor septimanas sensim, & laborum &
 borum, adiectio fiat: atque tum, (expletis qua-
 or hebdomadis) dięta ad consuetum morem pau-
 tim redigenda.

Sequitur repletio in ventrem regurgitans.

Hic venter grauatur, estque duplex: vel recepta
 reliquum corpus regurgitat, vel nunquā recepta.
 Receptę signa ructus acidus, receptę gradus sunt
 quo: Primo gradu ructus acidus a cibo, color im-
 mutatus.

*Repletio
 in ventrē
 regurgi-
 tans.
 Recepta.*

Secundo gradu, rufus acidus die sequente.

Cura communis est utrique, nisi quod in secundo gradu pluribus est opus exercitiis. Cura duplex: velocior, tardior. Velocior fit hellebori pharmaco modo prædicto. Tardior, calida totus die primo, secundo vomat, septimis diebus sequentibus victu consueto vtatur.

Tertio die vigesimo denuo vomat, deinde cibus vtatur cōsuetis ad diem trigesium, ac nisi tum curatur, eadem ratio quarto repetatur. Cursibus vtatur circularibus, paucis ac velocibus motibus parum calefaciētibus, frictione copiosa ac diuturna, & post exercitium vnctio: Deambulatio multa mane ab exercitiis reliquis & a cœna. Omnis laboriosa, balneum calidum ieiunus, & cœnam exspectet.

Hæc de cura plenitudinis regurgitantis admissæ, sequitur nunquam admissa.

*Nunquam
recepta.*

Estque duplex: in prima flatus ieiunum infestat magis magisque, & a cibo meliuscule habere videtur, ac tandem diarrhœæ, ac dysenteriz metus inuadit.

Prima.

Cura: die primo, ad decimum cibo detrahendū, prandium intermittendo, & cœnæ partem tertiam demendo, labores augendi, cursus, lucta, deambulatio ante exercitia, reliqua mane, & post exercitia gymnastica.

Die decimo, ad decimum quartum: dimidium cibi in cœna ablati, addatur, vomat: atque hac diata quadriduum vtatur.

Decimoquarto, ad vigesimum: reliquum cibi, quod ablatum fuerat, restituatur: iterum vomat, ac pluribus laboribus, & exercitiis vtatur.

Secunda.

Secunda. Signa: vomitus, dolore tamen ventris nullo: decoloratur: suffocatur: & inualefcit malum donec euomuerit, atque huic repletionis generi maxime densi corporibus obnoxii sunt.

Cura:

Curâ: cibus utatur acris, ac siccis, austeris, & o-
 eratis: & per urinam ducentibus: atque prandio
 nitus abstineat: & exercitatio adhibeatur multa
 in superiores, quam inferiores partes exercens: &
 cans.

Deambulatio esto multa ab exercitio, pomeri-
 ana, item a cœna, & matutina, vocis exercitatio
 una.

Decem primis diebus tertia cibi pars subtrahatur:
 quatuor tantum partes dentur: & duæ auferan-
 tur. A decimo, ad decimum sextum, addatur dimi-
 num subtracti cibi, vna sexta, ut quinque partes
 insueti prius cibi sumat, ac die decimo sexto, vo-
 mita, a 16. post vomitum, usque ad vigesimum, qua-
 tor tantum partes adhibeantur. Die tandem vige-
 simo (qui decimus est a vomitu) redeat ad consue-
 tam vivendi rationem, exercitiis tamen multis &
 curibus quam pro ciborum ratione. Haftenus de
 pletione temperata: sequitur intemperata.

Hic qualitatis pariter alteratione opus est, cum
 quantitatis diminutione.

Intemperata est duplex: frigida vel calida, frigi-
 de signa: egestio alui cruda: Cura: acris salsa.

Frigida est duplex: simplex, composita. Frigida
 simplicis signa, ructus die sequente a sumto cibo
 oparent: Parcior est egestio, quam pro ingestorum
 copia: venter doloris expers tamen. Cura: panis syn-
 comistus, fermentatus, intritus in vino nigro, aut
 carne carnis suillæ, pisces cocti in acris muria: carnes
 suillæ bene coctæ, porcellorum, catulorum, hædo-
 rum parcus. Ficus cum cibus reliquis, & vini meraci
 potio ipsis potio, olera acris, vel reliqua correpta minus
 acris.

Somni longi dieb. primis, ante exercitia gymna-
 stica: ante meridiem, & prandio abstineant, & post
 meridiem ubi se gymnastica exercuerint, ante cœ-
 nam indormiant.

*Intempe-
rata.*

Frigida.

Simplex.

Exercitationes autem siue cursus reflexus, sensim increfcens.

Lucta vncta: mollis, vnctio multa. Deambulatio matutina multa, ante coenam pauca.

*Hac de simplici, sequuntur composita,
frigida, humida.*

*Composi-
ta.*

Signa: Corpus attenuatur tandem, digestio frigida, humida, liquidaque, nec venter dolens.

Cura. Alimenti pars tertia auferatur, id est, quatuor partes edat, duas omittat. Prandio abstineat prorsus, panis ex tota farina, clybano coctus, calidus in vino astringente, & meraco tinctus. Pisces elixentur cum muria: assentur cum aceto: & ex horum partibus, dorsum, & cauda, sunt aptissima. Carnes omnes condiantur sale, vel aceto, ex quadrupedibus, canina assa: ex volatilibus: palumbes, & similes, tam assa quā elixa: Vinum nigrum, astringens. Exercitationes, deambulationes matutinae, & vespertinae, & vtrisque super dormiat. Cursus sint curui, sensim augescentes, frictio & vnctio multa.

Frigida sicca.

Primis decem diebus cibi pars quarta auferatur, reliquis diebus sensim ad consuetum reducat. Panis purus, furnarius, obsonia dulcia, pisces cocti cum intritis, carnes suillae coctae, extremitates bene coctae: pleraque assa, vuae, & ficus copiosae cum reliquis cibis, vinum mustum, expers austeritatis. Prandeat parce: Exercitiis vtatur frequentibus, sint autem cursus curui, sensim crescentes, ad extremum item circulares post cursum, lucta cum oleo matutina. Deambulatio copiosa, post exercitia non multa, a coena, tantum exsurgat: ab exercitiis, balnea calida somnus multus, stragulis mollibus, veneri his interdum indulgendum.

*Hac de frigida intemperata, sequitur intemperata,
calida.*

Hic

Hic frigefaciendum, pariter ac vacuandum. Ca *Calida.*
a est, vel calida humida, vel calida sicca.

Calidæ humidæ signa: alius excernit liquida, & *Cal. hu-*
mida. cocta sine dolore: si conuenientibus exercitiis *mida.*
antur, sin vero his abstineant, dolor, labor, & cibi
tridium. Dixta frigida humida fit.

Primis decem diebus exercitiorum dimidium au-
ratur, & alimentorum dematur pars tertia, maza
ntur non recenti vino dulci emollita, pisces esto
cissimi: cocti absque oleo, & sale. Carnesque vo-
rum assæ: perdicis, & galli, absque condimento,
porina esto reliquarum ferarum in aqua cocta, o-
a refrigerantia, beta cocta cum aceto potus, ae-
um nigrum, austerum. Exercitia: cursus circula-
s concitati, frictio pauca, lucta pauca, acrocheris-
us, chironomia, corychoniachia, volutatio in pul-
re quatuor hæc moderate: Deambulatio ab exer-
cio moderato, vt respondeat laboribus, maiore a-
ena quã cibus postulat vtatur, matutina, quæ cor-
oris habitui conueniat. Balneum tepidum, & post
sum, quies, post dies decem, vomere studeat, cor-
ore prius sequenti ratione præparato.

Alimentorum prius ablatorum dimidia, exerci-
orum pars tertia: vtrobique vna sexta eius qua sa-
us vti consueuerat addatur.

Cibi autem sint sicci, & austeri, ac primis statim
ebus quibus talibus cibis vti cœperit, vomat: post
omitum per dies quatuor, cibo, & exercitio parti-
o, vtatur parciore.

Vigesimo die aduentante, cibo ac potui, addatur
quod ablatum fuerat, sed exercitiis non item, vini
quantum cum sanus esset, bibere consueuerat: inde
omat, post vomitum, coena contentus sit, dum
onualuerit.

*Hæc de repletionem calida humida, sequitur
calida sicca.*

Cal. sicca.

Signa: dum incipit: fæces alui sicca, vtræ, os siccū, ac tandem amarum, alui, & vrina supprimuntur.

Cura: refrigerandum, & humectandum: cœna, prandioque vitatur. Cibi: maza non recepta, respersa, panis ex tritico trimestri, succo fufurum fermentatus. Potus: vinum aquosum ac lene, olera quauis cocta præter acra: pisces leuissimi, omnis generis cocti, carnes suillæ, & earundem extremitates anteriores coctæ, hœdina, agnina, vitulina coctæ: fructus humectantes post reliquos cibos, ex leguminibus: ciceres virides, aut aqua macerati. Labores sint pauci & quieti, deambulatio mane ab exercitio, balneis vitatur. Somnus nocturnus esto levis, diurnus a prandio brevis. Primis diebus dimidia pars exercitiorum dematur, atq; corpore prius cibis dulcibus, pinguibus, salis, copiosis preparato plurimis diebus, vomat post vomitum sensim per dies tres cibus exhibeatur, moderatus, decimo die, exercitia augeantur, & si adhuc signa adfuerint repletionis, vomitum repetat: sin minus, in præscripta victus ratione pergat dum confirmatur.

Hac de repletionem.

Inedia.

Si quibus de causis inedia futura sit, labor omnis tum est vitandus.

Qui fame laborant, refouendi pulegio odorato, & pane recenti naribus admoto, & admota carne suilla affata, aut elixa, & panis vino diluto intinctus offerendus, & oua sorbilia, ac iuscula liquida paulatim, & crebro offerenda: & cibi omnes liquidi, euechymi, & concoctu faciles.

Si quis aquam frigidam vel vinum, aut potum consuetum, a balneo, vel cursu, aut vehementi exercitatione liberalius, & confertim potauerit, huic sanguis protinus mittendus est.

Cui aquam corruptam bibendi necessitas incumbit, huic coquenda est cum feniculo, aut pulegio:
vafis

vasis figlinis & sub dio tenenda ac frigefacienda, & tum denuo calefacta sumenda.

In peregrinationibus aut exercitu, fossæ faciendæ sunt, ab altissimis locis ad decliues, per quas duccenda est aqua in totas fossas: terra dulci immissa, & pingui, si aqua nitrosa sit: cibi hebetantes sumendi, & pinguiore. Aluminosum vinum tenue: crassum, allium, cepe, & omnia urinam ducentia corrigunt.

Hirudo si forte pota fuerit, quod exsuctione perripitur, muria absorpta excutietur, si faucibus hæreat, lupinorum farina iniiciatur, & aqua frigida ore contineatur.

Si qua suspicio veneni cibus admisti fuerit, vitetur condita omnia, & intenso sapore dulcia, salsa, *Suspicio veneni sumti.* vel acida, vel quouis alio sapore, insignia, nec sitibundi affatim bibere, aut esurientes voraciter comesse conuenit: & semper ad omnium saporem est attendendum, & maxime potu frigida aqua præsumenda, vel optimum erit alexipharmacorum aliquid præsumere, cuiusmodi sunt caricæ cum iuglandium nucleis & seminis napi cum vino drachma vna, vel rutæ folia cum iuglandibus, & præter cetera omnia, Andromachi theriaca ex vino.

Vbi vero quis degere cogatur locis venenatis animalculis obnoxiiis: culina apparetur sub dio, & sub dio cibi, ac potus condantur.

Si sub tecto apparetur: laquearia diligenter animaduertenda, præcipue vasa vinaria, & lactis omnia. Vbi suspicio fuerit sumti iam veneni: sine mora calidum oleum ex aqua, aut seorsim sumatur, & vomere conetur: vel olei loco butyrum sumat ex aqua calida cum malua, semine lini, vrticæ, fœnigræci, &c. Cumque vomitus diligenter citatus fuerit, ne quid restet in ventre, intestinis hæretes reliquiæ elysere acri deuocentur, iuuat & nitrum tritum su-

90 DE SANIT. TVENDA PARS I.

mere cum hydromelite, & vina vetera liberalius pota, siciuscula gallinacea, pingues pisces, & carnes vetustæ, & pingues, adipe aut butyro, recenti paratæ. Quinetiam dentur abrotanum, eryngii radix, semen pastinacæ, succus marrubii, betonica, & cetera quæ communi dote aduersus venena profunt: drachmæ pondere ex vino.


*Suspicio
cacochy-
mia.*


Ex cibis corruptis, vel alia ratione qualibet, in cacochymiam si quis inciderit, atque humor crassus, ac lentus sit: incidendus ac tergendus, & corpus totum laxandum, ac faciendum fluidum, & nisi coqui possit humor purgandus. Coquetur autem quod coctioni paret, quiete pro cruditatis ratione ac somno, & cibis, potionibusq; moderati nutrimenti, & qualitatibus moderatis: vt, ptisanæ cremore, atque ipsa ptisana: mulsa, oxymelite, apomelite, zinzibere, pipere, & similibus cibis inspersis. Ex carnibus: aues montosæ. Ex piscibus, saxatiles. Ex oleribus, lactuca. Panis clybano coctus, fermentatus, modice purus. Potio: oxymeli, mulsa, vinum tenue & albidum. Deinde (cruditate ablata) sensim ad consuetudinem redeundum.


Sin autem humor coctioni ineptus sit, præparatus (si opus est) prius, purgandus. Bilis, cholagogorum vt rhabarbaro, thamarindis, rosarum pallidarum succo, &c.


Pituita, agarico, turbetho, colocynthide, &c. Melancholia, fumaria, senna, helleboro nigro: secundum cacochymici vires, & cacochymiae mensuram, & diæta tota in contrarium mutanda, dum cacochymia prorsus cessauerit: omnia per quietem, ac otium.


F I N I S.














THERAPEVTICA;

Hoc est,

DE SANITATE

RESTITVENDA,

MEDICINÆ

PARS ALTERA:

Auctore

TIMOTHEO BRIGHTO CANTABRIGIENSI, Medicinæ doctore.

OMNIBVS cuiusvis facultatis studiosis perutilis, ac prope necessaria.




28.

FRANCOFVRTI

Ex Officina Paltheniana, sumtibus hered.

Petri Fischeri & Ionæ Rhodii.





HONORATISSIMO

VIRO DN. GVLIELMO CECILIO,
 reclaro ordinis, quem vocant, Garterii militi, Ba-
 roni de Burghley, summo Angliæ Thesaurario, &
 Cantabrigiæ Academia Cancellario dignis-
 simo, Thomas Brighthas, Cantabri-
 giensis, S. P. D.



*V*m primum in animo haberem (honoratissi-
 me Cecili) Medicina artem methodo explica-
 tam in vulgus edere; & quæ apud me prius-
 tim commentatus sum, cum aliis communica-
 re; id simul occurrebat, cuius nomini imprimis
 meos literarios labores consecrarem: qui & eruditione
 tanta esset, ut de suscepto instituto recte iudicaret; & aucto-
 ritate tantus, ut maledicentium vocibus imperaret. quorum
 alterum pergenti mihi animum daret; alterum, securitatem:
 ut labores mei, ob virtutem, & sapientiam (cuius nuncu-
 rentur) eidem cultus atq; amoris testimonium exstarent:
 a eadem sapientia, & virtute scripta mea comprobata, ab
 aliis avidius expeterentur. Si quid nouum, ipso nouitatis nomine
 continuo apud imperitos quorum pars longe maxima existit,
 suspensum est, & suspectum habetur: sin vero recte explicatum
 quid sit, id non illi simplices, sed periti ad inuidiam rapiunt,
 odunt, & liuore insectantur. Ergo tu occurrebas (honoratiss-
 imi) ex omni nobilitate vnus, cui & Musa nostra debet istud
 testimonium: & à quo comprobata studia nostra, (quia tanta
 sapientia ei) & presentibus, & posteris, per te futura sint gra-
 tiora: tuo nomini cedit nouitatis odium; cedit inuidia calu-
 nia. Atque ita iam tum ex rumore tantum atque homi-
 num vocibus de te existimaram. Cum vero aliunde ex cer-
 ti relatione accepissem, te haud scripturientium libi-

4
 dinem probare, librum antequam prae lo tradatur petere, ve-
 le ante cēfere; magnum edium testimonium prudentia tua
 mihi spem fecit, quod postea coram sermonibus cognovi, te vo-
 num esse cuius iudicio permultum ad scriptorum meorum lau-
 dem, & auctoritatem accederet, ut qui non tantum civilibus
 causis atq; reipublica negotiis, aequitate, ac iustitia prae-
 omni Philosophia parti successivis horis aliquid otii imper-
 tias: Medicina autem & ad valetudinis curam, & honestum
 animi oblectamentum (magnorum Regū atq; Imperatorum
 exemplo, Tiberii, Hadriani, Iustini, Lyfimachi, Gentii) in-
 studeas, ut huius facultatis scientia, vel cum ipsius artis Pro-
 fessoribus fere sis comparandus. Quid te solum dico (Clarissi-
 me Cecili) literarum scientia, atq; omni Philosophia rerū
 consularum cognitione excellentem? Cuius familia tota docti-
 est, & in ea communis Graecarum literarum (ut olim Cornelia
 Latinarum) & omni humanitatis scientia celeberrima, a
 honorem & amplitudinem tuam praeferquam ex virtute a-
 pietate, magnum vita solatium; summum accedit ornamen-
 tum: ut domus Ceciliniana cum ipsis Academicis literarum
 laude contendat. Ecce ergo tibi Medicina nostra incremen-
 tum, honoratiss. Domine, quantum id si requiras, certe omni-
 um morborum communem, dyscrasia autem, propriam com-
 plexum Therapeiam. Cum vero dyscrasia omnis, vel ex ele-
 mentari qualitate ametra; vel ex venenata contaminata o-
 riatur; utramq; a summis ad infima persequuti sumus. Et
 Hygieina tenes institutum, quod cum probas (probas autem
 & auctoritate & iudicio) alacrius pergimus, & in eo toti su-
 mus, quantum per negotia, reig, familiaris curam liceat, v-
 univsum medicina corpus, & ad sanitatem, & ad pulcri-
 tudinem omnibus membris conformatum, & ex cultum, Ce-
 cilianis auspiciis in lucem, atq; hominum conspectum produ-
 catur. Quod autem concisis partibus edimus, hanc fabrica to-
 ta, dabis occupationibus. Interea dum totum absoluerimus
 tibi magni voti reos nosmet habemus. In Therapeutica hac
 que admodum in Hygieina fecimus, a magni nominis au-
 thoribus cogimur dissentire; atque adeo in reliquis dissentie-
 mus.

EPISTOLA DEDIC.

5

us: diffensionis autem causas Scholiis quas in hac, & in ce-
a meditamur, aliquando dicemus. Interea lege illa ma-
ia, atq; forma artium omnium; veritatis, iustitia, sapien-
methodi, in eo erimen (si quod commissum sit) id omne in-
e recipient. Proponimus nobis artem secundum illas leges
scribendam; hanc si minus assequimur, saltem sequimur;
alii persequendi auctores sumus. Mihi autem vel operis
ium esse satis erit. Superfunt adhuc morbi conformationis
nes, & omniū composita Therapeia. Conformationis mor-
certis obstructionibus acceptis) fere (chirurgici sunt. Ex-
etabis ergo a nobis in posterum (sapientissime Cecile) The-
reiam Chirurgicam, cum illarum obstructionum morbis,
a Physicis remediis parent, atq; reliquorum omnium com-
itam Therapeiam. Interea conatus hosce nostros, & tam-
am solidi corporis umbram (ut facis) boni consule. Adde-
us aliquando soliditatem, nervos, succum, sanguinem &
rem. Alii vero nec ipsi occupati, nec honesti otiosi (si tan-
a seipsis impetrare queant) probris aliquando abstineāt,
, definant maledicere. Deus Ecclesia sua, & Reipub. An-
cana bono, amplitudinem tuam in vita tueatur, & labo-
us exantlati, fatog; perfunctum in aeternas beatorum se-
suscipiat. Cantabrigia, ex edibus meis 14. Martii, 1582.

Amplitudinis tuæ
studioſſimus,

TIMOTHEVS
BRIGHTVS.

A 1

In secundam Medicinæ par-
tem D. TIMOTHEI
BRIGHTI. •

*Nuper adumbratos Medicina vidimus
artus,*

*Qualis Apellea pingitur arte Venus:
At deerat pectus; pectus quoq; BRIGHTI
dedisti,*

*Cultaq; cincinnis est Θεραπεία tuis.
Adde pedes reliquis supremaque robor
membris,*

Principiis fines; & Dea qualis erit?

ΕΙΣ ΟΝΟΜΑ ΤΟ ΤΟΥ ΕΥΜΕΘΟΥ
δικαστήτου Ἰατροῦ τῆ Τιμωθένος Βρίχτου,
ἔτ' ἐπὶ λαμπροῦ δίσκῳ.

Οὐ τὸδε μαψιδίως λάχες ὄνομα· ἐστὶ
γὰρ αὐτὸς
Λαμπρὸν ἐν Ἰησοῖς φῶς μεθόδου
φέρων.

MEDI-

MEDICINÆ THE-
RAPEVTICÆ PARS, DE
DYSCRASIA CORPORIS
humani;

Auctore

TIMOTHEO BRIGHTO D.
Medico Cantabrigiensi.

Therapeutica.



Therapeutica, est secunda pars Medicinæ de sanitate restituenda.

*Therapew-
tices defi-
nitio.*

Sanitatis restitutio fit ametriarum correctione.

Ametria, est vitium partium sanitatem constituentium.

Ametria.

Ametriæ corriguntur remediis.

Remedium est therapæiæ opus ametriam expu-
nare affectum. Excipe quibus vires prorsus succu-
unt; nec ad integram therapæiæ historiam recrea-
queant.

Remediū.

His manus abstinenda, atq. mors ipsa prædicēda.

Virium

Signum vero huius imbecillitatis est pulsuum ad
phygmiam præceps declinatio.

*prostrata-
rum signa*

Deficiunt autem vires prostratæ duobus modis:
vel Dissipatæ, vel Suffocatæ.

*Prostratæ
vires duo-*

Si vires dissipantur, pulsus declinantes eduntur
intra inæqualitatem.

*bus modis
deficiunt.*

Dissipantur vires dupliciter: vel sensim, vel repēte.

Dissipatæ.

Sensim.

Sensim dissipatae hanc pulsum seriem, edunt
languidum, paruum, rarum, tardum, si nullus aflu-
subsit; si quis autem sit, crebrum, atq. vehementem
deinde myurum reciprocum, reciprocum deficientem,
myurum non reciprocum, formicantem, abo-
litum apparentem, atq. tandem vere abolitum.

Repente.

Sin vero repente vires deficient, talem pulsum
seriem obtinent: languidum, paruum, crebrum, ce-
lerem, vndosum, vermiculantē: formicantem, abo-
litum apparentem, atq. tandem vere abolitum.

*Atq. virium dissipatarum pulsus ita habent: suffoca-
ta sequentem seriem ostendunt.*

*Vel suffo-
cata.*

Languidum, tardum, rarum, & continuo inæqua-
lem; nunc languidū, nunc vehementem, nunc par-
uum, nunc magnum, nunc celerem, illico tardum,
crebrum statim autem rarum: & quo plures sunt
magni, vehementes, &c. eo minus vires pressas of-
tendunt. Vbi autem magis adhuc pressae suffocantur,
intercurrentem, intermittentem in pulsum mul-
titudine (quæq. intermissio diuturnior, eo pericu-
losior existit. Diuturna autem est, quæ duos pulsus
excedit. Iuuenibus periculosissima pulsum inter-
missio; minus pueris, minime senibus; nec iuueni-
bus admodum, quibus ea intermissio familiaris. At-
que intermissio si diu perseveret, repentina mors
expectanda.)

(intermittenti vicina est quies externa diutur-
na, in qua pulsus citra inæqualitatem existit: inter-
mittens inæqualitatem obtinet) tum intermitten-
tem in vno pulsu (ex quo genere sunt capricans &
dicrotus) tum vndosum, vermiculantem, formican-
tem, (atque si arteria dura est, nec vndosus, nec ver-
miculans esse queunt) tum myurum in vna disten-
sione reciprocum, tum non reciprocum, ultimo de-
ficientem, non reciprocum.

Pulsus

MEDICINÆ, PARS II.

9

Pulsus omnes hi, si ordinati etiā sint, certissimum
crimen minantur.

Atq; hac virium desperatarum signa sunt:
atq; Anomalia communis:

Remedii partes sunt duæ: Agendi vis contraria: *Remedii partes*
huius recta committendi ratio. *duæ.*

Agendi vis contraria ex duobus cōsistit: Ex qua- *I. Agendi*
te contraria: Et copix, siue quantitatis paritate. *vis cōtra-*

Agendi vis cōtraria duplex existit: Homoiome- *ria ex qua*
vel Anomoio메라. *litate con-*

Homoiomera est item duplex: Phytica, vel Chi- *traria.*
gica. *Homoi-*

Phytica est, quæ naturæ viribus infertur. *mera.*

Phytica est vel Diætetica; vel Pharmaceutica.

Diætetica est, quæ ex diætā petitur.

Pharmaceutica est, quæ pharmaco infertur.

Pharmacum est natura, extra diætā posita. *Pharma-*

Pharmacum ad partes internas, qualitatem de- *cum.*

teriam haud obtineat, & ad omnes partes quibus
operetur, quantum eius natura ferat, esto sympathetum:
ad viscera autem adhibitum, roborans, & contractionis
particeps, maxime ventriculo laborante.

Porro consistentiam habeat proprias vires tuen-
dam, quoad partis affectū conformatio id ferat: &
cum fieri potest gratum id esto, vel saltem haud
nimis ingratum. Medendo autem, in eodem
manere, per varia pharmaca euagari licet; atq. quod
maxime conuenire compertum est, id sedulo vsur-
andum.

Pharmacum est duplex: Naturale vel Artificiale. *Natura-*
Naturale est tale, quale natura editur vsurpatum: vt *la.*

Opuscula, bolus armena, rosa, &c.

Artificiale, est arte confectum, vt Syrupus, Empla- *Artifi-*
sternum, Cataplasma, &c. *ciale.*

Haftenus vis physica.

Chirurgica est, quæ manus opera fit, vel instru-
mento chirurgico: vt trepano, glossocomio, nouacula, &c.

Vis homoiomera ita habet: sequitur

Anomoimera.

*Anomoi-
omera.*

Anomoimera, est ex homoiomeris inter se mi-
stis.

Anomoimera est duplex: vel ex physica mista
physicis; vel physica chirurgica.

Physica physicis, vt diata & pharmaco.

Physica mista chirurgica, est vel alterutra princi-
pi, vel subsidiaria.

Physica mista chirurgica, est porro duplex: alteru-
tra Physica, vel vtraque.

*Haftenus qualitas contraria; sequitur
quantitatis paritas.*

*Agendi
vis ex
quantitatis
paritate.*

Quantitas par, est ametriae vehementia æqualis
Vehemētia percipitur ex symptomatum magni-
tudine: hzc autem, ex ipsis cum pistrinis actionibus
operibus, & corporis qualitatibus comparatis.

Atq; hic, morbus corpori, vel corporis parti valde
dissentiens, remedii vim eo fortiolem postulat, &
quantitate auctiolem.

*Vis contraria ita se habet: sequitur recta
committendi ratio.*

*II. Recta
committ-
tendi ra-
tio.*

Recta committendi ratio in duobus consistit: in
aditus commodi delectu; & virium dosi.

*Aditus
commo-
dus.*

Aditus commodus est in ametriam directus: quod
nisi natura detur, neque res aliter expediri queat,
arte paretur, siue pharmaco, siue instrumento Chi-
rurgico.

Aditus si longus sit, medicamenti consistentia
eo liquidior esto: atque si opus est, adiunctum ha-
beat vehiculum, naturæ tenuitate præditum: vt vi-
num, acetum, &c.

Aditus autem in partes natura directi, tales sunt
in ce-

rebrum, sinciput, coronalis futura, aures, nares.
Palmones, latera, interna, & thoracem : Ore
hausta, vel sensim lambendo deglutita.

ventriculum, iecur, lienem, adnota e regio-
in ventrem sumta.

renes : extrinsecus adhibita, sumta, & subdita
sedem.

intestina superna, os, inferna, sedes.

vesicam, & uterum : e regione applicato, assum-
missa.

Aritus delectus talis esto : sequitur

Dosis.

Dosis est quatum semel agrotus, vel pars agrota *Dosis vi-*
ficari sustineat : siue loco, siue viribus ; siue quod *rium.*
estum est.

icurationis atque creationis ametriarum, pa-
tempora sunt, nisi admodum leues eẽ sint : tum
q. cito tolli poterunt.

Dosis duplex est : Conferta, vel partita.

Conferta dosis omnem ametriam, vel maximam *Conferta.*
partem tollit : Estque ametria acuta : & virium
starum.

partita dosis, partem tantum ametria tollit. est- *Partita.*

ametriarum, viriumque contrario sese modo

gentium : atque initio maior dosis, atque validior

Et prior dosis, ubi partes suas egerit, altera ap-

manda : eaque toties repetenda, dum tota ame-

reuanuerit.

Hac de Dosi.

ametria, si vel sede, vel natura obscura sint, pri- *Ametria*
an exploranda. *exploran-*

sedes ex propria functione lasa deprehenditur. *da.*

ametria natura ex functionis specie lasa & hu-

adendi ratione. Hæc tamen si adhuc obscura

res permittenda naturæ, quæ recta diata adhibita

rem prodet tandem: sin minus; ad experientiam analogismum est perfugiendum.

Ametria, est vel simplex; vel composita.

Ametria simplex. Simplex Ametria, simplici remedio expugnabitur poterit.

Ametria simplex duas obtinet species: Solitaria vel caussis fota.

Eaq; Solitaria vel Solitaria ametria, remedio solitario est expugnanda.

Causa fota. Causis fota, remedium postulat, & has fouentes extirpans: atque in fotis, à causis fouentibus extirpandis therapie initium esto; & qua sese intulerint serie (si plures eæ sint) eadem auferantur. Excipio quid grauius vrgeat; tum huic prorsus (ceteris intulit ea haud neglectis) studendum.

Vrget autem grauissime primum quod egrotum in maximum vite discrimen perducit: cuiusmodi virium iactura, & harum labentium causæ: vt *virilias: functio prestans lesa*. Tum de quo maxime agitur quæritur: vt dolor, æstus, &c.

Ametriarum auctores Ametriarum auctores expugnandæ: sunt vel primæ; vel à primis.

Et auctores expugnanda, qua sunt Primæ, aliarum auctores existunt. Atq; hæ primæ quoquo tempore sunt auferendæ.

Prima Prima causæ est vel diætæ error; vel temere corpori irruens.

vel A primis orta. A primis sunt internæ, atque corpori inherentes. Hæ, quatenus ametriarum auctores sunt, catenu emendandæ, viribus ægroti prospectis, & minim molestia.

A primis orta diuisio in opera praua A primis sunt vel opera praua: vel temere irruentium partes, & reliquæ corpori inhærentes: vt *spicula, ramenta, &c.* Opera praua sunt vel ratione tantum vel toto genere.

na: Ratione tantum Ratione tantum praua sunt vel qualitate, vel quantitate.

tantum.

Quali-

Qualitate praua, secundum hanc ipsam sunt e- *Qualita-*
 menda. *te.*

Qualitate praua, sunt vel elementari talia, vel ve-

elementari praua, sunt elementaribus corri- *Elemen-*
 ta. *tari.*

nt autem praua vel primis qualitatibus: vel à

is ortis.

Calido,	{ Calida, frigidis Frigida, cali- dis Humida, siccis Sicca, humidis } sunt corrig. vi:	Viola, Rosis, &c.
Frigido,		Chamamelo, &c.
Humido,		Brassica Beta, etc.
Sicco,		Bugloss. Malua, &c.

primis peccant tenuitate, crassitie, duritie, len-

acrimonia.

enue, in crassantibus corrigatur: cuiusmodi sunt

da, vel temperata, citra acrimoniam: vt lactuca, *Elemen-*
 am, tragacantha, &c. Crassum attenuantibus, *tariis vitij*
 modi sunt secundo, aut tertio recessu calida, vel *emenda-*
 da tenuis materiz: Calida, vt apium, feniculum, *tio.*
 melinum; Frigida: acetum, succus aranciorum, limo-

&c. Durum molliatur ex naturis moderate,

supra secundum gradum calidis, & humore ac-

refertis: vt oleo maturo, adipe temperati animalis,

mentum tergeatur siccis naturis mediz substan-

cuiusmodi detergentia fere amara sunt omnia,

falsa, siue frigida, siue calida. Frigida, vt cichori-

omne intybi genus, &c. Calida, absinthium, aristolo-

centaurium, &c.

acre mitigetur frigidis mediz substantiz, & au-

ritate præditis: vel aciditatis; vt ribis, oxyacantha

, mal' granati succo, &c.

Elementaris vitij emendatio ita habet; se-

quitur venenati correctio.

enenata qualitas alexiteriis, & alexipharmacis *Venenata.*

est corrigenda: vt succo mali punici, medici, citrei, anonæ, scordio, gentiana, &c.

Atque operis qualitate peccantia ita
corrigenda.

Quantitate.

Quantitate peccantia, eadem fere aucta tantum peccant: excepto sanguine, qui etiam defectu care queat.

Sanguinis defectus.

Sanguinis autem defectus cibis euchymis, iulis, vini potione, moderata exercitatione, & hilitate reparandus.

Redundantia.

Redundantia est vel succorum, vel excrementorum.

Succorum

Succorum vniuersalis est.

Hæc valde lacerans, quo tempore natura con-
insurgit, quod vigore ametriæ fit, minime tentanda; sed naturæ permittenda, nisi imperfecte moritur: tum namq. eius conatibus est succurrendum.

Excipe cum præceps admodum redundantia tum minime cunctandum, neq. naturæ motus spectandus, sed ipso initio redundantia vis frenanda.

Crisis.

In ipso naturæ congressu, & summo certamine quæ *Crisis* dicitur, vehementissime corpus turbatur solet, & agrotus multo peius sibi videtur habere pulsus inæquales, delirium, vigiliæ, inquietudo, difficultas anhelitus, difficilis sensus, &c. inuadunt inopina actionum multarum deprauatio, quæ tamen ipso vigore concoctionis signis apparentibus terroris plus habent quam periculi.

Hanc naturæ luctam excretio manifesta, vel abcessus solent excipere: sine quibus virium imbecillitas, causæ vim lethalem monstrat.

Excretionis futura signum.

Excretionis autem futuræ, rigor præcedens repentinus, argumentum est.

Excretio si vomitu futura est, præcedit oris vertiginosus, & tenax saliva, & iam ad salivam multa, & iam ad salivam multa, & iam ad salivam multa.

vomitu, labri inferioris tremor, & agitatio.
 n autem sudore, (vrina, atq; aluo, à rigore sup-
 (lis) calidus vapor repente exhalans, pulsu inter-
 bindoso, atq; molli.

n vero nec vomitus, nec sudores succedant, al-
 soluta expectanda.

crisi vero, si ægrotus melius sese habet, vrinis
 nec multis, nec copiosam hypostasim habent-
 is, nec morbo sensim declinante, abscessus ex-

Abscessus

notandus.
 t autem abscessus vel in partes superiores, vel

Abscessus
in parti-

inferiores.
 abscessum in partibus superioribus futurum spi-
 li difficultas incipiens; mox autem definens, ar-

bus supe-
rioribus
& inferio-
ribus si-
gna.

mento est.
 circum caput autem fieri, huius dolor, grauitas,

or, surditas, argumenta sunt.
 in autem horum nihil apparuerit, sed grauitas,
 or, tensio, vel inflammatio circa infernas corpe-

partes apparuerint, partibus imis abscessus ex-
 tandi..
 ouere autem critice solet natura, dierum qua-
 tionibus. Validissime & optimis ægroti rebus in

Natura
critice
mouet di-
erum qua-
ternioni-
bus.

quaternione, qui ab antecedente quarto nume-
 septimum attingit; præsertim tum ametria in

re existente. Atque tum quarti velitatio, talis
 q. huius motus est ante septimum, illius index

coctionis signa manifesta præbet.
 quaterniones certis periodis continentur.

Periodus

periodus est tempus sex quaternionum.

periodi primus atque tertius quaternio, perfecti
 reliqui, imperfecti; & ex præcedenti fumentes

Periodi
partes
duæ.

periodi partes sunt duæ.

prima pars est à primo quaternione ad quartum.

secunda est à quarto ad sextum.

Prima. Prima pars in duo membra diffunditur: prima pars intra primum quaternionem: secunda, intra secundum.

Secunda. Periodi secunda pars, duo item membra habet: prima pars est intra secundum & quartum quaternionem: secunda est intra quartum quaternionem & sextum.

Periodorum dua species. Periodorum duæ sunt species: Prima est ad diem vigesimum. Secunda est à vigesima ad quadragesimam.

Prima. Prima periodo mota natura quaternionibus cutissime stimulat: idque dupliciter.

Peracute: vel remissius.

Peracute dupliciter: Exquisite, vel haud ita.

Exquisite intra primum quaternionem.

Haud exquisite intra secundum quaternionem.

Remissius stimulat duos gradus obtinet.

Primo gradu stimulat inter secundum & quartum quaternionem.

Secundo gradu inter quartum & sextum.

Prima periodi index. Primæ periodi index optimus est vndecimus, decimus septimus, ultimo quartus.

Critici optimi sunt: primum septimus, tum decimus quartus, ultimo vigesimus.

Secunda. Secunda periodo, lente admodum stimulat indicat natura.

Huius vero quaterniones sunt; 24. 27. 31. 34. 37. 40.

Huius ordinis anomalia oritur ex humoris accessibus: & vehementia. Atque tum naturæ motus inter alios dies confertur: nisi accessus dies cum quaternione conspiret.

Hic crises fiunt difficiliore: præsertim si alii accessus statim accessus die contingant.

Accessus. Accessus fiunt, vel diebus paribus, vel imparibus.

Paribus.

Pares dies extra consuetum naturæ motum sunt. Pares dies
cuius hic index quartus esse poterit) 8. 10. 12. 16.
28. 30.

Inter pares dies 18 saluberrime fiunt crises: Infe-
ter autem hac serie. 6. 8. 10. 12. 16.

Impares dies sunt. 3. 5. 9. (qui & intercalares nomi- Impare
tur) 13. 19. 21. dies.

Ex imparibus felicissimi sunt. 9. 5. 3.

Infelicissimus 19 minus 13.

Hac de Criticis.

Uniuersalis redundantia, ex fontibus hauriatur: Redundā-
nitia; quo tempore melius sese habet ægrotus: tia uni-
biose, præsertim pruriente, turgenteq. materia. uersalis.

Attamen in raris, macilentis, valde obesis, ætate
sella, temperamentis, calidis & humidis, prægnā-
tis præsertim octauo aut nono mense tempesta-
gerente, vel nimium corpus densante, res tem-
nenda.

Uniuersalis plenitudo est æquabilis: vel inæqua-

quabilis plenitudo (natura meatibus confe- Equa-
te) vndelibet vacuari poterit. bilis.

Æquabilis vacuetur ex parte dissitissima ei, in Inæqua-
in inæquabiliter redundat. bilis.

Æquabilis est vel mouens, vel quieta.

Mouens ipsius motus initio refrænetur.

Quieta est vel libera, vel impacta.

Libera, a parte vicina est vacuanda: atq; talis va- Mouens.
Libera.
Quieta.

Deriuatio dicitur.

Impacta sit, eodem loci est liberanda: Impacta.

Uniuersalis redundantia duplex est: plethora, vel
thymia.

Plethora est uniuersalis redundantia sanguinis. Plethora.

Thymia (ubi ametriam committit) paribus

partibus natura vacuare solet: idq; naribus, vel men-
tis, vel hæmorrhoides.

Si nares affectat, oculis splendores obuersant, nares hebetescunt, lacrymantur, rubent, malæ rubicundæ dæ fiunt, & nares rubræ: hypochondria tenduntur absq; dolore, spirandi difficultas premit; caput dolor distendens, atque pulsans afficit: & iam fluxus in procinctu, narium pruritus.

Menstruis fluxuris præcedit lumborum tenesmus, grauitas, dolor, in mulieribus præsertim, si alia nulla signa dederit: & consueto tempore menstrui hæc fiant.

Si loca circum anum tumuerint, cum dolore, & que alia signa sese proderint, & certis temporibus consueta sint, hæmorrhoides expectandæ.

Sanguini deplendo commodissimum tempus (quæ optio datur) Luna in Ariete, Sagittario, Cancro, Libra, Scorpione, Aquario, Piscibus: nisi si Luna in aliquo signorum parti dominetur, vt in Ariete, capiti: Tauro, ceruicibus: Geminis, humeris & brachiis: Cancro pectori, stomacho, costis: Leone cordi, atque dorso: Virgine ventri, atque intestinis: Libra, rebus, umbilici regioni, atque natibus: Scorpione pedibus: Sagittario, femoribus: Capricorno, genibus: Aquario, tibiis: Piscibus, pedibus.

A lunæ coitu, ad quadrangulum, incrementi ætate: A quadrangulo ad diametrum, mediæ ætatis hominibus: A diametro ad alterum quadrangulum, declinantibus: Ab eo quadrangulo ad octantum, senibus aptissimum tempus sanguinem mittere. Si ignauus sit egrotus, recreetur frigida aspersione, vel aromate naribus admoto. Si sanguinis cursu deficiat, in dorsum decumbat, vel vomitu excitetur, hora vna, qui altera a sanguine misso, cibus boni succi aliquid sumat, & promte alentis, morbus finat.

Plethoræ vacationem (si morbus dat induciæ) præcedat lenis alui subductio, vel clystere, vel phlegma maco blando.

Plethora omnis commodissime ex basilica va-
tur.

Plethora duplex est: { ad vasa, vel
ad vires.

*Plethora
duplex.
Ad vasa.*

si sanguis ad vasa redundet, corporis atque faciei,
color rubicundior apparet: ab exercitatione, venæ
modum turgent, & arteriæ valde pulsant: sudor
facile erumpit: Lassitudo tensiva premit, atque
corpus, & artus præ pondere mouentur: ma-
in pugnum haud facile adducitur: respiratio
ciliior, atque crebrior, præsertim ab exercitatio-
atque si redundantia sanguinis ametriam com-
erit, eiusmodi signa præcesserunt.

dum sanguis ad vasa redundat, copiose profundi
erit, & quantū vires ferant fortasse nostratibus
diocri mensurâ, ab vnc 6. ad vnc. 10. Maxima, ab
12. ad 18.

ad vires plethora est, vbi vires premantur. Hic
us, & artus ingrauescunt, & motus pigrior eua-
Somnus grauis est, profundus, & interturbatus.
morans per insomnia grauitè premi se, aut onus
are, aut loco moueri se non posse putat: atq. hec
ia ne venis plenis, neque distentis ametriam
iusmodi plethora commissam præcedunt. In
sanguinis vacuatio parcior esto: atq; dum ple-
dinis metus cesset, sinatur fluere.

Ad vires.

sanguis inæquabiliter redundans, mobilis sit, at-
iam mouens: (secta prius basilica) alia distan-
na secetur: rectitudine venarum semper obser-
foramine exiguo, nisi præceptus fluxus sit, & par-
obili minetur. Tum namq; ampla vena, loco fi-
ono secetur. Atq; vbi ob virium imbecillitatem,
ita missio vsui fuerit, eodem die festinanter ite-
la vacuatio.

euellit autem vena humeraria a partibus supra *Reuulsi*
es: celerius in cubito: tardius in ramo inter pol- *pharynx.*

licem, & indicem. Interior vena reuellit a partibus intra clauas, & renes: tardius in vena inter annularem, & minimum digitum.

Vna media ex vtriusque reuellit.

Poplitis vena reuellit ex partibus subter renes: lentius secta malleoli vena.

Renes ancipites sunt.

Atque sanguinis reuulsio, phlebotomia ita habet.

Phlebotomia.

A capite vero deriuant scapularum atque humerorum scarificatus: iniecit cucurbitulæ, sanguinis fluxus è naribus, arteriæ pone aures: secta iugulares.

Priores capitis partes, frontis vena deriuat: posteriores, cucurbitulæ ceruici iniecit, atque humeris, vel incisa puppis vena.

Oculos, venæ in alterutrum angulum latæ.

Aures, vena sub aures.

Os, ea quæ sub labiis.

Fauces, quæ sub lingua.

Pulmonem, interior cubiti sinistri vena: eadem quæ a corde deriuat.

A thorace, interior vena cubiti, lateris eiusdem.

A iecore, interior dextera.

A liene, interior sinistra.

Ab utero, vena poplitis.

Atque sanguinis deriuatio ita fit.

Sanguinis in pus mutatio.

Si impactus sanguis sit, primum in pus immutatus, eodem loci vacuetur: suppurato (nisi sponte fiat) vel ferro, vel igni, vel medicamento rupto: vel diaphoretica exsucto. In pus autem mutabitur modice, atque temperate calidis applicatis, & humidis emplasticis: ut pulte ex farina triticea, addito butyro, atque vitello, &c.

Sanguine in pus cōuerso sine scalpello, Sive cauteterium.

um, siue pharmacum causticum, ei parti appli-
ur, quæ mollior digito cedit, magis acuminatur,
ua commodius sanies effluat.

scalpro res transigenda, & pars pro libidine cō. *Scalprū.*
ti nequit, etiam aduersa parte vulnus inferen-
Vulnus simplex aliquando sufficit parte decli-
uplici aliquando, & trigono opus est.

cauterio vtendum ex subere, mollibus corpo- *Cauteris.*
is conueniet. Ex metallicis, aurum est clemen-
um.

erro, vel igni vtendo, vasa insignia, neruus, ten-
vinculum, vel neruosum quid, cuiusmodi est, la-
tendo, cauenda, nec vnquam articulus vren dus.
o cutis cui eiusmodi subiecta sunt, prius est ap-
rendenda, ne subiecta conuulnerentur.

in profundo sanies resederit in musculis, fi-
um interstitia cultello ligneo, vel digito didu-
da, ne fibræ præcidantur. Et locis quibus plurime
currunt arteriæ, paruo vulnere contentus sis.

orro partes acuti sensus nec ferrum, nec ignem
inent; præsertim autē oculi cauteria refugiunt.
occipitio, temporibus, & vbicunque caluaria
ollior est, & vbi vel exitus neruorum, vel aditus
morum est, cauteria periculosa.

exteriore humeri parte tendo, ignem, ferrum ve
sustinet.

cranii fracturis, vbi modiolis, cycliscis, terebel-
ria puri sit: a futuris, neruorum radicibus, mol-
loi osse, ferrum declinandum.

bi ad colli latera aperiendum: a carotide arte-
vena sphagitide, neruo vocali abstinendum.

empyicis, & deploratis pleuriticis, scalprum,
cauterium, inferiore parte mesopleuri collo-
ndum.

extremis ilibus, tendines, atque vasorum coi-
cauendi: item quod in podice neruaceum, &

partes genitales: Inprimis autem nerui (maxim qui sub natibus) ne nudari frigore violentur, prouendendum.

Rectum autem, transuersum, vel obliquum, a vulnus esse debeat, partis figura, flexus, rugæ, fibrae indicant.

In collo, qua parte progrediuntur vena, arteria, neruus, rectum magis quam aduersum adigatur: reliqui melius transuersum.

In fronte e rugis transuersum sit, nec ita profundum.

In inguinibus, e flexu transuerso ducitur, duplex interim, angustum, & in myrti folium oblongum.

In ventre, nisi prohibeant flexus secundum fibra musculorum, vt etiam in reliquis.

Aique si vel ferro, vel igni opus est, ita res transigenda.

Ferro vel igne quo modores transigenda.

Sin vero patiens mollis vtrumque refugiat, caustico, vel septico pharmaco res expedienda: a quibus minus doloris percipitur, si pars ante laxante remedio foueatur. Ab eis autem applicatis continuo folium ex lenientibus superponendum, vel splenium epiceraustico illitum.

Sin vero dolor ingens ex pharmaco oriatur, statim eodem reuulso, dolor liniendus, & mitius agendum.

Ruptoria.

Ruptoria autem eadem quantitate applicentur, qua vulneris magnitudinem esse cupis.

Petantur ruptoria ex naturis summo excessu calidis, vel naturæ proprietate talibus: vt Theriaca, urtica semen, e vino tritum, caulium radices vstæ, trita, & arxungia vetere excepta: arsenicum, mercurius sublimatus, quibus habita ratione corporum, & vomicarum prudenter vtendum: excipiantur autem butyro, arxungia, terebinthina, visco, &c.

Hactenus

Hactenus Plethora. sequitur Cacochymia.

Cacochymia est redundantia ex alio humore *Cacochy-*
nim ex sanguine. *mia.*

Cacochymia est pharmaco cathartico expur-

anda. In cacochymia purganda minus virium requiri-
quam in sanguinis missione.

Cacochymia purgatur pharmaco, vel vomitorio, *Pharma-*
deiectionario. Pharmaco vomitorio, ut seminibus ra-
cum vo-
mitionum. *mia.*

ni, a drach. 3 ad unc. 3 pulvere radicum asari a drach. 3.
scrup. 4. Hellebori albi fibris raphano transfixo maceratis, a
sep. 1. ad scrup. 2. arboris tuglandis iulis a dr. 3. ad dr. 1 & o.
omitorium esto mellitum & haustu liquoris sa-
largo ebibitum, & calore tepidum.

Vomitorium autem imperetur materia ad sto-
machum obrepente, & egroto ad vomendum apto.
perreptare solet humor astate.

Ad vomendum autem apti sunt, quibus nec pres- *Ad vomē*
sio, nec angustum pectus, nec ceruix gracilis, aut *dum qui*
longa, nec tabidi sunt, nec asthmatici, neq; præ- *sint apti.*
diorum dolore laborant.

Vomiturus si aggre vomat, cibum præsumat, &
et cibum pharmacum vomitorium.

Post haustum pharmacum corpus agitatione at-
que motu turbet: & ubi nausea vrget, prono se situ
loceat, firmato capite & ventriculo manu circum-
data: & vomitorii imperu sedato, aceto odorato, vel
dulcente grato recreetur.

Si iecore, aut liene cursus in aluum vomitione
mellitur.

Atq; vomitus ita instituitur.

Purgando autem humor noxius, nunquam in af- *Vomitur*
fectam sedem est deriuandus. *instituen-*

Circa ventrem imum extenuatis macilentis, a- *di ratio.*
liore sensu præditis, vehementer purgationes ca-

anda.

Purgandus, loco temperato contineatur.

Pharmaco deiectorio (si optio datur) aptissimum tempus, Luna in Geminis: in Cancro: in Scorpio: ne: in Piscibus: Hora vero commodissima matutina.

Ante pharmacum, (si dura sit alvus) clyster iniiciatur molliens. Austrino statu felices succedunt purgationes.

Vbi incognita sit laborantis natura, blando pharmaco sensim exploranda.

Cacochymia interdum præparationem postulat, ergo vbi ametria accelerare haud postulat; quo crassitie impedit, incidendum atque tenuandum. Quod lentum, tergendum, quod acre, atq. feruens mitigandum, denique pori, atque meatus laxandi, circum viscera fots adhibendi, & corpus fluidum habendum.

Quibus deiectorio purgandis ventriculus imbecillior, nausea abundus existit, pharmacum consistens solidum esto.

Vbi pharmaco valido opus est, detur ieiuno: ventriculo tamen adhuc ciborum reliquiis madente.

Si pharmacum imbecillius sit: purum inueniatur ventriculum.

Si cui cõsuetudine est matutina vomitio, ea ante sumtum pharmacum cienda.

Hausto medicamento, vel aqua hordei, vel succo punici, vel vino austero, vel saccharo, reliquæ fauibus, & gulæ sunt deiiciendæ: præsertim si sapor ingratus offendat.

Corpus autem post surrectum, semihoræ spatio in quiete tenendum.

Si post sumtum pharmacum, inexpugnabilis somnus sit, vtile foret medicamento indormire: cum autem purgare cõperit, dum compleuerit est vigilandum.

Cum prorsus e ventriculo exierit, vt nullus eius

REC

de odor, nec sapor, nec ructus, aut nausea, aut eructus, sublit, cibus offerri poterit: excidit autem ventriculo quatuor post horis; cibus vero offerendus post sorbitio detergens. Vomitionem deiectio re-
lit.

Cacochymia est vel simplex, vel composita.

*Cacochy-
mia sim-
plex.*

Simplex est, cum vnus aliquis humor præter san-
nem redundat.

Cacochymia simplex, est vel ex calido humore
frigido Calido ex bile.

Bilis redundantis signa sunt: faciei, oculorum, atque Bilis re-
corporis color pallidus, flauus, aut citrinus, & ictericus; dundantis
na flammea, acris, & pauci sedimenti: vigilia, vel signa,
ni leues.

Bilem natura solet imparibus diebus excernere.

Bilis, si acris sit, ante purgationem, epicrasticis
mitiganda. Purganda autem colaphygis; vt ex

aturalibus, rhabarbaro per se a drach. i. β. ad drach.

luto. ad drach. 3. Dacrydio a granis 5. ad scrup. 2.

fia ab vnc. β. ad vnc. 1. β. Manna ab vnc. i. ad vnc. 3.

lyphoenice, ab vnc. i. ad vnc. 3, vel 4. Aloe, a drach.

drachm. 2. Ex artificialibus Syrupo rosaceo, ab

2. ad vnc. 4. Diapruno simplici, ab vnc. i. ad vnc.

Composito a drach. 3. ad drach. 5. vel 6. Electua-

de succo rosarum a drach. 2. ad drach. 5. Pilulis

eret, & de fumaria, a scrup. 2. ad vnc. i. β.

Atque ita bilis expurganda.

frigidi humores interdum sunt incidendi, atte-

ndi detergendi, antequam expurgentur.

rigidos humores paribus diebus natura solet

ernere, & si superent secundam periodum, fere

cessibus sese exonerare.

frigidi humores sunt vel Pituita, vel Melancho-

Pituita redundantis signa sunt.

*Pituita
redundan-
tis signa.*

Faciei atque corporis color albicans, interdum humidus ac plumbeus, moles corporis ampla, & obelica, mollis, contactu frigida: Vrina pallida, alba, nunc tenuis, nunc crassa cum multo sedimento, somnus profundus. Atque hæc omnia pariter aquosi humoris signa esse poterunt.

Pituita phlegmaphygis est expellenda: vt ex naturalibus, agarico trito a drach. 1. ad drach. 2. infuso a drach. 2. ad drach. 4. vel 5. Colocynthide a scrup. 1. ad scrup. 2. Turbith, a drach. 1. ad drach. 1. 1/2. Lathyrus de, a granis 4. ad 7. vel 8. Euphorbio annotino, a granis 6. ad 12. Tithymallorum foliis torrefactis, a scrup. 1. pul. 2. ad drach. 1.

Ex artificialibus, hiera picra Galeni putata, a drach. 3. ad drach. 5. electuarii forma: in puluere autem a drach. 2. ad vnc. 1/2. Hiera Archigenis, a drach. 1. ad drach. 2. Pilulis mastichinis, de turbith, stomachicis, &c. a drach. 1. ad drach. 1. 1/2.

Atq; pituita ita expurganda, sequitur Melancholia.

*Melan-
cholia re-
dundan-
tis signa.*

Huius redundantis signa sunt: faciei, atque totius corporis color fuscus, obscurus aut nigricans: interdum vniuersus, & æquabilis, interdum, maculis quibusdam inustus. Vrina tenuis, alba, atq; si quid melancholiæ excernitur, crassa, atque atra, liuida, aut virescens. Somnus turbulentus, & horrendis insomniis turbatus.

Melancholia maiorem incisionem, quam pituita postulat, & melanophygis est exigenda: vt ex natura editis: helleboro nigro a scrup. 2. ad drach. 1. sena in puluere, drach. 1. decocto, vnc. 1/2. vel drach. 5. Poly-podio, a drach. 2. ad drach. 6. maceratis, decoctis & expressis. Epithymo, a drach. 2. ad vnc. 1/2. vel drach. 6. Lapide armenio loto drach. 1. vel drach. 2. non loto a drach. 1/2. ad drach. 1. 1/2. Lapide Cyaneo, paulo minore quantitate. Ex artificialibus, Diasenna Nicolai, ab vnc. 1/2. ad drach. 6. &c.

Hæc sunt

Haftenus simplex Cacochymia, sequitur composita.

*Cacochy-
mia com-
posita.*

Composita Cacochymia est, cum varii humores

abundant: atq; tum ligna eduntur composita.

Composita cacochymia potissimum artificialia

bulat.

Composita duplex est: vel cum aliqui humores,

*Composita
duplex.
I. Cum a-
liquis hu-
mores re-
dundant.*

cum omnes redundant.

Cum aliqui tantum redundant, fit redundantia

bile, cum pituita, vel bile cum melancholia, vel

pituita cum melancholia.

Pilulis cum pituita, redundans, vacuanda Diaphœ-

done, Indo maiore: Benedicta, a drach. 3 ad drach.

diaphoenico ab vnc. 3 ad dr. 6. pilulis aggregatiuis,

moribus, sine quibus, Cocciis, a scrup. 2. ad drac. 1.

Pilulis, cum melancholia redundans, expurganda

tuuario de psyllio, a drach. 6. ad drach. 10. &c.

Pituita cum melancholia. Diasenna Rafis ab vnc.

drach. 6. Pilulis Indis: Haly a scrup. 2. ad drach. 1.

drach. 1. 3.

bi omnes humores redundant, pharmaco ca-

lico opus est: ut catholicone ipso, ab vnc. 1. ad

1 3. Confectione Hamech ab vnc. 3. ad drach. 6.

Ira Logadion, a drach. 1. ad drach. 2.

lenitudo autem cacochymica, si inæquabilis sit,

hum reuellenda purgatione, (si mobilis ea sit) &

ingentibus repellenda.

excipe cum venenatum quid sit, vel si in adenes,

munctoria fluxus fiat: vel cum metus sit re-

aritationis in partem nobilem: tum namque fo-

apienda.

in quieta sit, atq; libera, vicinus locus sumatur,

missa vniuersali purgatione.

in impacta sit (quod crassæ pituitæ, & melan-

ciæ proprium est) locus scarificandus, cucurbitu-

affigendæ, & hirudines applicandæ: vel phar-

gibo digerente, atq; discutiente res transigenda.

*Hactenus redundantia, vel Plethorica vel Caco-chymia
sequitur utriusq; (& Plethora, & Caco-
chymia) particeps.*

*Redundā
tia pletho
ra & ca-
cochymia
particeps.*

Redundantia utriusque particeps signa edit utriusque propria: atque tam phlebotomiam, quam purgationem postulat: semper a Phlebotomia iniuncta vacuationis sumto: atque quo sanguis impurius eo sanguinis vacuatio parcior esto, si humor rodens & acris, ventriculum infestet: hic prius expurgandus, atque tum sanguis mittendus.

Biliosam plethoram imparibus diebus natura mouet.

Biliosa, ex dextra hauriatur: atque tutissime vena secta tollitur, & sectionem exilem postulat.

Pituitosam plenitudinem & melancholicam, paucis natura mouet: & nisi bilis mixta quid habeant vel multitudine, & copia, valde lacescant, reliqua abscessibus purgantur.

Melancholica plethora, secundum biliosam tutissime vena secta tollitur, & amplam sectionem postulat. Pituitosa vero minime tuto tollitur, atque parcam admodum vacuationem admittit.

Plethora caco-chymica laborantibus (quoniam fere vires his infirmæ sint) phlebotomia ex modico interuallis partienda, vel vinculo dissoluto, vel vulneri digito indito, dum vires restaurantur: & si dum vacuas, vires deficient (quod ex pulsu percipietur) & si quid superuacui restet, cessandum. Interdum hora una, interdum pluribus ad virium restorationem opus est. Optimum haud ultra diem differre: atque bis die (si vires sinant) mittere conuenit, potius quam in sequentem differre. Sin autem vires ita infirmæ sint, ut sanguinis missionem haud omnino ferant: boni succi cibis reparandæ primum, ac tum vacuandum. Vbi vero iterare phlebotomiam conuenit, in rectum sectio fiat.

Phlebo-

phlebotomiz vicem supplere poterunt cucurbi-
cruentę, vel hirudines, vbi vires phlebotomiam
nulant.

*Haftenus redundantia succorum, sequitur Ex-
crementorum.*

Excrementorum redundantia, particularis tan-
tum est.

*Redundā-
tia excre-
mentorum.*

Lac ex parte tantum est vacuanda.

Excrementum redundat, vel in propria sede, vel
aliena.

Est item vel vbi publicum excrementum redun-
dat vel priuatum.

Redundantia publici excrementi, est vel ex chy-
mo excremento, vel chymico.

*Red. publi-
ci excre-
mentum.
Excreme-
tum chy-
moticum.*

Chyloticum excrementum est eccoproticis va-
riandum: vt aloe, a drach. 1. ad dr. 2. terebinthina a

dr. 2. ad vnc. 3. maluz, betz, brassica decocto, &c.

hanc paulo ante cibum, vel cum ipso sumi po-
tunt.

Redundantia chymici, est vel ex primario chy-
mo vel secundo.

Chymicū.

Primarii, est feri vel bilis, vel melancholicę. Serum, Prima-
rium.

Artificialis est discernendum: vt apio, foeniculo, pe-
trilino ex naturalibus. Ex artificialibus, lithon-

trix, vel puluerelustini a scrup. 2. ad drach. 2. Oxy-

gallere diuretico ab vnc. 2. ad vnc. 4.

Alis hanc detergentibus & aperientibus hepati-

bus eluenda: vt gramine, intyborum generibus,

gago, lupulis, chama dry, &c.

Melancholia, splenicis de obstruentibus, vt cassū-

oblopendria, corticibus tamarisci, & radicum

amarum, &c. Atque nisi tergentia hanc rem expe-

rent, a pharmacis catharticiis auxilium est pe-

ndum.

*Haftenus primarij excrementi redundantia, se-
quitur secundarij.*

- Secundarium.** Secundaria sunt ex succis secundariis: Sunt autem vel sudores, vel insensilis perspiratio.
- Sudores.** Sudores diaphoreticis moueantur: vt ligno salueto, radice falsæ parillæ, radice chinæ, &c. ab vnc. decocti, ad vnc. 10. vel amplius pro viribus patientis.
- Perspiratio insensilis.** Insensilis perspiratio, frictionibus discutienda. *Haftenus redundantia excrementorum ex publica nutritioni materia, sequitur ex priuata.*
- Redund. priuati excrementi.** Primum Cerebri excrementa, quæ vel errhinis, vel apophlegmatismis, vel sternutatoriis, vel gargarismatis sunt expurganda.
- Errhina.** Errhina sunt vel illinenda, vel inspiranda, vel inferenda, ex cyclamine, cucumere, agresti, scammonio, colocynthide, &c.
- Apophlegmatismata.** Apophlegmatismata ad mastigandum petantur ex radice pyrethri, oxymelite macerata. Ad gargarizandum, ex decocto glycyrrhizæ, pyrethri, saluigæ, betonicæ, &c. adiecto cathartici conuenienti: vt diapnoiconæ, &c. Ad illinendum petantur ex aceto, sinapi, melle, &c.
- Sternutatoria.** Sternutatoria ex hellebori albi, vel euphorbiæ puluere perexigua quantitate. *Pulmonis excrementa sunt becicis elidenda, vt loch sano depnio, loch de squilla, &c.*
- Ventriculi, vomitu eiicienda materia prius, vt prædictum est, præparata: atque hic vomitoria poterunt esse faciliora quam in cacochymia: vt raphani ex oxymelite, at triplicis decocto, mulsæ potione, &c.
- Intestinatorum, clysteriis ex decocto conuenienti molliente atq; detergente, adultioribus, a libr. 1. ad lib. 2. duplo cathartico quam ore acceptum (si opus est) admisto: olei vnc. 3. vel 4. adiectis: nisi vel vermibus intestina laborēt, vel alius nimis lubrica sit: tum namque oleo est parcendum.
- Sin vero balanus satis inuerit: fiat e melle cum sale

ad duritiem cocto adiectis (si opus est) pulueri-
catharticis. Esto autem balanus 4. vel 5. digitos
suavissos longa, minimum digitum crassa.

teri, hystericis, clysteriis, vel pessis.
uterinis clysteriis, & liquoris, & cathartorum
idum tantum sumatur.

essarium vero esto quam balanus mole crassio-
ec non longiore.

eficæ excrementa sunt iniectis tergentibus elu-

*Hactenus ratione quadam peccantia, sequuntur
toto genere aliena.*

Quod toto genere alienum est, id penitus corpo *Peccantia*
tiripandum: & si qualitatibus alienum sit, se- *toto gene-*
rum has alterandum. *re.*

Quotum toto genere alienum est vel liquidum: vel soli-
quid. Quod liquidum est: vel flatus est, vel hu-

mus est calefacientibus & attenuantibus dige- *Flatus.*
tus: atque si quem habeat fountem humorem,
num est purgandus.

Humores toto genere alieni, sunt ex aliis natura *Humores.*
corruptis: ut atra bilis triplex ex Melancholia, pi-
salsa, bile.

lis vitellina, prasina, eruginosa.
tituta acida, salsa, vitrea.

Solidius quid est duplex: vel Animatum vel In-

animatum, ut vermes, dracunculus.

Inanimatum, ut pus, sanguinis grumus, calculi, arenu-
phi, materia mel, seum pulticulam referens.

Hactenus opera prava, sequuntur temere irru-
entium partes.

De si corpori inhæreant, eximantur (si opus est) *Temere ir-*
amento, eadē qua ingressa sunt via, si fieri cō- *ruentium*
partes.

mode queat, si minus (loci natura ferente) in a
uersum protrudantur, si acumine ea prædita sit
vel arte via paretur.

*Hac de causis fuentibus, atque de ametria
causis futa.*

Ametria Ametria simplex duas obtinet species: Dyscras
simplicis cam, vel disdiaplasticam.

dua speci- Dyscrasia curetur remediis contrariis qualitat
es. bus præditis: eisq; tantum physicis.

Dyscrasia Remedia, vel vis, aduersa dyscrasiiis adhibita, pa
ti affectæ quam proxime liceat applicetur.

Dyscrasia Dyscrasia est vel partium aliquarum: vel omni
diuisio. Est porro vel elementaris, vel venenata.

Dyscrasia causa.

Dyscrasia Causas procatharticas, vel primas, habet diatri
causa. errores, vel temere irruentia, eisdem qualitatibus
prædita.

Internas, vel a primis, opera vel qualitate, ve
quantitate praua: qualitate per se, quantitate pe
accidens, vel temere irruentium reliquæ, talibus
qualitatibus præditæ.

In dyscrasia curanda, vberius adhibeantur, quæ in
prophylactica ad sanitatem secundum crasin fle
ctentem dicta sunt.

Dyscrasia interna (si ventriculi temperies relux
ctetur) vel viscerum aliquod, præcipue topicis est
alteranda: atq; tum sumendorum vsus mitigandus.

Dyscrasia
elementa-
ris.

Dyscrasia elementaris est vel

{ Calida,
Frigida,
Humida,
Sicca.

Calida
dyscrasia
signa.

Dyscrasia calida signa.

Corpus solito calidius, iustoque. Si vniuersalis sit
calor, pulsus celerior, & frequentior, atque respira
tio

similis: si particularis sit, secundum illam partem
pus calidius, & rubicundius.

*Causa prima, atque procathartica dyscrasia
calida.*

Dietæ error calefaciens, vel temere irruens cali

*Dyscrasia
calida*

Ex dietæ erroribus, motus immoderatus, & labor

*causa pri
ma.*

mens: ut exercitationes, studia, perturbatio-
vehementes, ira, curæ, vigiliæ. Humorum cali-
um excretiones impeditæ, vel fuliginosorum
crementorum.

Ex fomentis, aer æstuans, insolatus, vel ab exerci-
tione & balneis, ambiens nimis frigidum. Cibi
potionis penuria, vel inerciora hæc atque cali-
a. Aquæ frigida potio ab exercitatione, vel bal-

Antecedentes causa & secundaria.

vi vniversalis dyscrasia sit, cacochymia biliosa, vel
guinis plethorica redundantia: vel in his, quali
m intensiones. Sin particularis sit, eadem in
tibus feruentes. Porro chyloticum excrementū
mentum, & inaspectabilis perspiratio cohibita, hu-
causæ esse poterunt.

*Antece-
dentes &
secundaria.*

temere irruentia sunt vstiones, vel rei irruentis
tuticula feruida adhuc corpori inhaerentes.

*Temere
irruentia.*

Remedium.

Causæ ordine amoueantur. Bilis purgetur (quo
tu maxime fertur) vomitu, vel secessu. Sin au-
go opera qualitate acrimoniam, vel feruorem na-
sint, hæc eadem refrigerantibus sunt tempe-
da.

Remediū.

metria calida est caute alteranda: præsertim v-
ars publica, & ex publicis princeps aliqua labo-
bit cum membrum natura sua frigidum sit, cau-
maxima est adhibenda.

C

Dieta frigida esto, atq; refrigerans, tota & ex liquidis, ac mollibus: ut hordeatum, iuscula ex pullorum gallinaceum carne vel similem, lactuca, portulaca, oxalide &c. alterata.

Somno indulgendum, nisi viscera calore laborant.

Balneum his conuenit aqua dulcis, & ab eo vntiones ex oleo violaceo, vel alio refrigerante si vniuersalis ametria sit. Epithemata partibus principibus Cordi, atq; Hepati adstringentia, Cerebro nequaquam: denique vndique si vniuersalis ametria sit, medicamenta frigida sunt applicanda: sese excessus gradibus & quantia. Viola hordeo, cucurbita, cucumere, nymphaea, portulaca, cicuta, papauere, &c.

Febris.

Ex aliquarum partium calidis dyscrasiis, quae cordis est, Febris dicitur.

Febres inter se complicari solent.

Febris signa.

Febris signa.

Calor molestus, pulsus crebrior, atque celerior, urinae coloratiores; spiritus frequentior atque totius corporis condolentia, nec tamen protaethartica subsistens, quae horum symptomatum causa esse poterit.

Causa.

Causa.

Ametriae calidae auctores vehementiores, corpus petentes.

Therapeia omnium febrium communis.

Therapeia.

In omnibus febribus dieta esto solito parcior, & tenuans, & ex nutrimentis concoctu facilibus.

In ipsa morbi exacerbatione nullum alimentum praebendum: nisi media, vel insignis aliqua vacuatio ametriam intulerit: tum namque etiam ipso morbo inuadente aegroti sunt cibandi.

Tenuis autem nutrimenti ordo talis existit: Tenuissimum.

ssimum aqua saccharata, secundum hanc amy-
aloga, pulsanæ cremor, vel succus mali punici,
cydonii. Tum integri fructus æstivi deuorati,
ardeum decorticatum, & accurate coctum. Quarto
his purus, pisces saxatiles, & ex his, qui dura carne
præditi. Ultimo pulli gallinacei, & agni extie-
vinum oligophorum. Nutriendi tempus aptif-
mum, est febris initium, quo & plenius febricitans
ari poterit: versus incrementum parcior cibus
in statu omnino nullus, nisi vires succumbant;
namque ex tenuissimo sunt reparanda.
Ceterum quacūq; hora melius se habuerit ægro-
(quod fere mane est) cibus ei offerendus: atq; v-
terius tantum esto ad vires sustentandas: & ho-
qua sani cibari erant assueti (modo ægritudo per-
tat) sumatur.

Quo febris vehementior, eo parcior ægroti sunt
andi, atque celerius: multo magis coelo dige-
e, & ætate puerili: si tamen vires ferant in fa-
ous vehementibus, cibus per initia omnino cir-
ncidi poterit: a quo initio, tenuis admodum sit,
nim ad statum diminuendo.

otus in ipso accessus vigore, esto vnus vel alter
ustus satis largus.

febricitantes in luce habendi sunt omnes, (nisi
valde infirmi) & quam maximo conclau cuba-
debent.

pl quando vires febricitantibus deficient, aere
iudioris inspirato, & stillatio aliquo analeptico
ceentur.

b febres inter se complicantur, & remedium
mplicandum: vrgentioris maxima habita ra-
ne.

Atq; hæc febrium communia sunt.

februm dua sunt species: Sæctica, & Hæctica.

C. 2.

*Febrium
species
duæ.*

Schetica. Schetica febris est, quæ extra solidas corporis partes causas fouentes habet.

Scheticam pariunt causæ leuiores.

Schetica febris duplex est: vel spiritibus accensis, vel humoribus.

Ephmera. Spiritus accensi Ephemeram pariunt 24. horarum febrem: quæ interdum diem secundum attingit.

Ephmera signa.

Eius signa.

His suavis adest calor, rara, aut nulla in vno pulsu inæqualitas, eaque admodum obscura. Pulsus magni. Urina haud valde abfimilis sanorum, rufa tamen, facile ægritudinem ferunt, nec vlla tenues succumbunt. Vel sudore, vel madore, vel transpirata halituoso solet desinere.

Causæ.

Causæ.

Procatarticas tantum solent Ephemeræ habere causas, eas tamen (quod solæ sint) tanto vehementiores, frequentius tristitiam, curam, vigilias, lassitudinem, cutem astrictam, ex frigore, vel alio quolibet diætæ errore: ut suppressa excrementorum vacuatione.

Remedium.

Remedia.

Aer omnibus Ephemeris, inspiretur frigidiusculus, corpore reliquo operimentis bene contexto, atque haud supra primum gradum refrigerationis tam pharmaceutica, quam diæteticæ hic usus est.

In Ephemeræ declinatione, antequam cibis concedatur, corpus molliter fricandum, manibus oleo violaceo recenti, vel loto, perunctis: & nisi inaniro febrem intulerit, & corpus calidum atque siccum natura sit, prorsus abstinere satius foret: utque postero die, cum tempus accessionis ita transiit, ut nil mouerit, cibis dari poterit. Sin autem ex alto calor

calor venerit, & granitas vel capitis, vel præcordio-
rum sequuta est, quia febris humoralis timeri po-
test, expectandus dies tertius: atque ubi accessio-
nis tempus præterierit, (quia adhuc timor superesse
debeat febris humoralis) cibus exiguus dandus: at-
que die quarto (si corpus integrum sit) cum fiducia
ari poterit.

In Ephemerarum statu, largus potus esse poterit
in oligophori.

Hic Ephemerarum varietas ex causarum proca
articularum ubertate distinguitur. *Epheme-
rarum va-*

Si fames, vigilia, coitus nimius, vel alia qualibet
manitio febrem intulerit: his pallet facies, & oculi *rietas quo
modo di-*
ui fiunt, proprie autem quibus vigilia intulerit, *stingua-*
facies subtumida existit, & vix oculorum palpebras *tur.*

hollunt, humore quodam imbutas. Atque omnes, *I.*
tillii, curis, cogitationibus febricantes, pulsum
magnitudine destituantur: & qui ex tristitia fe-
bricant, his acrimonia potius quam abundantia
toris percipitur.

Remedium.

Statim ipso accessu, ægroti sunt cibandi: maxime
in quibus corporis temperies, ad calidum, atque sic-
cum vergit: aliter abstinere præstat: & ubi accessio
influxerit, in balneum continuo sunt perducendi, &
mente oleo largissime perfundi debent: tum mol-
li manu fricari; atque diutissime in calidi solii aqua
lucari; & frequentius lauari. Nisi caput dolet, his
remedium utile.

Qui ex labore ac lassitudine febricant, cutem *II.*
ment sicciorem.

Remedium.

Si sunt multum oleo tepido manu molli frican-
te. His etiam convenit satis largiter vinum bibere:
per ratione virium, ætatis, consuetudinis.

III.

Qui ex cute astricta febricitant, cutem densam obtinent: & primum tangenti, mitior percipitur calor; post acrior: absq; urinis rufis, absque morbo corporis concidente, vel oculis cauis, aut aridis: & que pulsus hic minores.

Remedium.

Frictio rarefaciens, a balneo aquæ dulcis temperato adhibeatur: & nisi supra modum refrigerata sint, & corpore pleno: Vinum his conuenit. Sin- frigore oriatur, & pariter accesserit capitis grauedo & distillatio, lotiones, & balnea sub finem tantum fiant, his prius concoctis.

IV.

Qui ex æstu febricitant, (quod ex progressu erigunt re percipitur) quamprimum in balneum aquæ dulcis decendi, & multum lauandi, atq; post, oleo vi- laceo ungendi, & magis lauandi, quam ungendi, frequentius: Et caput perfundendum oleo omph- cino sine sale, vel rosaceo, violaceo vehementer frigeratis, & capiti superfusus.

Si cui ex ira contigerit febris: primum ea sedetur tum in febris declinatione, balneum, vnctio, frictio ex oleo violaceo, nenupharino, &c.

*Hactenus febris Ephemera, sequuntur humorales.**Febris hu-
moralis.*

Humoralis febris est, ex calore humores primus inuadente, atque per eos cordi a metum procreante.

*Signa.**Eius si-
gna.*

Hæ calidiores sunt Ephemeras omnes: atque diurnum plurimum: pulsus item ex systole celeri sunt hinc inæquales.

*Causæ.**Causæ.*

Causas habent humorales, præter procatharticas, & primas, succorum item vitia, fouentes inter- nas, & a primis.

Humo

Humoralium commune.

Humoralibus initio, phlebotomia conuenit (*Humora-*
ares ferant) aluo prius (morbo inducias dante) *Humora-*
stere soluta, eoque horis duabus ante sanguinis *Humora-*
ffionem injecto. *Humora-*

Sin autem morbus festinationem postulat, san-
is, vel praterito clystere mittatur.

In humoralibus, vbi status morbi adest, vel im-
inet, (quod ex symptomatum incremento perci-
tur) nil vacationum moliendum Si quid tamen
moris expurgandi publicis viis obstat, præpara-
is prius, omni morbi tempore, deici poterit.

Humoralis febris est vel sanguinea, vel biliosa.
anguinea est, in qua sanguis accenditur: atque Sy-
chus dicitur.

Synochus vnicam accessionem habet.

Synochus

Signa Synochi.

Vrinę rubicundę, crassę, pulsus magnus, vehemēs, *Signa.*
enus, nec mollis, nec durus, celer, frequens. Caput
let, fauces rubent, venę extensione laborant: cor-
is mader: fatuitas linguę imponit, vel dulcedo.
ger intumescere se putat, & agte spirat.

Causa.

Sanguis redundans, iustoque calidior.

Causa.

Remedium.

Quantum vires ferant, tantum hic sanguinis va- *Remediū.*
andum: etiam si prius sponte fluxerit, nisi mor-
m exstinxerit, vel saltem diminuerit.

Si natura sponte sua mouerit, quod hic paribus
ebus facere solet, eius motui succurrendum, siue
hzmorrhoidę, siue a nare, siue ab vtero, nec nisi
unius fuerit fluxus obstandum.

Epithemata refrigerantia, in statu tantum, idq;
omcoctionis signis apparentibus, vsurpanda.

Februm synochorū toni. Cum evidentes concoctionis notæ apparuerint, nec principem partem inflammatio occupet, nec tumor œdematodes, aut schirrhus, nec partium internarum imbecillitas vlla, aquam frigidam largiter & audacter propinato, præcipue si ægrotus frigida sit affluet.

Tonus. Synochi febres tonos obtinent.

Tonus est Synochi febris certa affligendi ratio.

Tonus est duplex: vel Homotonos, vel Ditonos.

Homotonos. Homotonos est, cum equabiliter affligit: eo quod non minus caloris exhalat, quam generatur.

Ditonus est, cum inæquabiliter affligit: eo quod vel plus vel minus exhalat.

Ditonos. Ditonus est vel Epacmafticus: vel Paracmafticus.

Epacmafticus. Epacmafticus, est qui semper inualecendo inæquabiliter affligit: cum plus generatur, quam exhalat.

Paracmafticus. Paracmafticus, est qui continuo decrescendo inæquabiliter affligit, eo quod minus generatur quam exhalet.

Synochus mitior. Synochus est, vel mitior, vel vehementior.

Mitior est, cum sanguinis pars tenuior accenditur, & Ephemera extensa dicitur.

Ephemera extensa, non raro ante diem quintum indicatur.

Signa.

Signa. Oritur potissime vere, & autumnno, adolescentibus sanguine multo refertis.

Vrinæ sunt similes Ephemeris, & ægroti inflationem percipiunt: hic pulsus inæqualitas est obscura.

Remedium.

Remediū. Dietæ erroribus cessantibus, intra primum tri-
dum,

im, ad lipothymiam sanguis mittatur: in qua ta-
n lipothymia, ægrotus audit, videt, astantes a-
scit, &c.

Cum optio datur, hora matutina (duabus horis a
phlebotomia) cibetur ægrotus, cibus frigidis & hu-
milibus.

Nisi sanguinis missio febrē exstinxerit, aqua fri-
da largissime hauriatur: quod si quid dissuadeat,
aliquis syrupus, ut acetosus, vel violaceus
frigida dilutus propinetur.

Parcendum hic somno: nisi ubi sanguis primum
missus fuerit: atq; tum (duabus a phlebotomia ho-
ris) somno indulgere poterit ægrotus.

*Hætenus Ephemera extensa, siue Synochus mitior,
sequitur vehementior.*

Synochus vehementior est, cum sanguinis tota
massa ferueat.

*Synochus
vehemen-
tior.*

Signa.

Cruditatis nota hic adest in pulsu, ut inæquabili-
ter manifestior. Et in urinis quæ hic rubræ, turbidæ
exsistunt. Exspiratio quam inspiratio hic infi-
or: lingua tandem asperior nigricat, & non ni-
maricat: Capitis dolor vehemens, & continuus
occurrere solet.

Signa:

Adic toni sunt euidentiores: & ex tonis, paracma-
haud vacat periculo, mox consistens.
periculosa signa sunt in quiete fatigari, dyspnœa
tum infestari: ventrem inflari atq; rugire: pu-
as nigras, atque liuidas apparere: inuoluntarias
mymas perfundere: a somno laborem sentire:
etiam aere ambiente frigido, admodum vri.

Causa.

Sanguis multus, calidior: atq; vehementiore pa-
nastica accensus.

Causa:

*Remediū.**Remedium.*

Hic sanguinis minus quam in præcedente va-
andum: & tantum citra lipothymiam est consisten-
dum.

Potest in hac & quarto, & septimo, etiam post op-
ptimum sanguis mitti.

Si sanguis valde calens sint, (materia copiosa
fuerit) levis purgatio vel clyster purgans ex va-
eunt. Sumatur autem pharmacum colaphygu-
luculo post phlebotomiam. Post vero & phlebot-
miam & pharmacum humectanti, atque refrigeran-
te, & dixta & medicationi incumbendum, dum di-
decimus quartus aduenerit, atq; tum (morbo a-
tura victo) sensim pleniore victu agrotus refici-
tur, eo tamen solito humidiores, frigidioresq;.

*Hactenus febris humoralis sanguinea, sequitur
biliosa.*

*Febris Bi-
liosa.*

Biliosa febris est ex accensa bile procreata.

*Signa.**Signa.*

Pulsus quam in prædictis magis inæquales, & sy-
stole multo citior. Calor mordax & acris, urinæ
valde crudæ.

*Causa.**Causa.*

Biliosa febris habet tam procatharticas causas
quam internam fouentem cacochymiam. Succed-
dit item ab Ephemera, quæ ad integritatem hauri-
desierit.

*Biliosa fe-
bris perio-
di.*

Biliosa febris periodos obrinet.

Periodus.

Periodus est febrilis accessus reciprocatio.

Typica.

Periodus est vel stata, ac typica, vel vaga.

Vaga.

Typica est, quæ certas & ordinatas habet reciprocationes.

Vaga periodus, incertas habet.

Celer.

Stata periodus est vel celer, vel tarda.

Celer est, quæ quotidie affligit ex nouæ materiæ
generandæ facilitate.

Tarda

Tarda est, quæ extra quotidianam est: ex mate. *Tarda.*
generanda difficultate.

Tarda est vel Tertianæ: vel Quartanæ.

Tertianæ est, quæ tertio die reciprocatur.

Tertianæ.

Quartanæ est, quæ quarto reciprocatur: & huius *Quartanæ.*
materia difficilime regeneratur.

Est porro febrium periodus duplex: vel Remissionis: vel Intermissionis.

Ubi periodus remittit, quam integerrimo cibo
eterendus.

Remittentes periodi sunt tantum, quib. materia *Remittentes.*
copiosa, vel crassa. Atque hic copiosior vacuatio
emolienda: & victus tenuior imperandus.

Intermittentes periodi sunt ex materia parciore *Intermittentes.*
non tenuiore. Hic vacuandum parcius, & ipsa
diète, tanto ante accessionem tempore, ut ante
compleri queat.

Intermittentibus periodis, antequam ex toto in-
ger sit ægrotus, cibo offerendus; atque is copio-
sus quam in remittentibus. Atq; in his si tardet ac-
cessus longe ab exacerbatione, id est, sex vel 8 horis
post, cibo offerendus: quibus horis ægroto vigilan-
dum: sumto autem cibo dormire permittendus.

In intermittentiū inuasionibus, vomitiones v-
enter mouentur.

Intermittentes periodi, paroxysmum habent fri-
gidum in primo insultu.

Hæc de Periodis.

Biliofæ febres inter se complicantur: interdum
pluribus: atq; tum accessiones haud pares sunt:
quæ quæ diebus morbo congruentibus accidunt, ve-
mentiores sunt: ceteræ remissiores. Atq; si am-
plius intermittant, nulla quies ægroto accidit.

Per initia febrium biliofarum, rhabarbarum, &
gingentia, pharmaca sunt vitanda.

*Bilioſa
febris
cauſſa,*

Bilioſa febris eſt vel ex bile flaua, vel atra.
Ex bile flaua eſt, cum hæc febrem accendit.
Cauſſam habet cacochymiam bilioſam.
Hæc colaphygo ducenda.

*Febris bi-
lioſa fla-
ua.*

Febris bilioſa flaua eſt, vel cū bilis ſeſe materi-
foco præbet, vel aliam materiam accendit.
Si bilis foci materia ſit iecori inprimis eſt con-
lendum, quod potiffimum hic infirmatur.

Bilioſæ ubi aliis eiufdē generis implicantur, c-
bus imparibus plus paroxyſmos intendunt, quib-
acceſſus fiunt.

Cauſos.

Bilioſæ hæ, ſi haud intermittant, ſed remitta-
tantum, febris cauſos dicitur: magna vehemen-
vrens. In cauſo frigus, rigor, aut horror ubi finitus
eſt: alias raro.

*Cauſſonis
ſigna.*

Cauſſonis ſigna.

Color acerrimus, anxietas, iactatio corporis, v-
lut contracti, lingua arida, ſcabra, citrina, vel nigr-
ſitis inexplebilis, *ἀνὸς ἔλα*: circum ventricu-
lum, aut hepar mordicatio, dyſpnœa: alui excrem-
ta crocea: vrina tenuis valde: & ad liuidum incli-
nans. Nonnunquam hanc præcedit (quod rarum
eſt) inſignis rigor, valde pungens. Pulsus eſt fre-
quens, velox, & quodammodo durus: Super veni-
unt vigiliæ, aut profundior ſomnus: aut vigilandi
impotentia. Delirium, & ab ea interdum vera phre-
nitis: interdum conuulſio: & cordis agitatio maxi-
ma: tūmēcula, ſudor levis in fronte, & clauiculis: ali-
bi cutis, valde arida.

Pefſimum ſignum æſtus cui non reſpondet ſitis.
vigiliæ iuges, & delirium: color faciei inſigniter im-
mutatus: lentor circa dentes: vomitus, & deiectione
mere bilioſa: vrina valde tenuis, cruda, nigra, pau-
ca, cum aluo aſtriſta: vel aluus nimis lubrica pinguis
excernens. Nares ſanguinis guttas ſillare, illacry-
matio

Spontanea: externis partibus non admodum
e, aut etiam frigere, nec facile pristino calori
ui: aut diebus paribus morbum exacerbari:
septimum diem auriginem apparere, aut suda-
hilominus febre incremente.

Causse.

cathartica: ex diata erroribus, quæ vehemen-
te calorem intenderint: in primis potus absti-
na per magnos æstus.
precedens: vitellina bilis sincera, & retorrída:
in causo, minus ubi tertiana continua (quæ
causo gradu deficit) affligit.

Causse.

Remedium.

proti quoad fieri potest, quietem agant.
tus esto liquidissimus: ut iuscula ex pullo al-
lactuca, oxalide, plantagine, &c. Pruna acido-
Potio larga.
sanguis mox ab initio, citra moram mitta-
iam (prius iniecto clystere) die eodem quo
inuat.

Remediū.

sanguis mittatur ad euentilationem tantum: &
citra lipothymiam ad vnc. 4. vel libr. ꝑ. Si
sanguinis missionem dissuadeat, cucurbitulæ
manificatione applicandæ, vel hirundines affi-

secundo, leni cholaphygo purgandum: &
moniacis prorsus abstinendum: & modo nil
deat, aquæ frigida potus esto vberimus: Si
dissuadeat, acidus syrupus de limonibus, de a-
ate citri, &c. aqua diluendus, & propinandus,
nam necessitate urgente haud negandus pa-
nus.

dominante morbo, & statu transacto, epithema-
pentur ex sympatheticis partibus principi-

bus: vel potius capiti rasō, thoraci, hypochondrii plantis pedum, pulmones recens maciatorum animalium, aut catelli vel pulli gallinarum, aut columbarum, per spinā longitudinem sectorum admoventur: vel lanæ hapsus oleo violaceo tepente imbutus applicetur.

Die septimo peracto, si quæ morbi reliquæ suspectæ fuerint, purgatione sunt deiciendæ: & diaphoreticis, atque diureticis proliciendæ.

Si tertiana cōtinua sit, haud tanta vis vrget morbi, nec feruor tantus: Ergo tum quarto die medicamentum purgans præberi poterit: & cibi hic poterunt esse frugaliōres, quam in causō, tennes tamen omnes.

*In causō symptomata vehementissime affligere solent,
& medicum poscere: secundum hanc, in
tertiana continua.*

Symptomata tertiana continua.

Sunt autem hæc: imbecillitas, oppressio, tussis, lumborum dolor, cephalalgia, vigilæ, paraphrenitis, sitis inexplebilis, linguæ ariditas, nigredo, asperitas fissuræ, lentor dentium, linguæ, palati, cibi fastidium, bulimus, lipothymia, syncope, singultus, nausea, vomitus, alui fluxus, aluus adstricta, aurigo, sudor.

Ad imbecillitatem:

Imbecillitas.

Hæc aere frigido, & puro recreetur, & aceti rosæ ceti odore.

Ad oppressionem, & hypochondriorum tensionem.

Oppressio.

Sedantur hæc citato vomitu, vel purgante medicamento, clystere, potius quam potione, si ex materia copia sit.

Sin vero nimio calore oppressio fiat, aer refrigeretur, & halitu, haud naribus inspiretur: ad cordis regionem.

Hypoglottides epithemata frigida applicentur: vel pom-
maceas olea refrigerantia, nenupharinum, violaceum,
papaverinum, &c.

Ad tussim.

Hypoglottides sub lingua teneantur, ex lenien- *Tussis.*
tibus refrigerante materia, vt ex glycyrrhiza, gum-
mi, tragacantha, seminibus frigidis maioribus, &c.

Ad lumborum dolorem.

Lumborum dolor refrigerante linimento est. *Lumborū*
curandus, vt refrigerante Galeni, cum succis fri- *dolor.*
doris.

*Ad Cephalalgiam: hac frontem & tempora oc-
cupare solet.*

Omnis motus & corporis & animi vitetur, lux & *Cephalal-*
depitus. Vnctiones frigida, atque humide vt popu- *gia.*
lon, &c adhibeantur: & embrocha atque fronta-
les ex frigida, humidaque materia vsurpentur: &
curbitula cum multa flamma ad homoplatas, aut
ruicis radices affigenda; & frictiones partium
extremarum curanda, & eisdem vincula dolorifica
facienda.

Ad vigilias.

Vigilantibus tenebrae inducenda, & alta quies, at- *Vigiliae.*
que altum silentium imperandum: nisi aqua mur-
murante, vel musica leni, vnico sensu occupato, com-
munem consopire consilium sit. Frigida odoran-
tia, & eadem capiti, atq; temporibus capiti appli-
cenda. Si opus est a proprietate hypnotica sumenda
syrupo papaverino, nenupharino, de portulaca,
&c. vel medicamentum diacodion quantitate di-
uisum cochlearis ore teneatur & exsputum post, re-
poscat, dum somnus obrepit, atque tunc quies

ultimo sumitur, in ventrem illabi sinendū, vel tri-
riaca duorum mensium, quod vnc. i. clysteri indubi-
terit, & postea subiici. Porro in partium principu-
emunctoriis, vñctiones refrigerantes applicentur
& ad vasa maiora: item his ipsis irrigationes, & e-
themata adhibenda.

Ad Paraphrenitim.

*Paraphre-
nitim.*

Hic initio refrigerantia, & astringentia applicen-
tur: oxyrhodino misto, &c. Et ab his (malo proo-
dente) capiti raso, recens mactata animalcula appo-
centur, & frictiones manuum, ac pedum, & ligatu-
re dolorificæ adhibeantur, & continuus aquæ frigida
odoratus esto.

Ad sitim inexplebilem.

*Sitis inex-
plebilis.*

Per nares ægrotus expiret ore clauso, somno
silentio indulgeat, (nisi quid grauius somnum de-
suadeat) & syrupus aliquis acetosus aqua frigida co-
lutus propinetur: vel humectans, atque refrigerans
vt de portulaca, de cucurbita, &c.

Sin autem sitis mendosa tantum sit, ex pulmone
æstuante frigidissimus aer inspiretur, & aqua frigida
subinde ore teneatur, & cum incaluerit, muta-
tur: vel cerasa sicca, acidula ore mandentur: & sac-
charum crystallinum ore contineatur

Nisi hac arte sitis restringatur, post duas horas
potus satis largus, & bene refrigeratus haustu ma-
gno propinetur.

*Lingua
ariditas,
nigredo,
asperitas,
fissuræ,
lentor den-
tium, lin-
gua, pala-
ti, &c.*

*Ad linguae, palati, dentium ariditatem, nigredinem,
asperitatem, fissuras, &c.*

Liniantur hæc lento, humectante, refrigerante
atque detegente aliquo: vt hordei mundati deco-
cto, cornis prunorum dulcium, cucurbitæ, cum sac-
charo crystallino, penidiis, & succo glycyrrhizæ a-
eclegmatis consistentiam.

Linguæ

Lingua decocto hordei frequenter tergeatur, & superiore linteo, vel cochleari, diligenter fricetur.

Si fissuræ molestæ sint, glutinētur seminibus cydoniorum cum gūmi arabico, tragacatha, ichthyolla, &c. horum mucilaginibus decocto precedenti maceratis, & dissolutis.

Porro gutturi foris olea humectantia, & refrigerantia, leniter gutturi infundenda ut violaceum, nepharinum, &c. Si œsophagum lentor occupet, ex melleo gargarismate ex attenuantibus, & abstergentibus: ut glycyrrhiza, inde, hordeo integro, hyssopo, &c. bolis crassioribus de oratis abrasatur: vel lotionem tergente affatim deglutita abstergeatur: ut decocto hordei cum saccharo, & aceto pauco, vel utiupio acetoso, &c.

Ad cibi fastidium.

Cibi fastidium.

Acidi intinctus apparentur: & aqua frigida potetur cum titillo aceti: & malum coroneum, vel gratum acidulum edatur. Porro, vari cibi, minores, lingues aut prædulces, apponentur, & aceto rosato, omphacio, oxalidis vel granatorum succo constantur. Præterea fastidientibus cappeæ convenient, salsamenta, oxypora ex lactuca, oxalide, cichorio cum aceto, atq. oleo parcissimo.

Cibus parce, & raris intervalis sumatur. Atq. nisi arte cibi fastidium pelli poterit, (deterfis prius intestinis) clysteres nutrientes infundantur: quantitate parca, ad vires & corporis molem, bis, vel tertio quodam die, horis pastui dicatis.

Ad Bultum.

Bultus.

Alimentum valde tenuium partium hic esto: & frequenter acetum, pulegium, mala, pyra, & similes, luctus olfiant, & cetera nidore bono plena: ut papæ solidus, suillæ carnes assæ, & panis vino intinctus, commendus, vinum ipsum; ova sorbilia.

D

Lypothymia & syncope.

Ad lypothymiam, & synopen.

Alimenta omnia sint substantiæ tenuissimæ, & quæ celerrime vires reficiant: ut panis assus, & vinum generoso maceratus, multo saccharo, & vino generoso conditus, oua sorbilia, puliorum gallinaceorum testes, gallinæ, aut capri iuuenis decoctum, expressum; panis calentis odor frequentissime ore, & naribus excipiendus. Vinum esto oligophorum.

Corpus oleo rosaceo, myrrino, melino, mastichino, &c. ungendum, subucula rosacea, fantalis, camphora, macerata, & post siccata, inducenda.

Sin autem syncope prehenderit, vinum fuluum subausterum, & vetus propinandum, & frictione extremorum adhibenda.

Singultus

Ad singultum.

Vomitibus citetur, & pharmacum cholaphygiū propinetur, & ab eo cremor ptisanæ, vel amygdalorum gala, lac caprinum, vel asininum recens multū sumatur. Sin vero æstus vehemens vigeat, quatuor seminum frigidorum maiorum emulsio ex usu erit, nec non theriaca recens, vel philonium Romanum præbenda Cucurbitula cum multa flamma ad regionem ventriculi applicanda: vincula artubus iniicienda, & frictiones dolorificæ vsurpandæ.

Ad nauseam ac vomitum.

Nausea & vomitus.

In nausea si quid humoris inesse suspicio fuerit, ipse vomitu est quam primum eliciendus.

Si vomitus nimium lacestat, somnus concilietur & quies: & acetum rosaceum, vel aliud quid odore gratum naribus admoueat, atq; vomitum stimulantis materia clysteriis, & artuum ligationibus reuocellatur: pedes & manus in calidam aquam immittantur, & cucurbitulæ ventris regionem suspendant, quo tempore cibus laboranti offeratur.

Quod si nec ita vomitus sedetur, venter phar-

maco

maco constringente est purgandus: vt diacydonio laxatiuo, admittis myrobalanis emblicis vel citrinis. Post huius purgatorii vsum, etiam iam operante medicamento, aliud cydonium adstringens sumatur: additis cornis & prunis syluestribus, vel alio adstringente aliquo.

Aer esto frigidus & siccus, cibi siccantes & adstringentes, vt ex amylo, oriza, &c. Lac chalybeatum, & ex eo polenta cum hordei torrefacti farina. Omnes carnes succo malorum granatorum, limonū, aranciorum, &c. cōdiantur. Vinum esto antiquum, subusterum, aqua chalybeata dilutum. Potus frugalis esto, cibis exiguis, & ex interuallis sumtus, actu vel frigidus, vel calidissimus. Post alios cibos, edantur adstringentia, vt cydonium coctum, &c.

Ad alui fluxum.

Humoris acrimonia prius epiceraisticis syrupis est mitiganda: vt violaceo, hordei decocto, lacte amygdalino, itē clysteriis epiceraisticis aluus est perfundenda: & post catharticum adstringēs ex rhabarbari infuso est propinandum. Corpore autem purgato, ad diaphoreticis vtendum, & ab his adstringentium vti-
lus multus esto: vt syrupi de ribibus, de cornis &c. non uenienti liquore diluti: & abdomen oleo cydoniorum, myrrino, mastichino, &c. adstringentibus admixto aceto vngendum: si opus est clysteres adstringentes iniiciantur, & cucurbitula vmbilici regio suspendenda. Hic primi cibi sint adstringentes, & adstringentes fructus. In primis (aluo nimium profluente) somno & quieti est indulgendum.

Ad aluum adstrictam.

Aluus adstricta glande irriteretur, atq. venter oleis collientibus foueatur. Sumantur aut iuicula, quib. multa borrago, oxalis, portulaca, atriplex, malua incoxerint. Pruna edatur dulcia, & fructus horarii, maturi: post quos aqua pura bibatur. Decubit⁹ supinus

Alui fluxus.

Aluus adstricta.

vitetur. Et clyster molliens & tergens ex decocto maluarum, helxines, fursurum, admixtis oleis rehergerantibus, vt violaceo, nenupharino, rosaceo, &c. liciatur.

Aurigo.

Ad auriginem.

Balneum extergente materia imperetur atque tenuante: vt, ex bryonia, enula campana, parietaria, fursure, beta, brassica, &c. A balnei egressu, corpus oleo chamamelino ungatur, vel costino, vel irino, &c. Et frictiones fiant frequentes & molles. Sin vero in venis quid subsit humoris, nec totus in corpore habitum fusus: id primum cholaphygo purgandum, & tum cetera peragenda.

Sudor.

Ad sudorem.

Aer frigidis temperetur: & si opus est, euentilatur. Mollis culcitra detrahenda: & facies posca frequenter inspergenda: portiones sumantur viscerum roboratrices, vt decoctum borraginis, buglossæ cum syrupo myrtino, & santalis, &c. vinum cito adstringens, & paucum vt & potio omnis.

Sudor sinendus concrefcere nec abstergendus: pannis aqua rosacea, cum santalis, camphora, & madentibus, & egelidis inuoluendum corpus: & tunc si opus est) præsertim ad cor, iecur, thoracis, & ventris partes, oleo rosaceo, cui pulueris myrtillorum, vel santalorum aliquid admixtum sit, ungatur.

Hactenus symptomata, quæ in hac febre medicum implorare solent.

Tertianam intermit- tens.

Sin autem biliosa hæc intermittat, tertianam vulgo intermittentem dictam parit.

Intermittentes hæc dupliciter complicantur: vna cum eodem die: vel diebus alternis binæ accessiones fiunt. Est hæc humoraliū intermittentium breuissima: septimum accessum non prætergreditur, sæpe quarto desinit. Et tertio, vel quarto die, vrinæ

incipiunt.

incipiunt apparere coctæ. Accessus paroxysmi longissimus est 11 vel 12. horarum: frequentius 5.6.7. vel 8. horarum.

Signa tertianæ intermittentis.

Inuadit cum vehemēti rigore velut acri quadam *Signa*
pungente. A quo rigore. ardor excitatur acerrimus. *eius.*
Pulsus euadit magnus, vehemens, celer, frequens, æstuans, & omnis inæquabilitatis præterquã febrilis expers, quæ in vno pulsuprehenditur.

Causæ.

Causæ.

Hæc easdem habet cum prædicta causas, remissiores tamen.

Remedium.

Remedium.

Primo die quietis (pro agroti viribus) ad ventitandum corpus sanguis hauriatur vnc. 6. vel vnc. 8.

Die sequente, multo ante paroxysmum (si tardior is futurus sit, & horis pomeridianis accidat) medicamentum leuiter purgans imperetur, etiam natura sua refrigerandi viribus pollens: vt electuario de psyllio, diadama sceno, cum syrupo refrigerante ex hordei decocto diluto.

Si locus nullus purganti pharmaco die tertio detur, quarto imperetur.

Ceteris diebus, extra paroxysmum, alius tenerima teneatur clysteribus refrigerantibus, humectantibus, & mollientibus. Deinceps vero alterationi, & bilis temperationi, est prorsus studendum.

Manifestis signis concoctionis apparentibus, validiore pharmaco est purgandum: etiam adstringentia admittente. Atque tum postea, balneum calidum adhibendum: videlicet eo die, qui grauissimum paroxysmum sequutus est: quo & salubriter iterari potest. Deinceps vero diureticis, & diaphoreticis sudorificis vtendum.

Eandem agroto morbo perfuncto: hepar triasantalos, vel diarrhodone abbatis firmandum, atque

recreandum est, & deinceps, (certo spatio) diu quodam modo est febrilis.

*Hactenus febris biliosa, in qua bilis flaua materiam se-
feco prabet; sequuntur in quibus alios hu-
mores accendit.*

*Febres a-
liis humo-
ribus pre-
terquam
bile ac-
censa.*

Febres hæc fere diebus paribus accessus habent. Atque ubi intermittunt, rigor hic nullus, sed potius horror. Atque abscessibus fere potius quam excretionibus finiuntur.

Longiores sunt prædictis, & ultra 40. diem: atque accessus ultra duodecim horas habent.

Ubi sui generis febribus implicatur, die pari maxime intenduntur.

Signa

Signa

Hic quam in prædictis minor feruor: & pulsus paruus, rarior atque tardior quam in eis.

Causa.

Causa.

Cacochymia composita interna causa existit vel per se vel ab aliis procathartice mota atque irritata.

Remediū.

Remedium.

In his diæta paulo plenior quam in ceteris esse poterit: & plenior in intermittente quam in remittente: & tota morbi historia, contra quam in præcedentibus, cibis potu copiosior esto: & ubique attenuans.

Porro in his magis humorum præparationi, quam alterationi est incumbendum, & attenuantia refrigerantibus semper misceantur; quæ in his quam in prædictis minus frigida esse debent.

Per initia attenuandum, incidendum, coquendum, aperiendum vehementius: solutius tamen tum leniora sint, deinceps fortiora ut scammoniata bene tamen retusa, quæ ex intervallis sunt usurpanda.

Materia si multa sit, manifesta signa concoctionis haud sint expectanda, sed tum per initia satis valide purgandum.

Signis

Signis vero concoctionis apparentibus, oxymel iureticum, syrupus de epithymo, oxymel squillitium vsurpentur, &c.

Sanguinis hic parum detrahendum, nec omnino binio, sed præparata materia, & cum viinæ ruentes, & crassæ apparent.

Vena secetur satis amplo foramine, die paroxysmum præcedente. Atq. tum si sanguis tenuis sit, & lauis, continuo est suppressendus. Quantitas detrahenda, haud multum vnc. 4. excedat.

Item in hisce febribus, a^l initio, ad vigorem, rebus acerbis est vtendum: pipere, sinapi, diatrion piperion, &c. Quarto quoque die.

Vbi signa concoctionis manifesta apparent, balnea, & thermæ vsurpandæ, & vomitus pridie accessio- nis à coena citandus: & stomachus postea, oleo absinthii est inungendus. Postridie detur absinthii co- mæ decoctum: & ab illo horis duabus ante paroxy- smum, drach. 1. vel scrup. 2. veteris theriacæ porriga- tur. Deinceps vero diaretica, sudores, viscerū forus, sedulo curadi: nec nō antidota ex interuallis danda.

Atq. prædicta communia sunt.

Bilis vel accendit vnum humorem vel plures.

Vbi vnus tantum humor accenditur, exquisita *Exquisita*
talis dici poterit. *febris.*

Signa.

Signa.

Hæc ex humoris pariter accensi signis spectanda.

Cacochymia composita duorum accensa.

Humor vnus à bile accensus, est vel Pituita, vel Melancholia.

Ex pituita accensa frequentissime fiunt accessus *Febris pa-*
quotidiani, raro tertiani: quod si contingat, fit ter- *uitiosa.*
tiana vulgo notha dicta.

Pituitosæ, nocturnæ fere sunt, & hyemales.

Interdum pituitosæ materiæ copia, bis die irri-
tantur: paucitate, diebus alternis.

D 4

Qui pituitosis febribus detinentur, humidiores habitu sunt. Pituitosa continua implicata tertiana intermittenti, parit semitertianam. Hæc continua est cum horrore. Et quanquam prioris accessus in sudores desinat, non tamen intermittit febris: sed hos altera accessio excipit. Semitertiana hæc, gradus obtrinet. Parua 24. horarum existit; media 36. magna 48. horarum accessum obtinet.

*Semiter-
nana.*

*Exquisi-
ta.*

*Non ex-
quisita.*

Semitertiana est vel exquisita; vel non exquisita. Exquisita est, cum amba æquipollent. Atque in hac pugna duorum existit: & excretiones febriles tertianæ, retunduntur pituitosa febris missione; videlicet ex crasso humore genitæ.

Non exquisita est, ubi alterutra vincit: vel bilis, vel pituita.

Si febris tertiana, bilisq. vincat: tota febris fit horridior, & initio rigoris particeps.

Cito mouetur: feruidior existit, & incendii plus habet: & bilis aliquid per vomitum, aut per sedem, aut per sudores excernitur.

Sin autem quotidiana vincat: vix horror percipitur, aut ne vix quidem. Pulsus & magis, & diutius comprimuntur: accessio tardius inualefcit: ac post longum tempus consistit: non tamen aut sitis magna, aut incendium fatigant: neq. bilis accenditur.

Si amba intermittant, huic similis oritur mistio; in qua tamen intermissio existit, & die secunda, horrida apparet quotidiana.

*Epiala
febris.*

Si vitrea pituita sit, quæ accenditur; fit febris epiala dicta.

In epialo ab ægroto continuum frigus percipitur: ab aliis calor; frigus ex fusa materia per sensiles partes corporis habitus.

Accessionem habet epialus à 4. horis ad 24.

Com mouetur 3 item 4. die: raro ultra 20. dies extenditur porro quotidiana intermittens interdum tertianæ

tertianæ æmula existit: sed accessiones habet 12. horarum spatio longiores: & nō raro diem integrum perseuerantes; aut etiam excurrentes longius.

Atq. morbus nonnunquam bimestris, trimestris, etiam semestris existit.

Pituitosa signa.

Urinæ albæ, ac tenues, vel crassæ ac turbulentiæ, *Pituitosa*
vel rubicundæ. Vomitus pituitosus: nec sitis inten- *febris si-*
sa: grauitas totum corpus occupat: soporosi, atq. ve- *gna.*
ternosi sunt.

Pulsus rarus, laxus; facies subliuida, & peponum nodo tumida.

Calor primo occurso ad manum vaporosus sentitur: sed tandem mordacitas increfcit: atque admodum inæquabilis, ac si per cribrum excolari videatur.

Remedium.

Remediū.

Hic vacationes ultra diem septimum differri queunt.

Iniecto prius clystere sanguis mittatur. Tum die postero, propinetur catharticum lene, pituitam bilimistam expurgans.

Post pituita est attenuanda, & humores præparandi usque ad morbi vigorem: syrupo byzantino, acetoso simplici, & xymelite, &c. Et post septimum accessions diem. absinthii coma frequenter est propinanda.

Si pituita dulcis accendatur, minor præparatio conuenit quam si acida: atque minor si acida, quam vitrea.

Sin autem sine excretionem insigni, vel abscessu morbus inclinet, medicamentum purgans paretur adstringentia admittens: velut rhabarbarum, myrobalanos, &c. atque ab illo pharmaco; sudores mouendi, ac urinæ.

Si tertianam æmulatur, alternis diebus ægrotus

cibandus; atq. intermissionis die, corpus leuiter exercendum. Hic somnus conuenientissimus existit: modo nil caput grauet, nec lassitudinem inferat.

Si febris pituitosa hæc inueterauerit, à cibo interdum vomere, vtilissimum fuerit.

Symptomata hic medicum pascunt.

Symptomata.

Ventriculi imbecillitas, syncope, humoralis, Sopor, capitis dolor, nausea, vomitus, alui fluxus, frigus, cibi fastidium.

Ventriculi imbecillitas.

Ad ventriculi imbecillitatem.

Ventriculo præsertim in statu est consulendum roborantibus & siccantibus sympatheticis, vt aromatico rosato, latificante Galeni, &c.

Syncope.

Ad Syncopen.

Purgatio imperetur (prius vno vel altero die materia præparata) ex leuibus pharmacis. Materia autem præparanda incidentibus: vt mulsæ, syrupo acetoso simplici, &c. Ex decocto glycyrrhizæ, hordei integri, &c.

Tertio autem die, copiosius humor est vacuandus ex rhabarbari infuso. Deinceps autem humore magis præparato, rhabarbari substantia sumi poterit.

Porro si materia ventriculū affectat, in primis vomitus est excitandus: & quieti, ac somno multo, talibus indulgendum, loco obscure decumbendum, & frequentes acriusculi clysteres iniiciendi.

Sopor.

Ad Soporem.

Soporosi excitandi aere calefacto & lucido, corporis agitatione vehementiore, frictione aspera, linteis asperis, & scabro asperso sale, ligaturis dolorificis, pilorum auulsione, clangore, strepitu, odoribus ingratis, & clysteribus valde acribus, quibus benedicta, Indum maius, vel trochisci Alandal adiecta sint, cum oleo rutaceo, laurino, &c. Et thymus, pulegium, origanum, & similia calefaciendi & attenuandi viribus prædita, aceto coquenda, & naribus ad-

mouenda.

nouēda: & palatū acribus, vt sinapi, mithridatio, heriaca, &c. illinēdum: tandem autē sternutatoria x pipere, helleboro albo, &c. naribus sunt inferenda. Atq; capiti prius tafo, pulueres cephalici, & acriter sunt inspergendi & affricandi: vt nucis moscharum, piperis, cardamomi, & si opus est, euphorbii, steroris murium, &c. Postremo (te postulante) sinapi mus ex pari ficuum, ac sinapios quātitate adhibendus: à quo ad phœnigmm ex thapsia, pane porci no, foliis lepidii, &c. est accedendum: atq; ex his putulæ excitatæ pungantur; & humor sinatur effluere: & vlcera diu aperta teneantur.

Ad capitis dolorem.

Cephalalgia.

Hic digerentia adstringentibus mista sunt applicanda: vt oleum rosaceum cum chamamelino, vel pannus, rosarum, chamemeli, anethi, sambuci decocto intinctus, postque expressus capiti applicandus: atq; tandem mere attenuatium vsus esto; vt irrigationum ex decoctis cephalicis, saluia, betonica, libanotide, &c. & ab eis inunctiones ex oleo anethino, costino, & similibus curentur: secundum eas frōtale ex cephalica materia, ex foliis saluie, melissa, anethos, betonica, &c. Nisi his cedat remediis capitis dolor, cucurbitule cum multa flamma, homoplatis, aut ceruicis radicibus applicandæ: partes extremæ fricandæ, & dolorificis vinculis constringendæ.

Ad nauseam atq; vomitum.

Nausea atq; vomitus.

Purgandus extra paroxysmum humor clystere: & de ventriculo in aluum prouocandus medicamentum diaphœniconis, vel catholicum recipiente: vel eis acriora, si vsus exigat. Atque post clysteris vsu, ventriculus ex pilulis aloeticis purgandus.

Die sequente vini absinthitis dimidius cyathus sumendus: vel alia ventriculum adstringēdo roborantia: vt syrupus de mentha, ex triplici malogranato, & cydonii succo, rosas, & menthe puluere, aromatizatus.

Hic ad coquendum ventriculi humores pituitosos, somnus, & inedia maxime conueniunt, neque hic omittendæ frictiones, ligaturæ, & hypochondriorum per cucurbitulas suspensiones.

Præparato humore, post alias vacuationes, etiam rhabarbarum integrum commaducetur; vel in puluerem reductum syrupo rosarum laxatiuo ad opiatæ formam misceatur; vel mala cydonia, caryophyllis, aut cinnamomo transfixa, & saccharo condita, edenda; vel similiter præparata tenellæ nutes iuglandes.

Alui fluxus.

Ad alui fluxum.

Cucurbitulæ ad ventriculi regionem affigantur: & vomitus (si nil dissuadeat) sollicitetur: vel medicamentum catharticum adstringens imperetur. Post autem venter adstringentibus foueatur, atque illinatur, & adstringentia cibus præsumantur: vt cydonium aromate, cinnamomo, caryophyllis, cõditum; vel rosarum rubrarum ita præparata conserua.

Frigus.

Ad frigus.

Horum plantis, aliisque partibus, lateres calefacti, aqua vitæ irrorati, & linteis inuoluti admoueantur: qui quam primum effectum præstiterint, semouendi Porro spina tota oleo calefaciente, aqua vitæ admista, vel ipsa theriaca vetus infricanda.

Cibi fastidium.

Ad cibi fastidium.

Cibi fastidium præcipue post morbi statum curandum. Ergo intestinis clyster ex vino albo, vel vrina pueri impubis cum multo melle depumato, multo ante cibum iniiciatur, eidem drach. i. ß agariçi adiectæ, & varii cibi apponantur. Si haud ita succedat, clysteres nutrientes iniiciantur, deterfis ante intestinis.

Haecenus febris pituitosa: sequitur Melancholica.
Febris melancholica Melancholica fere quarto quoquo die accessiones habet: 24. horas longas, interdum breuiores.

Raro

Raro eundem bisprehendit.

Quartana statim fere pomeridianis tantum temporibus invadit: & eo contumacior est, quo meridiei propior.

Raro continuus est: Autumno solet corripere. Accidit potissime post 35. annum: & naturis melancholicis, siue dixta, siue consuetudine talibus.

Rigor post initia accidit & in declinatione sudores.

Definit yrinis, crassis, alias albis, alias nigris; hæmorrhoidibus, menstribus, vel abscessibus in crura. Initio, id est, 8 primis diebus, tenues sunt urinae, & aquae: longiore intervallo si quartana intermittat.

Prodacitur intermittens ultra secundam dierum criticarum periodum: in tertium, vel sextum mensem: aliquando in annum: aliquando in decimum annum.

Quartanae Melancholicæ æstiva sunt brevissime: Autumnales quæ hyemem attingunt longissimæ existunt. Lien nocent quartanæ.

Melancholica signa.

Frigus initio abest quod in altum penetrat: ut etiam ossa pertundere videatur. Calor hic minor quam in pituitosa: & pulsus imbecillior, minor, rarior, tardior, & obscurior.

Remedium.

Melancholica materia bene attenuanda, incidenda, tergendaque calore; temperatis ad gradum primum excessus.

Febris paroxysmo imminente, ab initio, spinæ, atque scapulæ, inungantur oleo de cucumere asinino, ex euphorbio, &c. tum postea molli lecto egrotum bene lectum reponito: & lateres calidos vino tenui odorato perfusos, & raro linteo convolutos, plantis, & volis, admoveo, & calore succenso, amoveo mature. Victus attenuans esto: gallinarum, caponum,

Continua.

Intermittens.

Melancholica signa.

Remedium.

carnes adultiores, & verueces minores, pulli columbarum, & auiculæ nemorales, &c.

Iuscula alterentur borragine, apii foliis, & radicibus, vel eisdem, melissophylli, ochymi, adiecto cicchorio, oxalide, endiuia.

Olera refrigerantia asperso piperis, vel zinziberi puluere retundantur.

Vux passulæ his conueniunt, & cappares sine aceteto.

Potus: vinum oligophorum per se: vel hydromel dilutum, ex decima mellis parte ad aquam.

Si suppressa aliqua naturalis purgatio sit, vel ex hæmorrhoides, vel ex utero ea excitanda.

Intra 14. vel 20. diem sanguis parce mittatur ex saluatella si vires infirmæ sint: sin minus, ex interna sinistra, præmisso clystere.

Die phlebotomiam sequente, poterit imperari purgantium aliquod leniter melanophygmum: & ab eo septem vel octo dies attenuando, incidendo, detergendo, humor præparetur. Ex apozematis hyssopi, maioranæ, melissæ, &c. (nunquam borragine & buglossa omissis) quibus apozematis syrupi conuenientes addantur.

Ab hac humorum præparatione, validius paulo est purgandum: & ab eo iterum humor præparandus per varias medicamentorum formas: opiatas tabellas, &c. percutiendo, vsq; ad tertiam vel quartam hebdomadam: quo tempore (adhuc morbo persistente) per quatuor dies humore præparato, iterum purgandum: atq; deinceps (morbo ad statum accedente) clysterum solummodo vsus esto, medicamentorumq; alterantium tantum, & humores præparantium. Excretionem facta vel abscessu, si vires adhuc robustæ sint, catharticum adstringens, vt hammech, vel rhabarbarum integrum exhibendum. Atque postea sudores prouocandi, & urinæ, & viscera sympa-

sympatheticis roborāda; diarhodone, diambra, dianofcho.

Melancholica intermittens, & huius signa.

Primum suboritur pandiculatio, oscitatio, & mo-
esta quædam totius corporis inæqualitas: tum fri-
goris horror minime actis: sed velut ossa confrin-
gens, & tūdens cum articulorum dissolutione Hor-
rorem sequitur dentiū stridor maximus, interdum
binas horas durans.

*Melan-
cholica
intermit-
tentis si-
gna.*

Cum ad statū morbus vergit, rigor levis loco hor-
oris suboritur, & horrorem huius febris sequitur
calor levis, pulsus initio rarus, tardus, in morbi au-
gmento velox, frequēs, sed rarior atq. tardior quam
in biliosa flaua sincera intermittēte. Et in pulsu lon-
ge habet velociorem arteriam, in principio & fine
motus, quam in medio. Urinæ omnes crudæ sunt.

Paroxysmus tres diei naturalis partes sæpe occu-
pat: nō raro ultra 24. horas protenditur. In exiguum
sudorē definit: & finito paroxysmo, pulsus impref-
sum febris vestigium continet: rarior tardiorq; ex-
sistens.

Remedium.

Remediū.

In intermittente melancholica, liberalior cibus
concedatur, quam in remittente tantum. Omnia
valde humectantia & magis quam in remittente
incidentia, atq. calefacientia, tam sumta, quam ad-
mota.

Aer calidior esto, nec diebus intermissionis (si vi-
res ferant) negotia cōsuetā intermittantur: & ante
ipsum accessum, corpus vehementer exerceatur.

Cibi sint moderate sicci: vt panis purissimus, dili-
genter subactus, probe fermentatus, sale perexi-
guo, vel potius salis loco, anisi, aut foeniculi granis
asperfis.

Carnes: hædina, vitulina, pulli gallinacci, iuscula
elixorum, carnes assorum.

Æstate conueniunt potissimum pisces saxatiles
vt cancri, & testudines toti, & ex hordei cremor
cocti.

Ex fructibus humidi, nec tamen frigidi: vt pomo
dulcia cocta, & ex saccharo sumta, pruna dulcia, ca
rica pingues: passulæ exacinatae, &c. Lac amygdali
num, hordeum ad tabem decoctum.

In sculis incoquatur borrago & spinachia, & mer
curialis aliquid, si alius est adstricta, atque tempus
æstiuum sit. Sin hyemali, mentha, maiorana, melisse
sa, &c. porro diata omnis esto humectans atq mo
derate calefaciens. Condiuntur nutrimenta omni
aromate puco, nec valde acri: vt cinnamomo, ma
ce nuce muschata: croco; nisi caput dissuadeat.

Sassamentorum hic vsus maior quam in prædictis
conuenit: sinapios, piperis, &c.

Potus esto vinum generosum, clarum. dulce. di
lutum aqua cocta cum aniso, cinnamomo, fanicu
lo, aut cerenisia eadem arte præparata.

In hac intermittente per initia (virium habita
ratione) vberissime alendum: & somnus longus af
fectandus.

Alius libera esto: & nisi per initia respondeat,
clysteres acriores vsurpentur quam postea.

Horrori hic oleo ex castorio, vel euphorbio, &c.
consulendum, & sudor copiosissimus eliciendus.

Vomat agrotus à cibo paulo ante accessionem,
leni vomitorio, vario prius cibo sumto: pingui, ac
oleoso.

Si sitiat in paroxysmi statu, potus esto syrupus
borraginis, violaceus, vel capillorum veneris cum
decocto fœniculi, & aqua hordei: & in ipso paroxy
smi statu, consulendum viribus aliquo restaurante,
& pariter sitim leniente: multo magis vbi morbi
status vrget.

In hac secetur initio basilica, vel media sinistra, &
si niger.

niger sanguis fluat, & crassus: satis magno forami-
ne, audacius perfundatur.

Vno vel altero die post sanguinem missum, pur-
tio melanaphyga satis fortis paretur: eius tamen
citrate, vel cassia, vel aliquo syrupo humectante
fracta.

Deinceps (materia prius preparata) mensibus sin-
gulis, nunc hoc, nunc illo modo purgandum lenius:
sumatur catharticum pridie accessionis: aut si ac-
cessus tardior fuerit, ipso accessus die.

Postea studendum coctioni, atq; humorum præ-
rationi: nunc syrupis, nunc tabellis, nunc opiatis,
& omnibus magis calefacientibus, & attenuanti-
bus, quam in continua; vt oxymelite squillitico, sy-
po de radicibus, de fumaria, de epithymo: singulis
lulis decocto radicum capparum, tamarisci, corti-
medianæ fraxini. Atq; hæc omnia laxatiua fiant
cartami medulla, senæ foliis, vel agarico; atque
m haustus vnus sumatur quarto quoquo die par-
tysmum antecedente.

Porro iuscula pullorum alterentur herbis molli-
tibus, malua, mercuriali, atriplice, & aromatatum
liquo.

Diebus intermissionis poterunt inspergi pulue-
s diambæ, diamoschi, dulcis, diagalangæ, &c. o-
nia pondere maiore quam in continua: & quo
opius ad statum, eo calefacientia & attenuantia
at remissiora quam in continua.

A statu, viscera fouenda, ac fotu molliēda: & ma-
festis signis concoctionis apparentibus, lene pur-
ans ex adstringente materia propinetur: & viscera
eo firmentur: sudores, & vrinæ moueantur.

Viscera postquam quater aut quinquies fota fue-
nt, molliente vnguento illinantur, & incidente
martiato, &c. Cor in primis hic muniēdum, & in
his accessibus epithemata ex cardiacis applicanda:

E

& ex eadem materia sicca, scutū assidue extra paroxysmum gestandum.

In morbi statu (lienis gratia) sanguis ex saluatoria pro viribus, ac morbi ratione detrahatur.

His peractis & concoctionis signis apparentibus balneum valde humectās & refrigerans minus inperetur: & ab eo corpus oleo violaceo inungatur vel amygdalarum dulcium.

Si satis robustus sit ægrotus, poterit ex decocto attenuantis vapore postridie accessionis, bis bebbere made, sudare, præsertim vbi morbum inclinare cōstiterit: quo tempore theriaca imperari queat, alio quo humectante mista.

Haftenus febres ex bile unum humorem: sequuntur ex eadem plures accendentes.

Febres ex bil. plures humores accendentes. Vbi plures accenduntur, spuria dici queunt: & ex signis plurium humorum bile accensorum deprehenduntur.

Spuria. Hæ duplices sunt, vel æquabiliter mistis, atq; accensis, vel inæquabiliter.

Æquabiliter mista. Vbi æquabiliter miscetur, æquabilis ratio habenda, & præparationis & vacuationis humorum.

Et in æquabiliter. Vbi inæquabiliter: inæquabiliter redundantis ratio est maxima habenda.

Febris ex bile atra. In pituita siccandum magis: in Melancholia humectandum.

Haftenus febris ex bile flava: sequitur ex atra.

Febris ex bile atra. Ex atra quarto quoquo die frequentissime corripit.

Signa.

Signa. Accessiones à levi rigore incipientes habet, easq; Melancholica breuiiores: sed cum mordaci calore atq; siti vehementi.

Sunt item hac febricitates magis inquieti quam ex melancholica laborantes, minus tamen diuturna febris est.

Si ex

Si ex flaua bile vsta oriatur, omnia sunt hic tanto
criora.

Causa.

Causa.

Ex prægressis aliis febribus maxime erraticis, ac
agis oriri solet.

Remedium.

Remediū.

In hac omnia humidissima sint, & frigidiuscula
antum: vinum si concedatur, id bene aqua dilutum
sto ad vehementiorem humectationem: aceti ra-
men vsus hic (quod in melancholica negandum.)
arcus esse poterit.

Somnus esto extra paroxysmum diuturnus.
Sanguinis plus hic depleatur quam in melanco-
ca: die prima dextra basilica aperta ad vnc. 4 vel
ne. 5 sequenti & sinistra saluatella, & (si vires ferāt)
ne. 3. vel amplius si opus est.

Si atra bilis ex sanguine fuerit, plus deplendum
quam si vel ex bile, vel p tuita, vel melancholia ex-
sta oriatur.

Purgantia omnia hic aliquatenus frigida sunt:
bene humida ex melanaphygo aliquo.

Inc dentia haud valde calefaciāt: vt oxymel squil-
ticum, cum syrupo violaceo temperatum atq. di-
atum decoctis herbarum mollientium & valde hu-
nestantium: borragine, buglossa, violis, &c. Vel po-
ius iuscula carnis salubris vt pulli gallinacei, verue-
is iuuenis vel vitulina cum multa borragine, bu-
lossa, & pauca citragine alterata, vsurpanda: atque
andem humore epicerasticis temperato & præpa-
ato, blande melanophygmum singulis hebdomadis
umatur.

Morbo tandem declinante adhibeantur fots,
alnea, illitus, mollientia atq. attenuantia omnia,
itra insignem calorem: maxime secundum hepatis
egionem: præsertim si atra bilis sit sanguinea

Hic cor toto morbi cursu, epithematis cardiacis

THERAPEVTICA,

muniendum: & tandem sub finem sudores prouocandi, & vrinæ: atq. vltimo viscera roboranda.

Hactenus febris febricitans: sequitur

Hectica.

*Febris
Hectica.*

Hectica febris est, quæ in cordis substantia accenditur.

Hæc biliosis tantum febribus complicatur. Gradus tres habet: 1. ros conflagrat. 2. gluten. 3. humidum radicale.

Signa.

Signa.

Calor luculentior à cibo, alioquin æquabiliter per corpus diffusus: atq. vix febricitanti ob æquabilitatem perceptus. Qui tamen ab alio percipitur acris. Manifestior tamen in volis manuum, & plantis pedum percipitur.

Causa.

Causa.

Raro oritur nisi alio prius morbo prægresso. Interdum diariam febrem excipit, frequentius arden-
tes, atque alias diuturnas.

Remediū.

Remedium.

In hectica, humidissima sunt omnia, & moderate frigida. Aer temperatus habeatur aquæ vaporibus, vel leui flamma: & acrior ignis est fugiendus.

Alimentum esto lac muliebre, asininum, caprilum, vaccinum, ebutyratum, recens multum: vel si muliebre sit, ex ipsa mamma suctum, ab vnc. iii. sensim augendo, vel etiam à pluribus pro viribus egroti, donec ad vnc. 8. peruentum sit: plus, minus, prout vires patientis ferant: atq. in hac dosi, integrā mensem consistere ex vsu erit. Si forte in ventre lac accescat, sacchari parum admisceatur: sin vritur, diluatur parum aqua. & ita subferuefactum propinetur. Exhibeatur autem mane, horis quatuor, vel amplius à prandio: atq. si ex eo prandere velit, mica panis sæpius lota immisceatur.

Ab his postea (viribus ferentibus) astaci fluuiatiles,

es, aqua hordei decoquantur, & apponantur esui: item cācri marini testa exuti, bene loti, & aqua hordei admodum elixi: ex quibus cum hordei farina, amygdalis, pineis recentibus, seminibus melonum, atq. cucurbitæ eisdem mistis inter se, atq. postea furæ coctis, testudinatum fieri poterit.

Porro his similes cibi reliqui existant: vt iuscula bullorum alterata lactuca, portulaca, borragine, buglossa &c.

Potus esto frigidiusculus, atq; egelidus, somnus admodum prolixus. Et restaurantium, destillatorum, colatitorum, expressorum, vsus esto frequentissimus.

Balneum frequenter vsurpetur tepidum, eius vapore prius excepto, tum balneum ipsum, sensim aduefacto ægroto.

Epithemata partibus principibus accommodentur ex frigidis, humidis, sympatheticis.

Sudor si quis hic oritur, inhibendus oleis refrigerantibus, & adstringētibus leniter inunctis: vt rosa-teo, nenupharino, myrtino, &c. Omnia in secundo huius gradu, quam in primo, diligentius & vberius vsurpanda.

Symptomata medicum implorantia.

Syncope, aluus adstricta, nimis laxa.

Syncope mitigatio ex præcedentibus petenda. Si aluus profusa sit, (quod sæpissime accidit in hac febre,) syrupus de rosis siccis, vel myrtinus, &c. Diuatur ptisana colata ex hordeo torrefacto, & dilutus propinetur. Et gelatina santalis aromatizentur: & aceto condiantur.

Sin autem aluus adstricta sit, clyster refrigerans & humectans, ex malua, violaria, lactuca, &c. additis oleis refrigerantibus, violaceo, nenupharino, &c. infundendus.

Tertius hæcticæ gradus omne remedium respuit.

E 3

Symptomata hæctica febris.

Syncope.

Aluus

laxa.

Aluus adstricta.

atq. signum habet faciem ab Hippocrate depictam: oculi caui, nares acutę, collapsa tempora, frontis cutis arida, aures frigidę atq. contractę, & aurium extremities auersę: ungues acuti, & aduncę detortati, &c.

Hęc de cordis dyscrasia calida: atq. ita de febribus omnibus: sequitur reliquarum principum dyscrasia.

Dyscrasia capitis calida.

Signum.

Remediũ.

Ad Capitis dyscrasiam calidam.

Signum.

Æstus cum dolore vehementi.

Remedium.

Moderata lux, alta quies. Fronti atq. temporibus (hę namque partes in capitis calida dyscrasia laborare solent) panis ex oleo rosaceo inducendus: vel linteolum succo semperuiui, plantaginis, lactuca portulacę, mespillorum, &c. maceratum dolenti loco applicandum, & totidem gradibus frigida per omnes meatus applicanda: quę omnia, siue fasciis siue anacollematis applicentur, crebro sunt mutanda.

Dolor autem ubi ingens sit, narcotica: opium, & camphora, cum croco ex lacte muliebri inducenda: cautione maxima, ne longius quam dum dolorem sedauerint sinantur.

Sin autem dyscrasia hæc causam habeat feruentem sanguinem (quod ex tensione, grauitate, facie rubore percipitur) pro vsu atq. ægrotantis viribus, vena pertundatur: primo cephalica dextera; atque tum postea vena puppis, vel alterutra iugularium si opus est. Vel cucurbitulę cum multa flamma, scarificatis ceruicibus affigantur.

Sin vero bilem fouentem causam habeat (quod ex doloris acerbitate pungente, & velati erodente, absque grauitate, oris amaritudine, faciei pallore, & insomniis percipitur) præmissa parca phlebotomia cholera-

cholaphygis potionibus, & clysteribus res transi-
enda. Atque ab his, de tonso capillo, topica sunt ap-
ficanda.

Porro, si dolor contumax sit, atq. pulsatilis: arte-
ia in temporibus maxime micantes sunt inciden-
da: & sanguis satis largiter fundendus: nec non cu-
rbitula affigenda, extremorum frictions adhi-
benda: & vincula dolorifica iniicienda. Atq. (male
adhuc contumaci) cauterium actuale in medio ca-
pite ad futuras adigendum: nec sinapismos, nec
oleopacismos, pro mali contumacia, prætermitten-
dum.

Si vero ex ardore mens laborat, vel vigilia fati-
gant, multo diligentius prædicta vsurpanda: atque à
narcoticorum, valideq. refrigerantium vsu, sensim
discutientia cephalica ceteris admiscenda: vt beto-
nica, salvia, libanotis, stoechas, &c. quibus tãdem so-
lis vtendum, & animalcula viua per spinam secta, &
exenterata, vt catelli, columbi, &c. sunt applicanda.

Hæc ad capitis dyscrasiam calidam.

Ad pulmonem calida dyscrasia laborantem.

Signa.

Frequens spiritus atque is expiratus, iusto cali-
dior perceptus, lingua sicciior, mala solito rubicun-
diores.

Remedium.

Aer frigidissimus, potio liquidissima, ac refrige-
rans, sensim pitissando bibita, amygdalogala, qua-
tuor seminum frigidorum maiorum emulsiones ex
hordei decocto, syrupi violacei dilutiones: pectoris
inunctiones ex humectantibus, atque refrigeranti-
bus: oleo violaceo, nenupharino, &c. cum succo re-
frigerante portulacæ, lactucæ &c.

*Dyscrasia
calida pul-
monis.*

Signa.

Remedium.

*Ad ventriculum calidum.**Dyscrasia**calida vē-**triculi.**Signa.**Remediū.**Signa.*

Appetentia remissa præterquam potionis, cui
ingens existit, à cibis, ructus nidorosi.

Remedium.

Cibus liquidus, frigidus, iurulentus, vt pulli ius c
herbis refrigerantibus alteratum, maxime sympa
theticis, oxalide, lactuca, &c.

Potus esto valde dilutus, vel aqua hordei, deco
ctum glycyrrhizæ, cum endiuiæ, lactuca, oxalide, &c.

Si bilis in ventriculo ferueat (cuius signum est o
ris amaritudo cum rosionis sensu) cholaphygo est
abigenda: & si os ventriculi laceſcat, vomitu excu
tienda: sin fundum petat, ex adstringente cholaphy
go vt rhabarbaro, vel diacydonio laxatiua est expur
ganda: à qua expurgata, epithemata refrigerantia ad
ventriculi regionem ante & pene ex succo solani,
endiuiæ, lactucæ, cum santalis aut camphora impo
nenda; vel cataplasmata refrigerantia ex farina hor
dei cum refrigerante succo, oleo rosaceo, vel meli
no addito, applicanda.

Sumantur autem ante cibum frequenter ribes,
oxyacanthæ succus, oxalidis, mali medici, &c. corna,
cydonia, &c.

*Dyscrasia**calida**hepatis.**Signa.**Remediū.**Hepatis dyscrasia calida.**Signa.*

Sitis contumacior, vrinæ coloratæ, & acriores.
Corporis color solito flauior.

Remedium.

Si sanguis ferueat, ex hepatica depleatur: sin bilis
æstuat, prius refrigerantibus atque humectantibus
alterata vacuetur.

Omnia intro sumenda sint copia largiore, atque
maiore quam in ventriculo laborante. Cetera cum
ventriculo conueniunt, si locum & sympatheticum
propria excipias.

Lienis

Lienis dyscrasia calida.

Signa.

Proditur communibus signis.

Remedium

Idem quod iecoris, nisi quod sympathetica propria sint huic accommodanda.

Renum dyscrasia calida.

Signum.

Calor molestus circum horum regionem perceptus, & oleosum quid urinis innatans.

Remedium.

Decubitus in alterutrum latus tantum, & in dorsum vitetur: dormiturus baltheo accingatur cui inexta sint spinacii semina, ne temere dorso noctu incumbat. Lectus esto durus. Quæ sumuntur hic liquidissima sunt omnia: & largiore quantitate quam in hepatis dyscrasia hauriantur.

Sin vero ex ardore renum diabetes oboriat, verius & assumpta, & admota applicanda, & quæ admota sunt, frequentius immutanda: ut farina hordei cum succo foliorum vitis, plantaginis, portulacæ, &c. cataplasmatibus consistentia; & refrigerantia tum (quibus semper acetum admiscendum) toti ventri inducenda.

Testiculorum dyscrasia calida.

Hæc calore insolito atque molesto proditur: & eandem cum renibus therapeiam obtinet.

Vteri dyscrasia calida.

Signum.

Fervor atque dolor:

Remedium.

Loca circum os sacrum & pubem, decoctis refrigerantibus rigentur, & refrigerantia loco applicentur: ut oui candidum, vel ipsum integrum, cum oleo rosaceo quassatum, & stupa exceptum, &c.

Lienis

dyscrasia

calida.

Signa.

Remedium.

Renum

dyscrasia

calida.

Signum.

Remedium.

Testiculo-

rum dys-

crasia ca-

lida.

Vteri dys-

crasia ca-

lida.

Signum.

Remed.

Ad ambusta Remedium.

Curantur ambusta, vel ipsum ardorem auocantibus, vel exstinguentibus

Euocantia.

Euocantia calida sunt: vt ari, aut porri illita folia cepe sale contusa & inducta, vel oleum cum sale: atque hæc quam celerrime sunt inducenda.

Exstinguentia.

Exstinguentia, frigida sunt: oxycratum, semper uiui succus, oui album, succus solani, &c.

*Hactenus ametria calida: sequitur frigida.**Ametria frigida signa.**Signa.*

Pars tactu frigidior percepta: excrementa cruda & multa: pallor (si partium externarum aliqua sit) & decoloratio.

*Causæ.**Causæ.*

Primæ & procathartice: Exercitationes intermissæ, tristitia, curæ, &c. venus prodiga, in mulieribus menstrua nimium fluentia, somnus nimius: aer impenso frigidus, cibus, vel potio nimium refrigerantes.

Internæ causæ, frigida cacochymia, interdum ex pituita, interdum ex melancholia.

*Remediū.**Remedium.*

Dixta calida & calefaciens. Exercitatio pro corporis viribus satis valida, habitus fricandus, & à balneo attenuante, calidus vngendus. Hilaritas procuratur, etiam interdum ira excitanda.

Cibus calidus, panis triticeus, modice fermentatus, sale, aniso, &c. conspersus.

Carnes salubrium animalium, & concocta faciles, veruecinæ, vitulinæ, pullorum, gallinarum, pisces saxatiles atq. omnia aromate condita.

Potus meracus, olera acra, cepe, porrum, &c.

Medicamentum ex tribus piperibus, ex vino, certis interuallis sumatur: vel aliquid electuorum aromaticorum vel puluerum diagalangæ, diamoschi, &c.

Cordis

Cordis dyscrasia frigida.

Signa.

Respiratio parua, & pulsus paruus, metus, tri-
litia.

Remedium

Corpus exercendum, hilaritas procuranda. Dieta
reliqua esto aromatica. Potus, vinum satis genero-
sum. Medicamenta exhilarantia cardiaca: vt diamo-
chi, aromaticum rosatum: latificans Galeni & ex
eadem materia stillatitia aqua rosarum, melissa, vel
ochymi admista, epithemata aptentur: atque ex eis-
dem ficcis scuta ad cordis regionem gestanda con-
cinnentur.

Cerebrum frigidum.

Signum: Sensus perceptio frigida.

Remedium.

Cephalica vberius quam in prophylactica adhi-
bita.

Pulmo frigidus.

Conuenit cum corde frigido, si locum & sympa-
thetica excipias.

Ventriculus frigidus.

Signa.

Tarda coctio: ructus acidus.

Remedium.

Si humore pituitoso fota sit: (quod ex grauitate
quadam, & nausea, & ex ventriculi dissolutione, &
languore, percipitur) ipse humor medicamento a-
loetico, vt hiera picra, pilulis stomachicis, &c. est ex-
purgandus, vel prius attenuatus (ceteris cōsentien-
tibus) excutiendus: & postea ventriculus sympathe-
ticis calidis corrigendus: sumto vel diaspolitico, vel
diatrion pipereon, &c & fomētis ac sacculis ex sto-
machica materia, vino aromatico, caryophyllis, nu-
ce moschata, absinthio roborandus.

Cordis

dyscrasia

frigida.

Signa.

Signum.

Cerebri

dyscr. fri-
gida.

Pulmo-
nis.

Ventra-
culi.

Cibus esto siccus ex volatiliū carnibus, cinnamomo, caryophyllis, &c. transfixis.

Potio esto parca & meraca. Cibus actu calidus potus frigidus.

Sub finem autem (expurgato humore) adstringentia vsurpentur, praesertim si inde diarrhoea lien-terica immineat: tum namq. adstringentia vel toti ventri sunt inducenda.

Hepatis.

Hepar frigidum.

Signa.

Color faciei pallidus, urina alba, alias tenuis, alias crassa, attractrix facultas, vel alteratrix, vel ambę infirma.

Si attractrix vis infirma sit, liquida cruda, incocta per aluum excernuntur, ad chyli tamen formam accedentia.

Si alteratrix tantum infirma sit, simile quid loturæ carniū, vel sanguinis aqua diluti, ex interuallis excernitur.

Remedium.

Cibi calefacientes: mel, passulæ, ficus, amygdalæ, pistachia, &c. Potio: vinum. Ex pharmacis: Electuatum ex vino chyphondes dictum, vel mel passulatum cum cinnamomo, cassia, spica, ligno, aloes, & croco, sumatur vnc. β. ex vino odorifero.

Eupatorium, absinthium, schoenanthus, ex vino & aqua cum melle cocta, frequenter vsurpanda.

Foris autem illinantur oleum irinum, mastichinum, costinum, &c.

Si quis autem humor a metriam pariat, est is primum pharmaco expediendus, atque deinde cetera sedulo vsurpanda.

Lienis.

Lien frigidus.

Conuenit cum iecore, si locum, & sympathetica propria excipias.

Renis

Renes frigidi.

Testes.

Uterus.

Renum.

Testium.

Uteri.

Calidis sympatheticis inprimis, secundum natu-
res aditus applicatis curantur.

Ad partem frigore laesam.

Remedium.

*Pars fri-
gore laesa.*

Pars sensim calefiat, & (perfrigerato loco calidio
collocato) pars ipsa oleo irino, castino, & castorio,
el euphorbio inungatur, & lana succida inuolua-
tur, nunquam omittis parti sympatheticis.

Hactenus dyscrasia frigida: sequitur humida.

Signa.

*Dyscr-
asia humi-
da signa.*

Pars nimis mollis, & humiditate diffuens, excre-
menta copiosa, facilis sudor.

Causa.

Causa.

Procathartica, vita sedentaria, somnolentia, aer,
habitatio humida, iuscula crebra, cibi humidi, po-
tus multa.

Internæ: excrementa, vel succi humidi copiosi,
grossi humores redundantes.

Remedium.

*Remedi-
um.*

Siccantia omnia, exercitatio valida, sudores mul-
ti, frictiones siccae, & hypocausta.

Cibus assus, & ex animalibus siccis, salsamenta,
panis siccus & vetustus, modo haud nimium indu-
erit. Iuscula nulla, potus parvus, Venus.

Cer humidum,

Cerebrum,

Iecur,

Ventriculus.

Lien, &c.

Omnia siccantibus, sympatheticis, & roboranti-
bus sunt corrigenda.

Hactenus dyscrasia humida: sequi-

tur sicca.

*Dyscrasia
ficca fi-
gna.
Causa.*

Hæc difficilior quam humida cedit remediis.

Signa.

Pars durior, squalidior, excrementa pauca.

Causa.

Procathartica: studia, vigilia, cura, labor vehemens, & exercitatio vehementior, & laboriosa. Venus prodiga.

Aer ficcus, Laconica multa. Cibus ficcus. Potio parca. Interna: sanguis parcus.

Remed.

Remedium.

Humida omnia, exercitatio lenta & parca: iuscula crebra, lac, iuscula hordeo, borragine buglossa alterata. Balnea ex hydrelæo: & ex hydrelæo frictiones. Hilaritas. Somnus etiam à cibo brevis. Potio diluta, & vinum oligophorum.

Siccitas marasmodi (exhausto humido radicali) omnem therapeiam respuit.

Partium principum ficca dyscrasia.

Harum atque reliquarum omnium siccitas, ex vberissime adhibitis, quæ in prophylactica dicta sunt, est corrigenda.

Haftenus quarumdam partium elementaris dyscrasia.

*Dyscrasia
uniuersa
in.*

Si uniuersalis dyscrasia sit: per omnes vndiq. aditus est abigenda: exordio ab illa parte ducto quæ alteri incommodat.

Causas habet vel vndique afficientes vel principes: & signis prædictis vndiq. manifestis proditur.

Haftenus ametria Elementaris: sequitur venenata.

*Ametria
venenata.*

Venenata ametria est, omnium eucrasie partium à venenata causa corruptio.

Venenata ametria est alexiteriis demolienda.

Venenata duplex § In corpore genito.
exstitit: ex veneno & Velextraneo.

In corpore

In corpore Spiritus tantum inficiens:
 nentum est } Vel substantiam corporis, item cor-
 duplex, vel } rumpens.

Spiritus inficiens; fere vel cerebri, vel cordis, tan-
 tum spiritus inuadit, idque pro veneni motu, vel se-
 crisim, vel simul.

Cerebri spiritus seorsum inficiens epilepsiam
 parit.

Est autem epilepsia conuulsorius vniuersi corpo- *Epilepsia.*
 ris motus, ab aura venenata, in qua de repente ex-
 tincti concidunt, & ex intervallis conuelliuntur; & in-
 terdum voce nil significante exclamant, & ore spu-
 am edunt. Aliquibus vesica & aluus, inuoluntarie
 soluuntur, aliis adultis, genitura excernitur.

Pueros vexare solet septimestres iam dentientes, *Signa.*
 interlunio natos, & matris menstruis fluentibus
 conceptos, atq; tum perseverare solet ad pubertatis
 annos, quibus cum primum semen mares emittūt,
 menstrua femellis effluunt, cessare solet: quos si
 aperet annos, difficile curatur, & fere desperata res
 est. Atq; alias ubi stertor, stridor dentium, partium
 faciei peruersio, corporis totius iactatio vehemens,
 puma multa, seminis effusio, in ipso casu acclama-
 do, res periculi plena existit.

Remedium.

Remedium.

Corpus loco lucido collocandum ex temperate
 alido, capite sublimiore, ex quo membra superne,
 seorsum fricentur: clystere satis acri prius injecto.
 ante omnia os diducendum est, atq; tenendum di-
 uetum: & lingua & palatum, theriaca, & mithrida-
 to, vel alterutro ruta succo, vel oxymelite squilliti-
 co dissoluto illinenda, & naribus excipiatur fumus
 belzoini vel castorei odorandum, vel castoreum,
 atq; belzoinū oxymelite squillitico dissoluta in gn-
 am indantur, in aures & nares oleum rosmarini, aut
 lucis moschatæ infundatur, & inde coronalis futura

& lambdoides, fricentur; & extremis vincula dolorifica iniciantur.

Hac arte excitato epileptico, reuulsionibus studendum, & vacuationibus ab ipso cerebro, primum clysteriis; tum purgantibus, præsertim per sedem, ex hiera diacolocynthidos: deinde cucurbitulæ, cū scarificatione affigendæ, pro ægroti viribus, ac morbi vehementia. Ex interuallis (ægroto interea recreato) cucurbitulæ primum hypochondriis affigantur: deinde scapulis, cum scarificatione, atq. (diebus interiectis purgato corpore & ægroto recreato) occipitio affigantur: & rubrificantia, & vesicas excitantia, collo iuxta scapulas, admouenda; deniq. cetones, & cauteria, extremo occipiti, & carneæ brachii parti inducenda, aperto diu seruato vlcere, caput radendum, vel detondendū, & cucupha ex cephalicis adiectis morbo antipatheticis, vt visco querno, pæoniæ maris radice, hyssopo, &c. gestāda, & sternutatoriis ex pipere, euphorbio sinapi, &c. vtendum, & apophlegmatismis. Atque tota therapeiæ historia, antidotus sumatur huic malo proprius: vt squilla apud Gal. in consilio pro puero epileptico, vel aliud quodlibet accommodatum ex visco querno, radice, & semine pæoniæ maris, decrescente Luna collecto, cranio humano, vngula asini, cornu alcis, &c. Quibus autem inueterata est, malleoli venæ, veris initio, incidendæ.

Si infans sit, nutrix esto abstemia, & coitu abstineat.

Pueri corpus molliter fricādum, & caput detonsum inungendum oleo anethino, rutaceo, sampsuchino, &c. puluere cyperi, angelicæ, radicis pæoniæ maris adiecto. Aluus semper tenenda tenera ex butyro & saccharo, vel melle nutricis mammæ illito, mercurialis cauliculo in anum inserto: vel aliquid syrupi laxatiui rosarū pallidarū pulticulæ misceatur,
vel

el sedes melle illinatur, & rutæ succo: vel salis grunus in podicem indatur.

Si aliunde venenum deferatur: tum & origini est obstandum. Quæ ex sanie maligna biliosa in ventriculum irruente ieiuno fere, oriri solet. Hic ergo panis vino tenui austero, vel granatorum succo macerandus, atque sumendus: atque ventriculus ex alopathico medicamento purgandus: vel vomitu humor evacuandus: & ne talem saniem admittat, sympatheticis astringentibus roborandus. Pueris solet ex vermibus putrescentibus accidere. His, amaris, & alexiteriis, vermes enecandi, atq; eiiciendi, tam sumis, quam ad umbilici regionem applicatis. Atq; deur (luna declinante) semen præoniæ cum pulvere contra vermes, bis hebdomade.

Si ex alia particula quæ constringi poterit malum oriatur, fune diligenter excipiat: & pars arctissime constringatur, vt præcludatur veneno aditus: & articuli, rubrificans, & vesicans medicamentum, imponatur: vt lepidum, sinapi, cantharides, &c. Cucurbitulæ loco affigantur, & mithridatio, vel theriaca, vel anagallide rubra, locus inducendus, & vicinia omnis ex sinapi, pipere, euphorbio cum mellea, macardino, vel theriaca. Si locus præligari nequit, saltem cucurbitulæ adhibeantur cum scarificatione & multa flamma,

Vbi cor venenum petit, idque vehementius: li- *Lipothymia.*
pethymiam, aut syncopem parit, vbi remissius pal-
pitationem. Id autem fere accidit ex sanguinis grun-
no in ventriculo, vel intestinis, vel in pectore, vel in
vesica putrescente: vel ex vermibus putrefactis, vel
omica subito rupta, ac virus in cor exhalante. Hic
primum ex syncope reuocandus ægrotus vino por-
recto, & odoratis astringentibus naribus adhibitis,
& spiritus recreantibus, vt aceto rosaceo, in quo hyssopus maduerit, vel ipsa hyssopi coma intincta, &c.

R

odorata: & frictiones adhibenda partibus extremis: & vincula dolorifica iniicienda. Atque deinceps, (reuocato agroto) grumus, & venenum, expurgandum: & Cor sympatheticis, & antidotis, tam sanctis, quam admotis muniendum: vt diamargarito frigido, puluere de gemmis, quæ sumi poterunt ex syrupo de acetositate citri, & aqua rosacea dissoluta pannis intinctis, ad regionem cordis pro epithematis applicari &c. Nec non vtile theriacam cum conserua borraginis sumere. Deniq; cor vndique muniendum, & sibi sympatheticis: atq; antipatheticis veneno, eademq; ratio in palpitatione ex aura venenata est tenenda. Atq; hæc vbi seorsim petuntur: veneno simul autem, & cerebrum, & cor, in vteri suffocatione affici solent. Ergo in hac, cum accessio propinqua est: torpor mentis, pigritia, crurum imbecillitas, pallida facies, aspectus tristis: cum iam instat, strangulatus, grauis sopor premit; mens desipit; sensus torpent, vox obmutescit, crura contrahuntur; Deinde maxillæ rubere incipiunt; facies aliquantulum ardescit, pulsus exiguus, languidus, in nonnullis vix perceptibilis. Cum remittit, humiditas quædam ad tactum ex locis mulieribus procedit: atque tandem redeunt ad se.

Circu: tibus mouetur: hyeme & autumnio magis, accidit iuueniculis, ad venærem procliuiibus: sterilibus maxime, si ex medicina sumpta fuerint infœcundæ: & eis quæ præter consuetudinem non miscentur viris.

Causa.

Causa. Vapor in principes partes elatus ex semine corrupto, vel alio quouis humore crasso, & veluti seminali in vtero putrescente: & in partes nobiles virus exhalante.

Remedium.

Remediū. Excitetur e paroxysmo vellicatis auribus, maxime

me pilis pudendo adnatis. Aliquando opus & piper, zinziber, sal gemmæ, & huiusmodi alia pudendis immittere. In accessione, summa diligentia & cura tota, & corpus totum perfricandum, ex aceto, & sale. Odore fœda naribus admoucantur: ut castorium, galbanum, allium, pili combusti, veteramenta combusta, & naribus excepta. In vuluam autem odoratissima vnguenta infundenda, ut oleum, ciueta, vel moscho, mistum: vel in quo nux moschata, caryophyllum, &c. incoxerint: vel pulueres aromatici miscentur. Et inde obstetrix (intincto digito) affricet os vteri, in virginibus: in aliis interiora.

Porro sternutamenta fiant ex castorio, pipere, eleboro, sinapi, &c. Cucurbitulæ affigantur inguinibus, & ventri cum multa flamma: & voce aspera excitetur, ubi accessio conquieuerit: vomitus excitandus, & cibus parcus offerendus, vel nullus: & cardiacis roboretur.

His per intervalla, castorium drach. i pondere vel scrup. 2. bibendum ex artemisiæ decocto: vel bryoniæ radix, vino albo incocta.

Si virgines sint, vel viduæ, nubant: si nuptæ, coitus frequentior esto solito.

Si prægnans laborat suffocatione, ea quæ conceptum corrumpunt cauenda: & quæ vehementer vterum concutiant.

Hactenus de veneno spiritus tantum inficiente: sequitur corporis item substantiam corrumpens, atque primum de Elephantiasis Signa.

Pili Elephantiacis defluunt: & ubi auelluntur, Elephantiacis signa. cutis pars vna sequitur: tubercula rotunda, multa, granosa, sub superciliis, & pone aures, variisque faciei locis. Auricularum contractior & exactior rotunditas: frontis rugositas: oculorum obtutus fixus, & exacta rotunditas: nares extrinsecus patulæ: intrinsecus constrictæ: labrorum sublatio, crassities, &

tumor gingiuarum sordes: foetor: erosio. Venæ sub lingua varicosæ, & nigræ: animæ foetor: vox clangosa, & ex naribus manans. Vniuersæ cutis defœdatio cum arida scabritie, cum multis herpetibus, scabie, & vlceribus, squamas, crustasque remittentibus: sensus compunctionis per vniuersam cutem: consumptio musculorū inter pollicem, & indicem: scapulæ instar alarum exstantes: partium stupor, partium extremarum putredo: terrifica insomnia: timores: ad coitum furentes: sanguis si aqua dissoluatur, arenosus: pulsus debilis: vrina instar iumentorum crassa.

Remedium.

Remediū. Malum si inueterauerit, incurabile existit. vbi recens sit, (id est, cum nihil ex summis deciderit: nec vlla sit vlceratio, nec eminentiæ tuberosæ plurimū exsurgant: sola facies aspectu ingrator, neque tamen admodum indecora), therapeia experiunda, quantumuis difficilis.

A somno, manu molliter permulceantur: alioque deiecta prius, gestetur: & vocem exerceat: deinde perfricetur, & vario exercitationum genere vtatur. Sudor ab exercitatione contractus abstergeatur, & corpus butyro recenti delineatur: & post (tēpore pauxillo interposito) succo scenigræci, aut ptisanæ cremore corpus perungatur in balneo: & a balneo, deterfus, perungatur oleo myrtino, vnoq; modico cum alumine, vel ammoniaco, vt sordium sit spissitudo: rursus teneris panniculis absterfus, dimidia hora conquiescat, inde potu aquæ ad vomitum sollicitetur, post vomitum detur vinum absinthites, aut organites.

Cibus: Panis hordeaceus, vel maza. ptisana, oua, lac, mel cum pane, pisces molli carne præditi, saxatiles: ex testaceis ostrea, pectines, tellinæ cum betis incoctæ.

Volatilia boni succi.

Ex

MEDICINAE PARS II.

85

Ex oleribus: beta, lactuca, malua, rumex, &c.

Ex fructibus: ficus, vuar, passulæ, pinei nuclei, amygdala, &c.

Vino, ac venere, toto morbi curriculo abstinendum.

Leui adhuc malo, caput vrendum ferramentis nuclei modo rotundis: capite ad cutem prius detonso, quinque crustis excitatis: vna supra sinciput, altera paulo supra frontem vbi pili desinunt, tertia in occipitio: duabus reliquis supra ossa squamosa: vlceribus diu apertis seruatis.

Quo nisi cedat malum, atque valentius sit: protinus per initia sanguis mittatur, præsertim vere, pro viribus, ac vsu, ex vtroque brachio, ampla vena, si ferant vires, sin minus, ex malleolis, vel manu extrema, ac nouem diebus, vel decem interpositis: purgetur corpus hiera diacolocynthidos: non semel, sed (habita virium ratione) frequentius, atque aliis decem diebus interpositis, lactis scissilis serum detur, haud minus tribus heminis, nec amplius quinque: sequente tempore, recens mulctum bibi poterit: & frequenter vsurpari.

Si morbus haudquaquam cedat: lacte abstinendum, & vomitus tentandus ex radícula: atque postea ad helleborum album accedendum: bis vere, (si fieri potest) semel per autumnum, & metasyncriticis vtendum ex alto humorum rapientibus: & leues cucurbitulæ hypochondriis, & ori ventriculi applicentur: & membra dropaci illinantur, atque iterum ex intervallo corpus purgandum ex hiera: & sanguinis tum missio prætermittenda: atq; hoc ter in anno repetendum: vere potissimum, & autumno.

Inter dies purgationis, vtendum frequentibus balneis, & antidotis: balneis ex fumaria, boragine, buglossa, nepeta, &c. smegmatis in balneo vtendum,

ex rumicis radice, sulphure, nitro. & tumidis eminentiis, iberidis viridis folia, cum axungia tusa, applicentur.

Ad spirandi difficultatem: qua elephantiaci affligi solent: aselli sub aquariis degentes, quinque aut sex, ex aqua mulsæ cyathis tribus potentur.

Antidotus autem sint, decoctum brassicæ absinthii, ligni sancti, cum passulis, ficibus, violarum floribus & boraginis, ac buglossi foliis, erinacei caput eodem modo decoctum.

Viperarum carnes, abscisso capite & cauda, ad putrilaginem coctæ: carnibus assis, & iusculo absorto, theriaca ipsa, tum pota, tum illita: & sales theriaci.

*Atque hæc potius ne morbus inualescat: quam
ut omnino curetur.*

Cancer.

Signa.

Canceri signa.

Durities partis: color liuidus, id est, inter rubrum, & nigrum medius: circa locum affectum ictus, quasi punctim illati sentiuntur: interdum torpet: venas ostendit in circuitu tumentes, ac elatas, canceri brachiorum modo, vbi exulceratur pars, dolet; labra prætumida habet, aspectu horrida, & colluue ingrata, sanies continue manat tenuis, aquosa, nigra, aut fulua, & grauitèr olens.

Remedium.

Remedium.

Est item fere & istud malum immedicabile, estque vel mitigandum, vel prorsus excidendum: si in eis partibus sit, quæ incidi poterunt, mitigatur primum sanguinis missione: tum alios humores purgante pharmaco ex intervallo diætata esto ex ptisanæ cremore, lactis sero, piscibus saxatilibus, omnis generis auiculis, exceptis palustribus.

Ex oleribus conueniunt malua, atriplex, blitum, cucur-

eucurbita, &c. acria vitentur omnia: & potus generosus, menses, & hæmorrhoides cōsuevis irritentur: & linteum molle duplicatum succo solani imbuetur, & applicetur, &c. lanam molliusculam extrinsecus eodem succo madentem linteo circum dato: & ne siccescant, hæc eo succo subinde irrigato, vel applicetur vnguētum album, vnguentum elithargyro, & plumbo vſto: ex pompholige, &c.

Atq; hæc mitigandi ratio.

Vbi autem excindere libet, prorsus rescindendus, vt nulla radix superſit: & ſanguis exprimendus, & ſinendus fluere, etiam exciſo cancro, cādente ferro locus inutendus: vel ſi minus libet ſecare, & cādente cauterio adurere: Exedatur carcinoma aſenico ſublimate: quod triduo ſinendum, vel dum effectum præſtiterit, quod ex loci tumore percipitur. Interea vicinis partibus bolo, oleo roſaceo, ſucco ſolani, plantaginis, ſemperuiui, munitis, dolor mitigandus malua, althæa, in mulſo ſubaſta, & oleo roſaceo pauco admixto, ad cataplaſmatis formam.

Carbunculus.

Signa.

Pars dura, ardore feruens; puſtula ſæpe multa, exiles, milii magnitudine: interdum vna maiuſcula, ab eis cruſtoſa vlcuſcula, qualia ferramentiſ cantentibus excitantur, cruſta modo cinereum colorem, modo nigrorem, præ ſe fert; eoq; loco, leuari cutis nequit: ſed carni inferiori quaſi infixæ eſt, circumiacens caro inflammatur ingenti ardore, & colore nigreſcente, ſplendetq; bituminis, & picis modo. His accidit febris, nauſea, frequens vomitus, appetitus proſtratio, cordis tremor, palpitatio, & frequens animi defectio.

Carbunculi ſigna.

Remedium.

Cordi inprimis hic conſulendum antidotis, *Remedii.*

F 4

& alexiteriis sumtis, & admotis, sympatheticis, & veneno repurgantibus diamargarito frigido, de gemmis, pulvere bezoardico, &c. Sanguis (si vires ferant) ad lypothymiam mittatur: ac deinde tumor scarificandus plagis altis: & ipsæ incisiones, aqua calente statim perfundendæ: interdum & opus est arsenicum sublimatum imponere: vel sanguisugæ affigendæ & vicinæ partes muniendæ bolo, succo solani, cum rosaceo, &c. & malum punicum acidum in aceto coquatur ad tabem: tum deteratur, ad leuorem, & parti laboranti, & circumiacenti imponatur, & recondita facultate præditum sequens pulticula applicetur; succorum symphyti maioris, scabiosæ, pedis columbini, an. drach. 2. farinæ hordei vnc. 3. misce. Quidquid carnis emortuæ fuerit, radicitus extirpandum: quod nisi succedat, inurendum ferro candenti, dum omni ex parte sensus doloris sit; & crustalaxanda, vel si vri recusset, adhibeatur plebeius quis, qui carbonem mordicus apprehensum radicitus euellat.

Porro diæta esto tota acida: vt pruna acida, oxalis in iusculis: & aceti, mali punici, & aranciorum, atq; omphacii condimenta.

Ad Gangrenam. Signa.

Gangrena signa

Color partis liuidus, fuscus, arteriarum motus in parte insensibilis, putredo, ac fœtor: pressa pars digitis cedit: atque etiam apparet cutis a parte semota.

Remedium.

Remediū.

Gangræna quamprimum excidenda: quanquam pars aliquem sensum obtineat. Cor roborandum theriaca ex aqua cardui benedicti, angelicæ, &c. Et epithemata ex sympatheticis cordi imponantur: atq; veneni vim retundentibus, fantalis, corallo, rosis, theriaca, mithridatio, &c. Pars ipsa scarificanda, vel ubi opus est, ad ossa vitatis vasis, nisi & ipsa putruerint, incidenda: & pars aqua salsa lauanda in qua ægyptia-

gyptiacū, & aloe bullierint: sub finē addita aqua vitę
ost lotionē, ægyptiacum imponendū, & ægyptiaco
lind emplastrū loca vicina cōplectēs, putredini re-
stans ex fabarū farina, bordei, orobi, lupinorū &c.
um aloe, myrrha, mastiche, aqua vitę, & oxymelite
exceptis. Interea partes circumiacentes muniendę
epellente, atque astringēte materia: succo planta-
inis, solani, semperuiui, cum oleo rosaceo, bolo ar-
nena, oxyacantha &c. Atque sēpe repetenda reme-
dia hęc, quę nisi fructum præstiterint, cauterio pars
renda, & ab eo, porri succus, cum sale trito atque
dissoluto apponendus.

Quod si nec cauteria proficiant, pars (si præscindi
poterit) est ex amputanda prorsus: potius ex sana
parte aliquo exciso, quam ex ægra relicta.

Hactenus venenum gentium, sequitur extraneum.

*Venenum
extraneum.*

Extraneum est Intro sumtum.

vel Foris exceptum.

Intro sumtum est du- Spiritu raptum.

plex: vel Potum, vel æstum.

Spiritu raptum, vt pestis.

Signa.

Rapto per inspirationem veneno, continuo per *Testis f-*
pulmones cor petit, & labefactat: huius, arteriarum *gna.*
que spiritus, atque interdum humores, & vniuer-
sum corpus inquinat. Vires omnes vitales quamprimum
infringuntur, & squalent spiritus hinc pulsus
arteriarum exilior, imbecillior, frequentior, celeri-
or, quę argumenta sunt pestis acutissima, quę vno
die hominem rapit. In hęc nec ardor mordax, nec
fitis vehemens, vt nec laborans sibi febricitare vi-
detur: nec in vrinis, quid alieni apparet: sed synco-
pe, pulsu paruo, ac pressio, vel assidua vomitione, vel
vigiliis, iactatione corporis, viriumque prostratione,
proditur: nullus item sensus doloris percipitur.

Si vna & humores corrumpuntur mitior pestis

est sine carbunculo: Carbunculo sociata grauior.
Atque in his minus grauis, si bubo apparet ante a
groti decubitus.

Remedium.

Remediū. Vbi corpus plethoricum est, ad diminuendum
hanc, sanguis mittendus audacter: & frictionibus
(pro aegroti viribus) & vigiliis, venenum euocan-
dum, & leuibus pharmacis & clysteriis.

Cor muniendum antidotis: tormentilla, beto-
nica, morsu diaboli, scabiosa, vel electuaria ex bolo
vel theriaca, cum oxalidis stillitica, &c.

Aeris fiat frequens mutatio, & temperatus sit.

Aluus quotidie ducatur clysteribus blandis & ca-
tharticis mollibus.

Cor epithematis muniatur ex aqua rosarum, vio-
larum, &c. cum santalis, camphora, vel puluere be-
zoardico N. Præpositi, & subinde repetenda alexi-
teria: & vires, & cor recreanda diamargaritone, di-
arrhodo, &c.

Cibus esto levis, & acidis conditus.

Bubo si proruperit, conandum pro viribus foras
euocare, cucurbitulis, cum scarificatione: sanguisug-
is, cauteriis si vires ferant, catellis dissectis, & appli-
catis, vel attrahentibus pharmacis: vt in cepa inco-
cta theriaca, vel scabiosa, lysimachia. Vomica aperta,
sinatur die vna, vt virus exspiret.

Si pestis mitior sit, erumpunt bubonis loco, exan-
themata, morbilli, variolæ, atque in his, præstat fe-
briculam præcedere quam sequi. plures hic deterio-
res, paucioribus, maiores, minoribus, malæ prurigi-
nosæ, ardentes, & quas vomitus comitatur frequēs,
& alui fluor. item quæ intro redeunt, sunt perniciosi
plenissimæ: nisi aluus fluat & colluiem expurget:
solent apparere, primo, secundo, aut tertio post fe-
brem die: melius cito apparere, celeriter augeri &
maturari: atq; fere ad diem 7. maturantur.

Exan-

Exanthematis & iethymatis magis obnoxii sunt *Exanthema-
mata.* meri, ob corporis tenebritatem: nec viris accidunt, *mata.*

si constitutio aeris valde gravis fuerit. Ex his au-
tem nales grauissima sunt. In his initio raptu vene-
no, vniuersum corpus, maxime caput ingrauescit,
colore plerumque concutitur, oculi tument, & illa-
rymantur: facies quasi inflammata rubescit: rau-
descat vox, spiritus crebrior, ac difficilior euadit: pul-
sus frequens, ac celer, & malo ingrauescente, pro-
ditur in cute. Eethymata pustulis multis, toto cor-
pore, confertim albo colore, extuberant: pituita, ac
bilis mitionem pra se ferentes. Exanthemata qua-
si pulicum maculae, fere rubra apparent: interdum
purpurea, interdum viridia aut nigra.

Remedium.

Postquam eruperint, parcendum somno, atque *Remedium.*
cum diaphoreticis, & sudorificis vtendum: Ex deco-
cto foeniculi, caricarum vel ficuum, semine apii, &c.
cum sirupo acetoso simplici.

*Hactenus inspiratum venenum: sequitur potum
vel esum.*

Ad venenum sumtum.

Astutum ex hydrelao vomendum calente, vel o- *Ad ve-
nenum
sumtum.*
leum aut eius loco butyrum, ex decocto seminum
lini, malua, foenigræci, bibendum.

Atq; post, clyster paulo acrior, infundendus ad
intestina purganda: & ab his, lac copiose potandū:
& antidotus veneno repurgans sumenda larga qua-
ritate: vt terra lemnia, marrubii succus, betonice
folia, & pra ceteris theriaca vel mithridatium. drac.
1. vel 2. pondere, vel bis etiam die.

Venena sumta
sunt vel ex

{ Animalibus aut horum operibus
vel inanima { Vegetabilibus:
tis, eisq; vel { Metallicis.

Ad animalia venenata: atq; primum ad Cantharides. Signa.

Ad Cantharides.

A Cantharide sumto: a stomacho ad vesicam cuncta morderi sentiuntur: & gustum similem pici, aut cedrino liquori habent. Dextra hypochondria inflammantur: Urina difficulter redditur, & sæpe vna sanguis exit: & per aluum excernuntur qualia in terminibus intestinorum egeri solent: animo languetur, anguntur, vertiginibus laborant tandem mente alienantur.

Remedium.

Hic oleum rosaceum potandum ex hordei cremore: & frequentes post vomitum clysteres ex cremore hordei, orizæ, cum semine fœniculi, & maluis. In vesicam item fundenda emulsio seminum frigidorum maiorum, cum decocto hordei, & balneum aquæ dulcis imperandum.

Ad Buprestem. Signa.

Ad Buprestem.

Buprestis sumto, gustus virosus offendit vehementer, stomachus, & venter dolent, & instar hydropicorum tument: extima corporis cutis intenditur, urina supprimitur.

Remedium.

Post vacuationes, detur decoctum ficuum aridarum ex vino, & remittente malo, iuuabit & palmulas, & ex omni genere pyrorum edere.

Salamandra. Signa.

Lingua inflammatur, mens impeditur, tremor cum torpore quodam, & resolutione virget, partes quædam corporis in orbem liuoribus variantur, & subinde permanente veneno, putrefactæ defluunt.

Remedium.

Ad Salamandram.

His conuenit resinam e pinu, aut e picea sumere: vel galbanum cum melle, & nucleos pineos, cum decocto chamæpityos, vel ranarum ius, cum decocta eryngii radice sumere.

Pinorum

Pinorum eruce, Signa.

Oris palatque dolor, valida linguæ inflammatio, *Ad pinorū erucæ.*
 machi intestinorumq; cruciatus, quæ cum pruri-
 circumtendi sentiuntur: feruor toto corpore af-
 git, & stomachi fastidium vrget.

Remedium.

His oleum melinum sumendum: & clystere ex-
 piendum.

Lepus Marinus. Signa.

Gustus piscibus virosis haud absimilis: temporis *Ad leporē marini.*
 progressu, aluus inolet, vrina supprimitur, & si quā-
 eruperit, purpurei coloris cernitur. Auerfantur
 sces omnes, præter fluuiatiles caneros: sudor fœ-
 dus erumpit, & vomitus biliosus, & nonnunquam
 guine mixtus.

Remedium.

His sumendū continue lac asininum: aut passum,
 at sanguis recens, & calens anseris, aut cyclamini
 dix trita ex vino propinanda.

Rana rubeta, & palustris. Signa.

Corporis tumor, pallor intensus buxo similis: &
 spiritus trahitur: os fœtet, singultus infestat: &
 men aliquando inuoluntarie prorumpit. *Ad ranā rubetans & palustris.*

Remedium.

His multum meraci vini sumendum, item arun-
 nis radicis, vel ciperi drach. 2.

Porro cogendi sunt celeriter ambulare, & curre-
 : & calida quotidie lauandi sunt.

Cameleon. Signa.

Valida ventris erosio, dolor cum totius corporis
 eruersione, tremor, mox conuulsio, item vomitio-
 es spumantes, & pituitosa: quibusdam singultus:
 ox nihil sonat, facies distorquetur. *Ad Camēleonem.*

Remedium.

Pinguis tritici cremor calidus epotus, absinthii
 orio, nitrum cum oxymelite, vel radícula præcor-

diorum fatus: terebinthina, styrax, semen vrtica
folia cupressi, sumta.

Cerebrum felix. Signa.

*Ad cerebro-
brum fe-
lis.*

Vertigines crebrae, stoliditas: amentia.

Remedium.

Potent moschi scrup. β . ex vino, vel diamoschi su-
mant drach. i. quatuor horis ante cibum: mane, ex
vino, certos dies, dum malum cedat.

*Haftenus venena ex Animalibus: sequuntur
ex vegetabilibus.*

Altercum. Signa.

Altercū.

Mentis alienatio, ebriorum more.

Remedium.

Conquiescendum his: & mulla, vel lac asininum:
& ficuum siccarum decoctum bibere his vtile.

Porro eichorium, sinapi, nasturtium, raphanus,
cepa, allia singula cum vino sumta, plurimum con-
ferunt.

Coriandrum. Signa.

*Corian-
drum.*

Rauicitatem facit, mentem mouet, similiter te-
mulentis: loquuntur turpia, totum corpus corian-
drum olet.

Remedium.

Potandum oleum irinum, & id ipsum clystere su-
mendum: atque tandem vinum meracum cum ab-
sinthio bibendum: & oua testa vacuata, & agitata,
cum muria sorbenda: & muria, & ius falsum galli-
naceum, vel anserinum, bibendum.

Tsyllium Signa.

Tsyllium.

Totum corpus refrigerat: torpetque cum reso-
lutione, atq; tristitia, vt animum despondeant.

Eaq; praesidio sunt, quae coriandro conueniunt.

Cicuta. Signa.

Cicuta.

Caligo: vertigines, vt nec minimum videant: sin-
gultus, mentis alienatio: & artuum perfrictio: vlti-
mo conuulsio, & suffocatio.

Reme-

Remedium.

Vinum meracum potandum per interualla, quibus interuallis, absinthium cum pipere, & vino exhibendum, vel passum per se potandum,

Opium Signa.

Veternus cum perfrictione & pruritu vehemens & toto corpore odor veneni percipitur. *Opium.*

Remedium.

Merum copiosum cum absinthio, & cinnamomo, piper cum castorio, & oxymelite.

Excitandi sunt, naribus admotis hyssopo aceto trito, vel pulegio, vel sternutatoriis infertis.

Aqua calida, & balneis fouendum corpus.

Carpesia. Signa.

Sopor & praesens strangulatio. Eadem quae cicuta conueniunt remedia. *Carpesia.*

Mandragora Signa.

Sopor, virium resolutio: validus veternus, atque ethargicus. *Mandragora.*

Remedium.

Corpus excitetur, & commoueatur admotis acribus ad nares: & absinthium cum vino dulci sumendum. Caput aceto & rosaceo fouendum.

Aconitum. Signa.

Lingua cum astrictione quadam dulcescit: inde vertigines: praesertim in surgendo, & oculorum humiditates: thoracis, & praecordiorum grauitas, ut multi erumpant flatus. *Aconitum.*

Remedium.

Chamaepitys, origanum, marrubium, aut abrotonum ex vino. Vinum in quo ferrum, aurum vel argentum, extinctum est frequentius.

Ixia. Signa.

Linguae inflammatio; valida mentis abalienatio; omnium naturalium excretionum suppressio, murmura alui, ac strepitus: nec quicquam tamen eiicitur. *Ixia.*

Remedium.

Absinthium cum vino diluto, copiosoque, aut c
aceto, vel oxymelite, vel castorium, & ruta, ex ei
dem: & acetum calidum.

Ephemerum. Signa.

Ephemerum.

Totius corporis pruritus velut urtica, aut squilla
tactum: interiora roduntur: stomachus vratur, cum
ponderosa gravitate, & malo inualecente, cruent
strigmentis mista, per aluum egeruntur.

Remedium.

Folia quercus, aut glandium, aut malicorii, au
serpilli decoctum cum lacte bibendum: lac vacci
num calidum potandum, & simul in ore continen
dum.

Taxus. Signa.

Taxus.

Perfrictio totius corporis, stragulatus.

Remedium.

Omnia, quæ cicutæ conveniunt.

Solanum furiosum. Signa.

Solanum furiosum.

Gustum lactis repræsentat, singultus crebri: lin
guæ humiditas, & larga sanguiniseductio.

Remedium.

Dulce vinum tepidum, cum anisi modico potum
amygdalæ, & elixa gallinarum pectora: conchyli
cruda pariter, & tosta, in cibo: locustæ marinæ, &
gammari, & ex ipsis ius esculentum, potui sumtum.

Sardonias. Signa.

Sardonias.

Mentis alienatio: convulsio cum labiorum con
tractione, ut risus imaginem præbeat.

Remedium.

Aqua mulsa copiosa, & lactis potio, corporis in
unctio ex calefacientibus ubi prius in hydrelæum
descensum sit: a quo corpus est vehementer infri
candum, & inungendum.

*Papaver
cornicu-
latum.*

Papaver corniculatum.

Eadem infert mala quæ opium, atq; eadem the
rapeia curatur.

Bharis.

Pharicum. Signa.

Resolutio cum furore, ac conuulsione.

Pharica.

Remedium.

Cinnamomum, aut myrrha, ex vino: aut spica
ardi drach. 2. myrrhæ oboli duo cum passo misti.

Caput deraſum, farina hordacea, cum ruta trita,
aceto, cataplaſmatis modo inducendum.

Toxicum. Signa.

Labrorum, & linguæ inflammatio, mentis furor, *Toxicum*
uſi coerceri non poteſt, variis obnoxius imagini-
us, fere deſperatum malum eſt.

Remedium.

Vinculis continendi, & vi cogendi, vt vinum dul-
ce, cum roſaceo bibant, reddantque vomitum, & ra-
porum ſemen cum vino potum, peculiariter con-
uenit, & mala Cotonea his, cum pulegio potanda.

Fungi. Signa.

Strangulatus laqueis ſimiles: interdum & inte. *Fungi.*
tina exulcerantur.

Remedium.

Lixiuum ex ſarmentis, aut pyraſtri ſurculorum
linere, cum poſca, ſale, vel nitro potum. Item pyra-
ſtrea, incocta, ac ſumta. Si exulcerentur inteſti-
na, detur abſinthium, & ficuum decoctum, copioſe.
Porro in calidam descendendum: & cruda hordea-
cea farina, cataplaſmatis modo, præcordiis admo-
nenda.

Sanguis taurinus. Signa.

Spiritus difficultatem & ſtrangulationem indu. *Sanguis*
cit: tonſillarum, & gutturis meatus valida conuul- *taurinus.*
ſione obſtruendo, lingua rubet: & dentes tincti ſan-
guine apparent.

Remedium.

Vomitus hic fugiendus, atque primum inciden-
dus ſanguis coagulatus, & alius ducenda, vt coagu-
lo, cum aceto, ſanguis attenuandus eſt, & clyſtere

G

euocandus Stomachus, ac venter, hordeacea farina cum aqua mulsa obducendus.

Ad lac coagulatum.

Lac coagulatum. Lac coagulatum eadem parit symptomata: & eisdem remediis curatur. Atque hic falsum nil offerre debet.

Ad mel Heracleoticum.

Mel Heracleoticum. Eadem parit symptomata cum aconito: & eisdem curatur remediis.

Hactenus ex vegetabilibus: Sequuntur mineralia

Ac primum Gypsum.

Gypsum. Strangulat in lapidem concrefcens. Eadem conuenit, quæ fungis debeantur, & clyster ex passo, & maluis decoctis indatur.

Cerufca. Signa.

Cerufca. Singultus, tuffis, lingue ficcitas, extremorum perfrictio, cum mentis ab alienatione, & difficili corporis motu.

Remedium.

Lixiuum e vitium farmentis propinetur, lacrymæ thuris, vel prunorum gummi, aut vlmi humor, qui istius folliculis feruatur, & cum aqua tepida, vomitus quotidie citetur.

Calx, Sandaracha, Auripigmentum.

Signa.

Calx Sandaracha, auripigmentum. Ventris, & intestinorum, torsiones, cum vehementi rosione.

Remedium.

Vomitiones faciles: & aluum lubricam facientia, vt hibisci, & maluæ succus, decoctum seminis lini, tragi, orizæ, lac copiosum, aqua mulsa, iura pingua, & boni succi.

Argentissuma. Signa.

Argentissuma. Grauitas stomachi, ventris, & intestinorum, cum torsionibus validis. nonnunquam & intestina pondere

ere vulnerat. & disrumpit : vrinam supprimit : cor-
us intumescit, color fit plumbeus.

Remedium.

Agrestis hormini semen, cum vino, myrrhæ oboli
res: absinthium: hyssopum aut apii semen: aut
piper, aut ligustri flos, cum vino, palumbium fimus
aridus, cum nardo, & vino.

Plumbum.

Similia præcedenti pericula infert: & similia po *Plumbū.*
ntulat remedia.

Argentum viuum.

Eadem quæ argenti spumæ conferunt, & lac co- *Argentum*
pise potum. *viuum.*

*Vehementia cathartica: Veratrum album, Thapsia, ela-
terium, Agaricus niger, &c.*

Sistenda purgatio somno, & quiete inductis, & *Catharti-
ca vehe-*
constringentibus, & theriaca sumta, & frictionibus.

*Hactenus ad Venena sumta: Sequuntur ad
foris illata.*

mentia.

Foris illatum est } Cum vulnere inflatum:
duplex: vel } vel absque eo.

Si cum vulnere sit, supra vulnus pars deliganda, *Ad vene-*
non tamen nimis arcte: Homo adhibeatur, qui ve *num cum*
nenum ore puto, prius vino abluto, vel oleo ore cō- *vulnere*
tento, exsugat. Deinde, si pars admittat, cucurbitu- *inflatum.*
la cum multa flamma affigenda, scarificata & ipsa
prius, & partibus vicinis, vel vsio (si necesse sit ad-
hibenda) & si natura lethale vulnus sit, & immedi-
cabile: pars (si extremorum aliqua sit) præcidenda:
sed id antequam venenum reliquum corpus peruadat.

Si vulneratus plethoricus sit, sanguis mittatur.

Exhibendum autem cum cibis piper, aut allium,
& vinum forte, ac generosum bibendum: & parti
imponatur acria, vt cepæ cum polenta, aut pane: vel
porra cum sale. Conuenit & acetum calidum super-
undere, in quo nepeta sit incocta: & gallinacci, &
fi.

alia animalcula dissecta applicentur parti affectæ. Præterea bibant seryn, aut ericen, chamæpityn, cinnamomum, vrticæ semen, & ante omnia theriaca: denique & sudores mouendi, & alui deiectiones.

Atque hæc omnia vulnorum venenatorum communia,

Sequuntur propria, atque primum, Ad Canis rabiosi morsum, Signa.

Canis rabiosi morsus signa.

Huius signa petenda primum a cane ipso, qui spectandus an rabidus sit. *Signa* Canes rabidi, potum, & cibum, auerſantur: siti premuntur, nec tamen bibunt: anhelant nō parum, aures inclinant, saliuam, & copiosam, & spuæ antem edunt, muti prorsus, & veluti insani sunt, vt ne domesticos quidem agnoscant: insilunt sine latratu hominibus, pariter & bestiis, mordentque: vbi momorderunt, statim nil molestiæ afferunt, præterquam ex vulnere Et vt cōstet certo num rabidus sit, nucibus iuglandibus cōcisis, vulnus diligenter obstruatur, sequente die ablata, gallinis in cibo apponantur: & si ederint (fame adactæ edent) ac sequente die moriantur ab eis rabidus est qui momorderit.

Signa a symptomatis.

Hydrophobia (magna ex parte circa quadragesimum a morsu diem, quibusdam post sex menses, nonnullis sed id perraro, post septimum annum) cum conuulsione totius corporis, rubore (præsertim faciei) sudore, & anenxietate, omnem humorem fugiunt: alii canum more dilatrant, & obuium quemque dentibus petunt, & inficiunt malo.

Remedium.

Naturæ succurrendum, ante hydrophobiæ inuasionem, vbi constiterit rabiosum esse, & antequam rapiatur in corpus venenum, aperientibus inductis, & ex alto reuocantibus: vt emplastro ex pice, acetoque acerrimo, & opopanace, vel theriaca cum aqua vitæ affricetur, vel cæpe, vel allia cum sale, ac ruta in-

inducantur, & caustica imponantur, & vlcus ad quadraginta dies apertum teneatur.

Vinum dulce, vetustum, meracum potandum, & ac copiose, & allia, porra, cepæ, in cibo sumenda: & antidotus ex cancris fluuiatilibus, thure, & gentiana, sumenda, & theriaca satis larga quantitate, & sæpius in die, ad dies quatuor vel quinq; ante omnia Æschrionis pharmacum ad rabidi morsum ex cancris fluuiatilibus. Purgatio item fiat ex helleboro, vel antimonio, præsertim si venenum iam corpus inuasit, atque tum sudores, dropacismus, synapismus etiam toto tempore.

Medicamentum Æschrionis ex cancris fluuiatilibus ita habet: Capiantur cancri fluuiatiles cum sol in Leonem transferit, luna decima octaua, vrantur in patella æris rubri, donec in cinerem redigantur, vt in puluerem leuissimum redigi possint: Sume thuris partem vnā, quinq; gentianæ, cancrorum decem. Huius medicamenti quotidie ad quadraginta dies detur mensura cochlearis magni, cum aqua, atq; si non protinus ab initio, sed post aliquot dies cura suscipitur, quotidie duo cochlearia sumenda sunt,

Vesparum, atq; apium ietus. Signa.

Dolor, pars rubet, propinquare partes tument.

Remedium.

Bubulus fimus, vel lutum illitum, farina hordeacea cum aceto, folia maluarum leuigata.

Thalangiorum morsus. Signa.

Locus rubescit, & veluti punctus, per ambitum apparet, nec tumet, nec incalescit, sed leuiter rubidus frigore, & pruritu, vexatur. Perfrictio, tremor corporis, grauitas, sudor frigidus, dolor vagus, pallor, continua vrinx excernendæ incitatio, quibusdam vrinx difficultas, colis intentio, oculi humer,

*Vesparii
atq; apium
ietus.*

Thalangiorum morsus.

inguina, & poplites intenduntur, rigentque convulsorio modo.

Valida stomachi roſio vrget, lingua ſermonem manifeſte non explicat, vomitus aquæ, vel araneorum telis ſimilium erumpit: quæ aliquibus & per yrinam, & aluum descendunt.

Remedium.

Cinis ficulneus cum ſale leui, ex vino maceratus, imponatur, vel ariſtolochiæ puluis, cum farina hordeacea aceto madefactæ: & vlcus aqua ſalſa calida diligenter fouendum, & balneo frequenti vtendum, & propinandum drachmas duas ſeminis abrotoni, aniſi, vel ariſtolochiæ, vel trifolii herbæ ſemen. Et cancri fluuiatilis ſuccum, cum lacte, & apii ſemine.

Ad araneæ iſtum. Signa.

*Araneæ
iſtus.*

Validi dolores circa media præcordia, rubor partium, yrinæ difficultas, nonnunquam ſuffocatio.

Remedium.

Allia ſumenda, & vinum meracum ſuperbibendum.

Scorpionis. Signa.

*Iſtus Scor
pionis.*

Locus inflammari incipit, duratur, rubet, & cum dolore circumtenditur, nunc feruor, nunc frigus viſſim inuadit, acceditque dolor, qui modo decreſcit, modo intenditur, ſudor, horroſis ſenſus, tremor extremorum, perfrictio, inguina attolluntur, pars intenditur, ſæpe flatuſ. cum ſonitu per ſedem erumpit, pili rigent, cutis fit diſcolor, dolorque tota cute affligit, ceu acus ſpiculo excitatus.

Remedium.

Lac ficulneum protinus inſtillandum, & ipſe ſcorpion per ſe trituſ, vulnere imponenduſ, & ſulphur viuum reſina terebinthina exceptum. Propinandum autem ariſtolochiæ drachmas duas, præſertim corticis, cum vino, vel gentianam, vel trifolii,

lii, aut ocimi semen, balnea, & diaphoretica vini diluti, larga porio.

Ad Scolopendræ morsum Signa.

Locus affectus in orbem luescit & attollitur, interdum faciei similis: rarius ruber apparet, exulceraturq; statim ab ipso morfu, toto corpore pruriginis sensus percipitur: & si a marina imperiti sunt, aquosus, & pellucidus tumor efficitur: a terrestri, rubeus.

Remedium

Plagæ imponatur sal bene tritus: vel ruta leuigata: aut cinis aceto maceratus, aut scilla. Locus foueatur prius muria, cum aceto. Potui detur aristolochia, aut serpillum, aut calaminthæ, cum vino.

Ad stellionis morsum. Signa.

Intente dolent: morsum liuidum habent.

Remedium.

Plaga cepis, & alliis integatur: eademque edantur, & vinum meracum superbibatur,

Ad felis morsum. Signa.

Validus dolor, locus affectus liuidus.

Remedium

Eadem quæ ad stellionem, conferunt.

Mus araneus. Signa.

Dolores pulsatiles: & in singulis dentium eius animalis ictibus, rubores. Pustula surgit sanioso humore plena: propinquæ partes omnes liuent cute pustula dirupta, albū apparet vlcus, dilaniatis membranis nervosis. Excidunt partes exesæ, depastione orta, his quæ serpunt simili. Etiam intestinorum tormina sequuntur, urinæ difficultas, & frigidi madoris vndique eruptio.

Remedium

Mus ipse dissectus, applicetur: vel galbani spleniū imponatur, vel sinapi cum aceto leuigatum. Mus ipse qui momorderit, exacte tritus, ex vino bibatur: aut agni hædiue coagulum vel gentianæ radix.

*Vipera.**Vipera Signa.*

Dolor loci, tum totius corporis, in morfu duo foramina, paruo inuicem spatio discreta: atque ex his sanguis fluit, & humor saniosus: deinde oleosus, postremo etiam æruginosus, tumores iuxta morsum subrubri, liuidi, assurgentes: corpus decolor, vertigines oculorum, stomachi resolutio, animæ defectus, quibusdam vomitiones biliosæ, vrinx angustia, pustulæ in commorsa parte rumpentes, velut in ambustis. Tandem depassio inuadit ad viciniam procedens, gingivæ cruentantur, tremor, sopor, frigidi sudores. Minus periculum est in maris viperæ morfu, quam in feminæ, & minus vbi morfi cibum præsumserint.

Remedium.

Allii esus, & vini meraci potio: item porra, cepæ & salsamentum quam acerrimum, & theriacæ loco applicentur, gallinacei pulli dissecti & locus foueatur trifolii decocto, aut pulegii, aut muria, adiecto aceto.

*Amphibana & scytale.
Actus dryni.*

Ad amphibana, & scytale.

Eadem symptomata, & therapeia.

Ad dryni ictum. Signa.

Tumor circa locum vitiatum cum rubore, pustulæ in circuitu assurgunt. Aliquando emanat aquosa sanies, stomachi roño vexat & torsiones.

Remedium.

Aristolochia vino pota, & trifolium herba, & cuiuscunq; quercus fructus leuigatus, & potatus.

Applicandæ autem ilicis radices tussæ, quæ malo auxiliantur.

Ad Hamorrhoum. Signa.

Hamorrhous.

Validi cruciatus: quibus corporis raritates breues, atque angustæ, redduntur. Multus e plaga sanguis erumpit: & quandoquam cicatrix inducatur, de quo rumpitur: funditq; sanguinem, cruenta excernuntur

nuntur recrementa: sanguis qui defluit in grumum
cōcretus est: tussī sanguinem ex pulmone reiciunt,
& euomunt.

Remedium.

Periculosissimum omnium hoc. Vitis folia cocta,
& cum melle leuigata, imponantur, & hæmorrhoi
ipsius caput crematum potui dandum: atq. nisi ma-
ture occurratur, & priusquam symptomata vehe-
mentia eruperint, desperata salus est.

Ad dysadēm. Signa.

• Ardor intolerabilis urget, sitis tanta, ut nec exstin- *Dipsas.*
gui, nec intermitteri possit: cōsimilisq. totius corporis
habitus consequitur, velut in hydropicis, propter af-
fiduam potus ingestionem.

Remedium.

Eadem quæ ad hæmorrhoum, præter ipsius ca-
put: proprie, portulacæ folia trita ex aceto imponē-
da: item allium album, porrum, ruta, vitica.

Ad natricem. Signa.

Natrix.

Vlcus factum dilatatur, & linefcēs augetur: sanies
ex eo nigra, copiosa, & fœdi odoris, qualis ex depa-
scente vlcere cernitur.

Remedium.

Applicetur origanum tritum, & aqua subactum;
& lixiuia cum oleo indenda: & querna radix minu-
tim contrita. Bibantur autem binę aristolochiæ dra-
chmæ in potione poscæ cyathis duobus: & fauus re-
cens cum aceto.

Ad cenchrum. Signa.

Morsus viperæ similis est, putredo comitatur, & *Cenchrus.*
carnes intumefactæ prius, (ut in aqua inter cutem)
defluant: lethargo, veterinoq. premuntur.

Remedium.

Lactucæ, & lini semen, pariter mista, applicentur:
& satureia trita. Potui dentur cētaurii radice drach.
duæ, cum ternis vini cyathis, vel aristolochiæ radix
similiter.

*Ceraſtin.**Ad Ceraſtin morſum. Signa.*

Locus ex duritie, & puſtulis, intumeſcit: emanat ex vulnere ſanies, modo nigra, modo ſuppallida & porraceo colore. Totum corpus varicum modo attollitur: genitale erigitur, mens alienatur, oculi obſcureſcant, poſtremo tetanus.

Remedium.

Memברי mutilatio quam mox à morſu: & in his, & propinquis partibus, omnē carnem circum ſecare ſtatim, & radicatus, vſq; ad os exſcindere oportet: & reliquæ ferro candenti adrendæ.

*Aſpis.**Ad aſpidem. Signa.*

Acus puncturæ ſimilis exiſtit & omnino exiguus ſine tumore apparet: ſanguis exiguus & niger deſtillat: ſub ta oculorū hebetudo inuadit, & dolor corporis multiplex admodum, ſed mitis nec ſine quadam voluptate: mutatur color, & vireſcit: ſtomachi roſio exigua infeſtat: frons continue reuellitur: palpebræ ſine ſenſu veluti in ſomno commouentur.

Remedium.

Eadem quæ ceraſti debetur ac celerrime maturandum.

Nam etiam intra ſeptem vel octo horas mors aduentabit.

*Baſiliſcus.**Ad Baſiliſcum. Signa.*

Plaga ſubaureo colore tingitur.

Remedium.

Caſtorii drachmæ tres potandæ ſimiliter & pauperis liquor.

*Paſtinaca marina.**Ad Paſtinacam marinam. Signa.*

Dolor pertinax & totius corporis ſtupor.

Remedium.

Hepar diſſecandum & vulnere imponendum & uſus piſcis & in pollinem redactus.

*Murana.**Ad muranam. Signa.*

Eadem infert quæ viperæ morſus, & eandem therapiam poſtulat.

Ad

Ad marinum draconem. Signa.

Draco

Ictus pars vulnerata grauit̃er dolet cum inflāma-
tione febre animi deliquium gangrāna, & necrosis
nisi tempestiue succurratur.

Remedium.

Imponenda cepa sub prunis cocta cum fermento
& pauca theriaca, & pars incidēda scarificata, & the-
riaca cum aqua vitæ mista affricanda: porro piscis i-
pse dissectus vulnere medela est applicatus.

Ad Scorpionem marinum.

Scorpio

Sanatur ictus multo pisce dissecto & imposito, &
sulphure viuo cum aceto infricato.

Ad crocodili morsum.

Morsus

Adeps ipsorum impositus prius vlcere repurgato
nitro cum melle trito.

*Ad hominis ieiuni morsum prius leguminibus
ex his præsertim lenticula vsum.*

Remedium.

Vbi primum oleo morsum illeueris fœniculi ra-
dice cum melle obducito aut lomentum cum po-
sca, & oxyrodino frequenter immutando.

*Hactenus vulnere illata venena: sequitur quæ absq̃
vulnere inficit contagione tantum.*

Lues Venerea. Signa.

Huius pro corporis partiumq. natura infinita ex-
citantur symptomata. Cuicunq. particulæ lues pri-
mum infederit, illic inhærescens pustulam excitat,
interdum vlcusculum. Deinde intro venæ cauæ san-
guinem arterieq. maioris spiritum labefactat, tum-
que bubo prorumpit in inguine, inde vasis sperma-
ticis infectis ac renibus gonorrhœa virulenta. Cum
in iecur, & ventriculū irrepserit malum, leuis alui
fluor atq. vna cū iecore sanguis polluitur, profiliunt
liuidæ rubentesq. pustulæ, vlcuscula crustosa & her-
petes, nonnullis vlcera caua atque maligna, biliosis
phagedenica, melancholicis cancrofa, pituitosis sor-

didat tumoreq. mucoso foetidoq. manantia, sanguineis crebriora & carbunculi effigies. Omnia labris perduris tumentibus inuersis, quæ tandem carne exesa ossa depascunt primum tenella nasus, tum solidiora, quæ tempore cariosa atq. putrida excidunt. Cum malum in cerebrum obrepserit omnia redundant pituitosis excrementis, quæ capite interclusa magnum dolorem & acerbum commouent. Sin in articulos & ossium membranas ruat, his immanes dolores excitantur motu præsertim, affligentes & in tophos & duros humores concresecunt doloris haud expertes. In ossium substantia: hæc ipsa diffunduntur in tumorem, & tandem putrefaciunt: & huius vapore maligno in cutim dilato, pilorum defluuium parit. Atque his omnibus malis, in vrinis nullum signum malum. Interdum male curata recidua fit post 30 annum: & raro persimilis est radici: neq. eadē habet symptomata: sed fere distillatione, arthritide, artuum dolore, tophis, vel ossium carie, molesta: neq. adeo contagiosa est, exitiosissima quæ aut à visceribus, aut à partibus obliquis ortum ducit.

Remedium.

Remediū. Therapeia luis venereæ duplex est: Guaiaci potione: vel illitu ex hydrargyro. Ceteræ inanes sunt, vel haud tanti momenti.

Ex Guaiaci potione.

Lignum Guaiaci recens, nigrum, & resinofum, lima in puluerem redigatur: huius pulueris sex libra in aquæ fontanæ tepidæ aut fluuiatilis libris sex diem vnum maceretur: deinde lento admodum igni (vase fictili vitrato, cooperculato) dū libræ duæ supersunt: etiam (morbo inueterato) dum quarta tantum pars supersit. Decoctum perfrigerari sinatur dū defideat: deinde percoletur: & in vitreum vas indatur: post vas diligenter obstruendum. Atq. hoc primum decoctum, valde medicamentosum est.

Aliud

Aliud dilutius.

Sumatur noui pulueris Guaiaci ſelibra, decoquatur in libris decem (vbi prius horas 15. maceratus fuerit) dum libræ 7. ſuperſint.

Poterunt vtriq. decocto (vt iucundiora ſint) paſſulæ, & glycyrrhiza incoqui.

Ergo hyeme in conclauigni continuo calefacto & bene ventis & aeri obſtructo ægrotus contineatur. Atque aluus primum ducatur ex medicamento phlegmagogo, poſtridie purgationis ſi corpus plethoricum ſit, aperiatur vena baſilica aut mediana. Deinde die tertio propinandum bis die ex valentiore decocto cyathus vel vnc. 6. tepēs, hauſto guaiaico, horis aliquot, interquieſcendum lecto: & corpus ſtragulis operiendum ad ſudorem. Sudandum autem quamdiu vires ferant: atq. tum corpus ſiccandum: & è lecto ſurgendum, vbi corpus refrixerit, eſtibus offerendus. poſt quartam à ſumto medicamento horam, ad nonam: veſperi, ad ſeptimā. Alimenta eſto tenuis ſucci boni. ex aſſis, potius quam elixis, videlicet ex pullis columbinis, & gallinaceis, &c. Panis vero eſto vnc. 4. delicatioribus, validioribus, vncia 6. in diem. bellaria ſint paſſulæ, modicum panis nautici biſcocti, aut ad ignē exſiccati, aut intermedia panis cruſtula. Potus eſto decoctum dilutius. Vinum & venus, vt inſenſiſſima vitentur, niſi vires valde infirmæ ſint, at tum præmiſſo cyatho decocti, eſto illud vinum valde oligophorum. Inter paſtus, tempus hilariter tranſigendum: & omnia negotia tota therapeiæ hiſtoria intermittenda. Sin vero uſu guaiaci ſudores haud ſuccedant, vtres aqua calente pleni, vel lapides candentes vino exſincti, &c. ſunt plantis & genibus admouendi tenuibus telis inuoluti, & totum caput calefaciendum, & diligenter integendum.

Sudore pro patientis viribus effuſo, linteis calidis

& corpus tergendum exsiccandumq. & leuibus frictionibus quod in partibus extremis hæserit dissipandum.

Sed inprimis caput est exercendum calidis panis & diligenter perfricandum.

Interea toto curationis tempore seruetur alius tenerima ex carniū iusculo, vel decocto matutino incocta vel cassiæ fistulæ medulla semiūciæ pondere, alternis diebus pastus initio.

Circa diem sextum ab initia cura oriri solent graui symptomata ex materia mota ac fusa. In ergo his obortis, vel imminetibus medicamēto pro virium ratione satis valido pituitam vacuante purgandum eo die validiori decocto & sudore intermisso atque deinceps post 6. vel 7. dies vtile erit simile catharticum sumere. Hac ratio tenenda in grauius affectis diutius ad diem quadagesimum aut quinquagesimum: recens inquinatis & leuiter affectis ad diem, 15. vel 20. Atq; sedatis omnibus symptomatibus & doloribus perutile erit laconicum adire sumto prius guaiaci decocto in ipso laconici ingressu, atq. pro ægroti viribus sudores dies aliquot mouere, & postea 6. vel 7. diebus iterum purgare. Tum validum decoctum prætermittere aquoso tantum in pastu bibito atq. demum sensim atq. lente consueta diæta suscipienda.

Sin æstate cura suscipitur domo ægrotus haud continendus, quin deterfis sudoribus matutinis, sumtoq. cibo dum ad vespertinos sudores ventum sit quotidianis muniis vacare permittendum.

*Hactenus ex Guaiaci decocto Luis curatio; sequitur
ex hydrargyri illitu.*

℞ Argenti viui expurgati & præparati vnc. 6. sulphuris viui vnc. β. sublimati drach. β. axūgiæ porci cū herbis cephalicis incoctæ & salis expertes lib vnam:
vitellos

vitellos ouorum sub cineribus coctorum numero
tres: olei terebinthini & laurini, an. vnc. 2. theriacæ
veteris & mithridatiæ, an. vnc. ʒ. fiat linimentum.

Agro in angusto conclavi igni calefacto mane
ieiuno (nisi vires infirmæ sint: tum namq; hora an-
te litum in sculū sumi poterit vel olei vitellus, &c.)
oblinantur initio articuli tantum manuum, cubi-
torum, pedum, genuum; & humerorum, atq; dein-
ceps (robusto ægroto) & mali magnitudine postu-
lante, poterunt emunctoria oblini, totaque spina
dorsū: vitatis semper visceribus, & partibus nobili-
bus. Frictiones esto molles, & à partibus ductæ quæ
minus dolent. Quibus corpora densa sunt, hi obli-
nendi bis die, mane, & vesperi, sex à prandio horis.
Delicatiores corpora & imbecilla, alternis tantum
sunt perfricanda vel duobus diebus interpositis.
Deniq; ita viribus consulendum, vt nil remaneat
morbi: atque frictio tam diu, atque toties vsurpan-
da, dum malum extinctum, sit quod ex
symptomatis cessantibus
constabit.

F I N I S.

